

Porque las Poblaciones Clave son importantes

“Our mission is to build a better world. To leave no one behind. To stand for the poorest and the most vulnerable in the name of global peace and social justice.”

Ban Ki-moon
United Nations Secretary-General

Hombres que tienen Sexo con Hombres

Panorama global :

La prevalencia de la infección por el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres en las encuestas es en promedio 19 veces mayor que en la población general del país.

La proporción mediana de los hombres que tienen sexo con hombres que recibieron una prueba del VIH en los últimos 12 meses es de 38%

En 2010-2011, el financiamiento internacional representó el 92% de todo el gasto en programas de VIH para hombres que tienen sexo con hombres.


Baral, S., Sifakis, F., Cleghorn, F., & Beyrer, C. (2007), *Elevated risk for HIV infection among MSM in low- and middle-income countries: A systematic review*. PLOS Medicine.

"UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2012." *UNAIDS Global Report 2012*. Web. 14 Mar. 2013.

Hombres que tienen Sexo con Hombres Panorama Latino americano

51% de los HSH tienen acceso a servicios relacionados con el VIH

HIV prevalence among gay men and other men who have sex with men in Latin America, 2009–2013



Trabajadores sexuales

Panorama Global

Una revisión reciente de los datos disponibles de 50 países encontró que las trabajadoras sexuales eran 13,5 veces más probabilidad de vivir con el VIH que son otras mujeres.


Menos del 50% de las trabajadoras sexuales reportan acceso a servicios básicos de prevención del VIH

La financiación internacional ha generado casi todo el aumento de la financiación y representaron el 91% del gasto total en programas de VIH para profesionales del sexo en 2010-2011.

Trabajadores sexuales

Panorama Latino Americano

HIV prevalence among sex workers by sex in Latin America, 2009-2013



Personas Transgénero

Panorama Global

Los aproximadamente 15 millones de personas transgénero de todo el mundo tienen un riesgo desproporcionado de adquirir la infección por VIH.

Estudios epidemiológicos entre las personas transgénero han demostrado una alta prevalencia del VIH: entre el 8% y el 68% y la incidencia del VIH es estimada : 3,4 a 7,8 por 100 personas-año.


Sólo el 43% de los países informan de que sus estrategias nacionales contra el SIDA abordan las personas transgénero.

40% de los países informan de que el gobierno proporciona menos del 25% de sus programas y servicios a personas transgénero.

Personas Transgénero

Panorama latino americano

HIV prevalence among transgender women who engage in sex work and the general adult population in Latin America, 2013



Usuarios de drogas inyectables

Panorama Global

En 49 países con datos disponibles, la prevalencia de la infección por el VIH es por lo menos 22 veces mayor entre personas que se inyectan drogas que en la población general, con una prevalencia de al menos 50 veces más alta en 11 países.

El intercambio de material de inyección de drogas tiene tres veces más probabilidades de transmitir el VIH que las relaciones sexuales.

Casi el 10% de las infecciones globales de VIH se deben al uso de drogas intravenosas-esa cifra puede ir hasta el 30%, si se excluye el África subsahariana

Se estima que unos 16 millones de personas se inyectan drogas a nivel mundial, entre ellos muchos menores de 25 años y 3 millones de los cuales viven con el VIH.

En Europa oriental y Asia central, fuentes del sector público nacionales proporcionan sólo el 15% del gasto en programas de prevención para las personas que se inyectan drogas.


“UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2012.” *UNAIDS Global Report 2012*. Web. 14 Mar. 2013.

“UNAIDS Briefing Booklet “. *UNAIDS Briefing Booklet 2012*. Web. 14.2013

Usuarios de drogas inyectables

Panorama Latino americano

Prevalencia de VIH en UDI por el ultimo año reportado al GARPR 2014



Estudios indican:

- El acceso a servicios de prevención para poblaciones claves reduce el número de nuevos casos de VIH, cuando estos servicios están disponibles y administrados por las comunidades afectadas
- Cada aumento de 1% en la cobertura del tratamiento del VIH está asociado con una disminución más o menos de 1% en la incidencia del VIH.
- Acabar con la epidemia depende en gran medida de nuestro éxito en lograr rápidamente evitar las nuevas infecciones donde están ocurriendo, diagnosticar cada persona que vive con el VIH en particular en las poblaciones las más afectadas y proporcionar el acceso universal al tratamiento.

ESCENARIO: 90-90-90 (73 DE PVV)

LINEA DE BASE 2013: 69-45-66 (30 DE PVV)

