


Informe Honduras

PERFIL DE RIESGO

DE PERSONAS CON VIH DE LOS PAÍSES

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REGIONAL REDCA+



Editores:

RED CENTROAMERICANA DE PERSONAS CON VIH

Autores:

PROGRAMA REGIONAL REDCA+, UNIDAD COORDINADORA

Sergio Montealegre
Director
Programa Regional REDCA+

Evelyn Cardoza
Especialista en Monitoreo y Evaluación
Programa Regional REDCA+

Julissa Mena Santamaría
Especialista en Monitoreo y Evaluación
Programa Regional REDCA+

Consultor responsable: Mario Salvador Sánchez Domínguez

Elaborado con la asesoría técnica de:

René Leyva Flores
César Infante Xibille
Mishel Unar Munguía
Sergio Montealegre
Martín Romero Martínez

Comité Regional:

Otoniel Ramírez Hernández
Rosa González
Héctor Galindo
Eliseo Orellana
Miguel Orozco
Zaira Pineda

Organizaciones responsables de la recolección de la información
Honduras: Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral

CONTENIDO

ANTECEDENTES	5
JUSTIFICACIÓN	6
OBJETIVOS	6
MATERIAL Y MÉTODOS	7
RESULTADOS	11
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	57
ACRÓNIMOS	59

ANTECEDENTES

En Centroamérica, la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+) tiene más de 11 años trabajando a favor de la atención integral, acceso universal a tratamientos y la reducción de estigma y discriminación hacia las personas con VIH con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

En el marco de las acciones que implementa REDCA+ en Centroamérica se realizó en 2010 un primer estudio para construir el “Perfil socio demográfico-Comportamientos Sexuales-Calidad de Vida”. En esa ocasión, se contó con información de cuatro países de la región: Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua, analizándose información referente a las características sociodemográficas, presencia de redes sociales de apoyo, adicciones, comportamiento sexual, uso de condón,

presencia de infecciones de transmisión sexual, situación de salud, derechos humanos y reporte de estigma y discriminación.

En el estudio realizado durante 2010 la principal restricción metodológica fue que los instrumentos empleados en la recolección de datos y la temporalidad de la misma fueron diferentes en los cuatro países analizados, lo cual tuvo implicaciones a considerarse en el diseño por los posibles sesgos en la medición, así como por la omisión de variables en los casos en los que no se tuvo la información para los cuatro países. Ante lo cual se sugirió unificar el instrumento de recolección de datos y la temporalidad para la recolección de los mismos incluyendo variables que puedan dar una medición más precisa del perfil de riesgo que presentan las personas con VIH en Centroamérica.

En marzo de 2012 se realizó un taller para la integración del instrumento de medición que se empleó para la recolección de información. En dicho taller se contó con la participación de actores clave en materia de prevención y control de VIH en cinco de los siete países que integran la región de Centroamérica. Finalmente gracias al esfuerzo y compromiso de REDCA+, durante los meses de septiembre- diciembre de 2012 se realizó el levantamiento de los datos. Con el presente informe, que describe los resultados obtenidos, se concluye con el diagnóstico basal del perfil del riesgo de las Personas con VIH de los países beneficiados del programa REDCA+.

JUSTIFICACIÓN

Por medio del presente estudio se recolectó información sobre las características sociodemográficas de las Personas con VIH, prácticas sexuales, condición de salud, acceso a servicios de salud, adopción de medidas preventivas (como el uso consistente del condón), la adherencia terapéutica al tratamiento antirretroviral de las Personas con VIH y la perspectiva de futuro.

La información analizada servirá para conocer el perfil de riesgo de las Personas con VIH de Honduras y conocer la frecuencia de uso de condón y la adherencia terapéutica a la terapia antiretroviral con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de esta población por medio de la generación de información apropiada que sirva de insumo para la planeación, implementación y evaluación de los programas de prevención primaria, secundaria y terciaria del VIH/Sida en Honduras.

OBJETIVOS

Objetivo general

Describir el perfil de riesgo de las Personas con VIH que acuden a grupos de autoayuda e individuos entrevistados en sus hogares en Honduras.

Objetivos específicos

1. Describir las características socio-demográficas de las Personas con VIH de Honduras.
2. Conocer la frecuencia de reporte de uso de condón en las Personas con VIH de 18 a 24 años.
3. Conocer la frecuencia de reporte de uso de condón en las Personas con VIH de 25 y más años de edad.
4. Conocer la frecuencia de adherencia a la TARV.

MATERIAL Y MÉTODOS

MARCO MUESTRAL

Se construyó el marco de muestreo con un listado de los Centros de Ayuda de los Servicios de Salud para Personas con VIH (CASS) para personas diagnosticadas con VIH que se obtuvieron a través de la consulta a las autoridades de salud de Honduras.

Se seleccionaron aleatoriamente 17 CASS en Honduras y el tamaño de muestra en cada CASS se seleccionó con probabilidad proporcional al número de personas que se atienden ahí.

Es importante señalar que aunque se seleccionaron de manera probabilística los centros de ayuda que debían encuestar, en muchos de los centros de apoyo no se permitió encuestar a los usuarios, y en otros casos no se encontraron los centros de apoyo

registrados en el listado por lo que se tuvieron que visitar otros centros.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS INDIVIDUOS ENCUESTADOS

Se seleccionó de forma aleatoria a los individuos que asistieron a los centros de ayuda para aplicarles el cuestionario. Se parte del supuesto que el día de visita de un usuario no tiene asociación con sus conductas de riesgo.

Una limitación de este tipo de muestreo es el error de exclusión que resulta del hecho de que no todas las personas diagnosticadas con VIH acuden a los centros de ayuda. Para tratar de cuantificar este error, a cada persona diagnosticada con VIH se le preguntó si conoce alguna persona diagnosticada con VIH que no asista a alguno de los centros del listado. Se realizaron visitas domiciliarias para encuestar a personas que no asisten a centros de ayuda.

TAMAÑO DE MUESTRA

El tamaño de muestra final es de 18 centros de apoyo y 574 individuos encuestados en dichos centros. El número de individuos con VIH encuestados en sus hogares es de 225. En la tabla I se muestran los centros de apoyo encuestados en Honduras y el número de individuos en cada uno.

TABLA I CENTROS DE APOYO EN LA MUESTRA DE HONDURAS

	Obs	Porcentaje
1. HOSPITAL ATLÁNTIDA	8	1.39
2. GAA UNION Y ESPERANZA	23	4.01
3. CAI SALVADOR PAREDES	9	1.57
4. CAI HOSPITAL PROGRESO	32	5.57
5. CAI HMCR	130	22.65
6. CAI/HOSPITAL PUERTO CORTES	8	1.39

7. GAA LAZOS DE AMISTAD	39	6.79
8. CAI/CESAMO MIGUEL PAZ BARAHONA	48	8.36
9. GAA SIEMPRE UNIDOS	14	2.44
10. CAI HOSPITAL SANTA TERESA	27	4.70
11. CAI/HOSPITAL ESCUELA	76	13.24
12. CESAMO CARRIZAL	14	2.44
13. CESAMO ALONSO SUAZO	15	2.61
14. HOSPITAL IHSS / LA GRANJA	10	1.74
15. CAI/HOSPITAL TORAX	72	12.54
16. HOSPITAL SANTA BARBARA	10	1.74
17. CAI/HOSPITAL DEL SUR	29	5.05
18. CAI/SAN LORENZO	10	1.74
Total	574	100.00

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

EFFECTO DE DISEÑO

El parámetro más importante a estimar es la proporción de personas diagnosticadas con VIH que usaron condón durante su última relación sexual. La precisión con la cual se estimó el parámetro depende de la magnitud de éste y del efecto del procedimiento de muestreo (efecto de diseño). Debido a que se encuestaron siete países de Centroamérica y se asignó un tamaño de muestra igual para cada país, y no de modo proporcional a su número de casos de VIH, el efecto de diseño es igual a la siguiente fórmula:

$$DEFF = L \sum_{i=1}^L W_i^2 \quad (1)$$

Donde L es el número de países y w_i es la proporción de casos con VIH en cada país, suponiendo que la varianza es la misma en cada estrato, se obtiene un efecto de diseño (DEFF) de 1.74.

TABLA II. NÚMERO ESTIMADO DE CASOS DE VIH^{1,2}

País	Población 2009	Prevalencia	Casos
Belice	321,115	2.00%	6,422
Costa Rica	4,615,518	0.60%	27,693
El Salvador	6,094,889	0.60%	36,569
Guatemala	12,713,763	1.00%	127,138
Honduras	8,143,564	1.60%	130,297
Nicaragua	5,815,500	0.20%	11,631
Panamá	3,405,813	1.50%	51,087
Total	41,110,162		390,838

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

El segundo elemento que contribuye a aumentar el DEFF es la selección de conglomerados y probabilidades de selección diferentes para cada país. El número de individuos máximo por conglomerado que se obtuvo en toda la encuesta de Centroamérica es de 238. Por lo tanto, el DEFF máximo que se puede esperar por tener un diseño con conglomerados es de 1.54 usando la siguiente fórmula:

$$Deff = 1 + \rho(K - 1) \quad Deff = 1 + \rho(K - 1) \quad Deff = 1 + \rho(K - 1) \quad (2)$$

Donde K es el número de individuos por conglomerado ($k=238$) y ρ es el coeficiente de correlación intra-conglomerado estimado en 0.0023 con datos de la Encuesta sobre Conductas de Riesgo 2011 realizada en Honduras. En consecuencia, el efecto de diseño final que podemos suponer es de 2.68.

Con esta información se calcula la precisión con la que se estimó el parámetro de interés usando la fórmula (3) de semi-amplitudes donde p es la proporción de individuos que usan condón en la última relación sexual, n es el tamaño de muestra y DEFF es el efecto de diseño estimado.

$$d = 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p) \cdot DEFF}{n}} \quad (3)$$

TABLA III. SEMI-AMPLITUD DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LAS ENCUESTAS POR PAÍS (DEFF= 1.54)

Tamaño de muestra	Proporción			
	0.40	0.50	0.60	0.70
250	0.10	0.10	0.10	0.09
300	0.09	0.09	0.09	0.08
350	0.08	0.08	0.08	0.08
400	0.08	0.08	0.08	0.07
450	0.07	0.07	0.07	0.07
500	0.07	0.07	0.07	0.06
550	0.07	0.07	0.07	0.06
600	0.06	0.06	0.06	0.06
650	0.06	0.06	0.06	0.06
700	0.06	0.06	0.06	0.05

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

- Prevalencias obtenidas del Banco Mundial y Poblaciones obtenidas de Wikipedia.
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISH/0,,contentMDK:20418236~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html>
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
- Esta encuesta tiene 4 conglomerados con 200 individuos en cada uno y un DEFF de 1.45 considerando ponderadores.
- $Deff = (1.74) * (1.54) = 2.68$

El tamaño de muestra obtenidas en conjunto en los 7 países en los es de 3,760 encuestas recolectadas los CASS, el error en la estimación de la proporción de personas diagnosticadas con VIH que usaron condón durante su última relación sexual es de 0.03 puntos, mientras que el error en la estimación del parámetro de interés es mayor en las estimaciones para cada país y va de 0.06 para países con 700 personas encuestadas hasta 0.10 para países con 250 personas encuestadas. Para la estimación de la línea basal es recomendable emplear únicamente la muestra obtenida de las CASS (3,760) por contar con todos los sustentos metodológicos previamente mencionados. En este informe se presenta específicamente el análisis de los datos recolectados en Honduras.

DISEÑO METODOLÓGICO

Se aplicó una encuesta en población que vive con VIH y acude a los grupos de auto ayuda en Honduras. El cuestionario aplicado contiene información de los siguientes rubros:

- Antecedentes sociodemográficos
- Participación en grupos de autoayuda y perspectiva de futuro
- Comportamiento sexual
- Conocimientos, opiniones y actitudes respecto al VIH
- Condones
- Situación de salud
- Discriminación, estigma apoyo y derechos
- Uso de alcohol y drogas
- Relaciones sexuales con parejas estables
- Relaciones sexuales con parejas ocasionales
- Relaciones sexuales con parejas comerciales
- Última relación sexual
- Trabajo sexual

PLAN DE ANÁLISIS

Primera fase: Análisis descriptivo

Se realizó un análisis descriptivo de las principales variables de las siguientes secciones:

- Antecedentes sociodemográficos
- Participación en grupos de autoayuda y perspectiva de futuro
- Comportamiento sexual
- Conocimientos, opiniones y actitudes respecto al VIH

- Condones
- Situación de salud
 - » adherencia terapéutica
- Discriminación, estigma apoyo y derechos
- Uso de alcohol y drogas
- Relaciones sexuales con parejas estables
- Relaciones sexuales con parejas ocasionales
- Relaciones sexuales con parejas comerciales
- Última relación sexual
 - » Reporte de uso de condón en última relación sexual estratificado por edad del individuo.
- Trabajo sexual

En el procesamiento de los datos se empleó el programa de cómputo STATA v12.0. Se realizó un análisis descriptivo de proporciones y medidas de tendencia central y dispersión de las principales variables contenidas en las secciones ya mencionadas.

Segunda fase: Análisis bivariado

Teniendo como ejes centrales el uso consistente del condón y la adherencia terapéutica se realizaron modelos bivariados con estas dos variables y algunas de las características sociodemográficas. Se empleó la prueba estadística Chi² para identificar diferencias de proporciones al 95% de confianza estadística. Los datos se presentan en las tablas 6.1, 12.1 y 12.2.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:

La población estudiada son personas hombres y mujeres que viven con VIH en Honduras. El tamaño de la muestra es de 799, de los cuales 574 (72%) fueron encuestados en CASS y 225 (28%) en hogares. En general, la muestra contiene una proporción ligeramente mayor de mujeres (57% en CASS y 61 % en Hogar) que de hombres (43% en CASS y 39% en Hogar).

La edad promedio es de 38 años para individuos de ambos grupos CASS y Hogar. El 88% de CASS y 92% de Hogar refirió que sabe leer y escribir, la mayor parte de la población tiene estudios de primaria a secundaria completa. Respecto al estado civil 35% y 39% en CASS y Hogar, respectivamente refirió ser casado o en unión libre. La mayor parte vive con su familia tanto en la población de los CASS como en la del hogar, 40% de la población de los CASS refirió contar actualmente con empleo remunerado en comparación con 46% para quienes fueron encuestados en el hogar. El ingreso promedio mensual reportado fue de 278 USD para población CASS y 253 USD en grupo Hogar, 62% de la población de los CASS dijo tener dependientes económicos en promedio 2.85 dependientes en comparación con los individuos de Hogar quienes refirieron en 71% tener dependientes con un número promedio de dependientes de 2.63. En la tabla 1 se detalla la distribución de la muestra y las características sociodemográficas por tipo de población encuestada (en centros de auto-apoyo/en hogares).

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p103	¿Cuál es su sexo?	Hombre	244	42.51	87	38.67
		Mujer	330	57.49	138	61.33
		Sin información	0	0.00	0	0.00
p104	¿Sabe leer y escribir?	Sí	503	87.63	207	92.00
		No	70	12.20	17	7.56
		No sabe/No contesta	1	0.17	1	0.44
p105	¿Qué nivel de estudios tiene?	No asistió a la escuela	70	12.20	14	6.22
		Alfabetizada	14	2.44	5	2.22
		Primaria incompleta	100	17.42	44	19.56

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p105	¿Qué nivel de estudios tiene?	Primaria completa	182	31.71	62	27.56
		Secundaria incompleta	63	10.98	39	17.33
		Secundaria completa	119	20.73	53	23.56
		Universitaria incompleta	16	2.79	6	2.67
		Universitaria completa	10	1.74	2	0.89
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
p113	Actualmente ¿Cuál es su estado civil?	Soltero/a	203	35.37	88	39.11
		Casado/a o acompañado/a	242	42.16	88	39.11
		Separado/a o divorciado/a	34	5.92	7	3.11
		Viudo/a	95	16.55	42	18.67
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
p114 * (a-f)	¿Con quién o quiénes vive actualmente?	Vive con su pareja	224	39.02	82	36.44
		Vive con la familia de su pareja	25	4.36	12	5.33
		Vive con su familia	206	35.89	73	32.44
		Vive solo/a	86	14.98	39	17.33
		Vive con un amigo (o)	17	2.96	8	3.56
		Otro	198	34.49	80	35.56
p115	¿Actualmente tiene empleo remunerado?	Si	228	39.72	104	46.22
		No	344	59.93	121	53.78
		No sabe/No contesta	2	0.35	0	0.00
p116_a	¿Qué tipo de empleo le genera su ingreso principal?	Empleo Profesional	70	12.20	1	18.00
		Comerciante	33	5.75	2	22.00
		Estilista	14	2.44	3	7.00
		Empleado/a (tienda, maquila, fabrica)	58	10.10	4	32.00

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p116_a	¿Qué tipo de empleo le genera su ingreso principal?	Domestica	22	3.83	5	19.00
		Vendedor/a ambulante	33	5.75	6	14.00
		Trabajo sexual	14	2.44	7	2.00
		Promotores / Educador	10	1.74	8	4.00
		Negocio propio	14	2.44	9	12.00
		No tengo trabajo	275	47.91	10	77.00
		Otra	31	5.40	11	17.00
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	1.00
p119	Ingreso mensual promedio en USD	Sin ingreso	144	-	40	-
		Con ingreso	425	Media 278	183	Media 253
p120	Número de dependientes económicos	Sin dependientes	193	-	64	-
		Con dependientes	381	Media 2.85	160	Media 2.63


Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 1. NIVEL DE ESCOLARIDAD POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 2. EMPLEO POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PERSPECTIVA DE VIDA FUTURA.

Se preguntó acerca de la percepción de si ellos podían contribuir en algo para detener la epidemia de VIH y en el grupo de los CASS 83% contestó que sí, en comparación con el 89% del grupo Hogar. El uso del condón fue la respuesta más registrada en ambos grupos. 98% del grupo CASS dijo tener planes para el futuro en comparación con 96% para el grupo Hogar; 98% del grupo CASS contestó

que puede hacer algo para incidir positivamente en su salud en comparación con 97% del grupo Hogar. En ambos grupos la mayoría se visualizó en una condición futura mejor que la que tenía en el presente. En la tabla 2 se detallan los resultados, clasificados por tipo de población encuestada.

TABLA 2. PERSPECTIVA DE VIDA FUTURA POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p204	¿Considera que usted puede contribuir en algo para detener la epidemia de VIH?	Si	474	82.58	201	89.33
		No	90	15.68	9	4.00
		No sabe/No contesta	3	0.52	5	2.22
		Sin información	7	1.22	10	4.44
p205 *(a-h)	¿Cómo puede contribuir a detener la epidemia de VIH?	Usando condón en todas mis relaciones sexuales	393	68.47	148	65.78
		Tomando mis medicamentos sin interrupción	379	66.03	172	76.44
		Siendo fiel o teniendo una sola pareja	215	37.46	94	41.78
		No teniendo sexo	108	18.82	66	29.33
		Participando activamente en alguna ONG	82	14.29	34	15.11
		Cuidando mi salud	356	62.02	162	72.00
		No hay nada que yo pueda hacer	8	1.39	1	0.44
		Otro	41	7.14	16	7.11
p206	¿Tiene usted planes para el futuro?	Si	564	98.26	216	96.00
		No	5	0.87	3	1.33
		No sabe/No contesta	3	0.52	1	0.44
		Sin información	2	0.35	5	2.22
p207	¿Cree usted que puede hacer algo para incidir positivamente en su futuro?	Si	565	98.43	219	97.33
		No	4	0.70	1	0.44
		No sabe/No contesta	4	0.70	1	0.44
		Sin información	1	0.17	4	1.78

TABLA 2. PERSPECTIVA DE VIDA FUTURA POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p208	¿Considera que en el futuro usted estará mejor, peor o igual que ahora?	Igual	15	2.61	3	1.33
		Mejor	549	95.64	216	96.00
		Peor	3	0.52	0	0.00
		No sabe/No contesta	6	1.05	2	0.89
		Sin Información	1	0.17	4	1.78

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 3. PERSPECTIVA DE VIDA FUTURA



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

COMPORTAMIENTO SEXUAL

En esta sección se preguntó acerca de la identidad sexual con base en las prácticas sexuales. En términos generales, en ambos grupos las mujeres se definieron como heterosexual en 98% en el grupo CASS y 99% en el grupo Hogar. En el grupo de hombres de CASS 70% se definió como heterosexual, 12 como bisexual y 14% como homosexual comparado con las cifras del grupo hogar que son: 80%, 6% y 13%, respectivamente.

Referente al género 96% de las mujeres del grupo CASS y 94% en el grupo Hogar, definieron su rol de género como femenino. En el grupo de hombres CASS 89% lo definió como masculino y 93% en el grupo Hogar. 6% de las mujeres de CASS refirió haber tenido prácticas sexuales con parejas de su mismo sexo en comparación con 5% del grupo Hogar. En el caso de los hombres los porcentajes fueron de 31 y 22% para los grupos CASS y Hogar, respectivamente. Más del 56% de las mujeres (de ambos grupos) dijo usar un método anticonceptivo posterior a conocer su estatus serológico, el mayormente referido fue el condón seguido de método quirúrgico. El motivo mayormente referido dentro del grupo de mujeres que no usa anticonceptivos es porque no lo consideran necesario. En las tablas 3 y 3.1 se detallan las variables de comportamiento sexual por grupo de población y por sexo.

TABLA 3. COMPORTAMIENTO SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN. SECCIÓN SOLO PARA MUJERES


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=330)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=138)	%
p304_a	Por sus prácticas sexuales ¿Cómo se identifica? (Solo para mujeres)	Heterosexual	324	98.18	136	98.55
		Bisexual	4	1.21	2	1.45
		Homosexual	1	0.30	0	0.00
		Sin información	1	0.30	0	0.00
p305_a	¿Su identidad de género es?	Femenino	318	96.36	130	94.20
		Masculino	10	3.03	8	5.80
		Trans	1	0.30	0	0.00
		Sin información	1	0.30	0	0.00
p306	Durante los últimos 12 meses ¿ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo?	Si	20	6.06	7	5.07
		No	309	93.64	131	94.93
		No sabe/No contesta	1	0.30	0	0.00
p314	Después de conocer que ud es una persona con VIH, ¿utiliza algún método de planificación familiar?	Si	184	55.76	80	57.97
		No	140	42.42	58	42.03
		No sabe/No contesta	3	0.91	0	0.00
		Sin información	3	0.91	0	0.00

TABLA 3. COMPORTAMIENTO SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN. SECCIÓN SOLO PARA MUJERES

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=330)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=138)	%
p315 *(a-h)	¿Qué métodos de planificación familiar utiliza?	Pastillas anticonceptivas	16	4.85	5	3.62
		Métodos inyectables	2	0.61	2	1.45
		Dispositivos intrauterinos	4	1.21	6	4.35
		Condomes o preservativos	148	44.85	61	44.20
		Esterilización quirúrgica	62	18.79	32	23.19
		Métodos naturales (Billings, temperatura o calendario)	1	0.30	1	0.72
		No utiliza ningún método de planificar	0	0.00	1	0.72
		Otros	2	0.61	0	0.00
p316_a	¿Por qué motivo no utiliza métodos de planificación familiar?	Se quiere embarazar	4	1.21	1	0.72
		No sabe dónde conseguirlos	0	0.00	0	0.00
		No lo considera necesario	42	12.73	12	8.70
		Su pareja se lo prohíbe	4	1.21	2	1.45
		No le gustan	3	0.91	1	0.72
		Otro	116	35.15	33	23.91
		Sin Información	161	48.79	89	64.49

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 4. IDENTIDAD SEXUAL Y PRÁCTICAS SEXUALES EN MUJERES POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

TABLA 3.1. COMPORTAMIENTO SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN. SECCIÓN SOLO PARA HOMBRES


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=244)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=87)	%
p317_a	¿Cómo se identifica sexualmente? (Solo para hombres)	Heterosexual	172	70.49	70	80.46
		Bisexual	30	12.30	5	5.75
		Homosexual	34	13.93	11	12.64
		Otro	6	2.46	0	0.00
		Sin información	0	0.00	1	1.15
p318_a	¿Su identidad de género es?	Femenino	23	9.43	2	2.30
		Masculino	217	88.93	81	93.10
		Trans	2	0.82	2	2.30
		Otro	0	0.00	1	1.15
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	2	0.82	1	1.15

TABLA 3.1. COMPORTAMIENTO SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN. SECCIÓN SOLO PARA HOMBRES

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=244)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=87)	%
p319	Durante los últimos 12 meses ¿ha tenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, o con homosexuales o Trans?	Si	75	30.74	19	21.84
		No	166	68.03	67	77.01
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	3	1.23	1	1.15

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 5. IDENTIDAD SEXUAL Y PRÁCTICAS SEXUALES EN HOMBRES POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

CONOCIMIENTO, OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO AL VIH

Se indagó acerca de la percepción de riesgo para reinfección por VIH a lo cual, en la población CASS, 17% contestó que percibe su riesgo como alto, 26% como medio, 27% como bajo, 24% no percibe ningún riesgo y 5% dijo no saber, en el grupo Hogar los porcentajes encontrados fueron: 17%, 21%, 38%, 21% y 3%, respectivamente. Al preguntárseles que pueden hacer para


prevenir la reinfección 93% (CASS) y 90% (Hogar) mencionó el uso consistente del condón, 27% (CASS) y 50% (Hogar) la abstinencia sexual. En la tabla 4 se detalla la información diferenciándola por tipo de población encuestada.

TABLA 4. PRÁCTICAS SEXUALES, PERCEPCIÓN DE RIESGO Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS. POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p420	Ud considera que su riesgo de re-infectarse por VIH es:	Alto	100	17.42	38	16.89
		Medio	150	26.13	47	20.89
		Bajo	156	27.18	85	37.78
		Ningún riesgo	137	23.87	48	21.33
		No sabe	29	5.05	6	2.67
		Sin información	2	0.35	1	0.44
p421 (a-d)	¿Qué pueden hacer las personas con VIH para prevenir la reinfección?	Usar condón en toda relación sexual	535	93.21	203	90.22
		No tener relaciones sexuales	154	26.83	113	50.22
		No pueden hacer nada	5	0.87	5	2.22
		Otra	19	3.31	3	1.33
p423	¿En el último año ha participado en actividades de información o educación sobre VIH y sida, tales como charlas, talleres?	Si	213	37.11	59	26.22
		No	355	61.85	129	57.33
		No contesta	6	1.05	37	16.44

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 6. PERCEPCIÓN DE RIESGO DE REINFECCIÓN DE VIH POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

ACCESIBILIDAD A CONDONES

La mayor parte de la población de ambos grupos refirió que conseguir un condón es entre fácil y muy fácil, 95% de CASS dijo que se los regalan en comparación con 94% del grupo hogar. En el subgrupo de quienes contestaron que es difícil o muy difícil conseguir condones, la principal razón

identificada es porque les da pena comprarlos 71% CASS y 100% Hogar. En la tabla 5 se detallan las variables de accesibilidad a condones diferenciándola por tipo de población.

TABLA 5. ACCESIBILIDAD A CONDONES POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p502	¿Para usted conseguir un condón es?	Muy fácil	109	18.99	98	43.56
		fácil	442	77.00	114	50.67
		Difícil	13	2.26	1	0.44
		Muy difícil	1	0.17	1	0.44
		No sabe	1	0.17	3	1.33
		Sin información	8	1.39	8	3.56

TABLA 5. ACCESIBILIDAD A CONDONES POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p503 *(a-e)	¿Por qué le es fácil conseguir un condón?	Me los regalan	526	95.46	200	94.34
		Son baratos	168	30.49	83	39.15
		Esta cerca el lugar donde compro	49	8.89	42	19.81
		No me da pena	162	29.40	77	36.32
		Otro	11	2.00	0	0.00
p504 (a-f)	¿Por qué le es difícil conseguir un condón?	Me da pena comprar	10	71.43	2	100.00
		No sé dónde conseguirlos	0	0.00	1	50.00
		No tengo dinero para comprar	3	21.43	0	0.00
		Cuando voy a buscar nunca hay	0	0.00	0	0.00
		Son muy caros	1	7.14	0	0.00
		Otro	2	14.29	0	0.00
		p506(a-l)	¿En dónde consiguió condones la última vez?	Supermercado/ Tienda	60	10.45
Farmacia	126			21.95	54	24.00
Clínica Privada	5			0.87	4	1.78
Night Club/ Bar/Disco	3			0.52	1	0.44
Hotel/motel/ hospedaje	14			2.44	1	0.44
PASMO	11			1.92	4	1.78
En el mismo sitio o negocio de trabajo sexual	0			0.00	0	0.00
Gasolinera	37			6.45	7	3.11
Organización (ONG)	20			3.48	9	4.00
Profamilia	4			0.70	3	1.33
Otro	448			78.05	171	76.00
p510 (a-i)	¿Qué tipo de lubricantes usa durante las relaciones sexuales?	No uso	451	78.57	173	76.89
		Lubricante a base de agua	107	18.64	33	14.67

TABLA 5. ACCESIBILIDAD A CONDONES POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p510 (a-i)	¿Qué tipo de lubricantes usa durante las relaciones sexuales?	Vaselina	1	0.17	1	0.44
		Cremas para la piel o de mano	0	0.00	2	0.89
		Gel vaginal	0	0.00	2	0.89
		Aceite de bebé	1	0.17	1	0.44
		Mantequilla	0	0.00	1	0.44
		Aceite de cocinar	0	0.00	1	0.44
		Saliva	5	0.87	2	0.89
		Otro	24	4.18	14	6.22


Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 7. ACCESIBILIDAD A CONDONES POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 8. USO DE LUBRICANTES POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

SITUACIÓN DE SALUD

En esta sección se exploró, en el total de la población, información que nos permitiera conocer el estado de salud de las Personas con VIH. Cuando se preguntó en que condición se realizaron la prueba de VIH mediante la cual se enteraron de su estatus serológico, 43% en el grupo CASS y 39% en el grupo Hogar refirió que fue por enfermedad. Las principales instituciones en que se realizaron las pruebas fueron los hospitales públicos y los centros de salud

para ambos grupos. El 99% de los CASS y 98% de Hogar, refirió estar actualmente en control médico. Al preguntar acerca de la percepción del estado de salud actual, el 40% en el grupo CASS y 42% en el grupo Hogar lo refirió como muy bueno. En el grupo CASS 70% refirió que el servicio de Salud le proporciona de forma completa y gratuita los medicamentos antirretrovirales en comparación con 69% del grupo Hogar. 18% en el Grupo CASS refirió haber tenido efectos adversos producidos por la TARV comparado con 20% en el grupo Hogar.

Dentro del grupo que refirió estar en TARV, 9% de CASS y Hogar refirió haberla suspendido por indicación propia en algún momento. Referente al recuento de CD4 98% del grupo CASS refirió habérselo realizado en alguna ocasión en comparación con 100% del grupo Hogar. A continuación, en las Tablas 6, 6.1 y 6.2 se detalla más información acerca del estado de salud, cuidados preventivos y adherencia terapéutica por tipo de población.

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p601	¿Cuándo se enteró de su diagnóstico VIH cuál fue la razón por la que usted decidió hacerse la prueba de VIH?	Voluntario	102	17.77	39	17.33
		Solicitado	79	13.76	31	13.78
		Porque estaba enfermo	247	43.03	88	39.11
		Porque mi pareja fue diagnosticada con VIH o Sida	130	22.65	60	26.67
		Cuando donó sangre	8	1.39	7	3.11
		No sabe/No contesta	8	1.39	0	0.00
p603_a	¿Dónde se hizo la prueba de VIH?	Centro de Salud	135	23.52	61	27.11
		Hospital Público	333	58.01	123	54.67
		Clínica/Laboratorio privado	83	14.46	35	15.56
		En una organización (ONG)	8	1.39	1	0.44
		Banco de sangre	2	0.35	0	0.00
		Cruz Roja	3	0.52	3	1.33
		Otro	9	1.57	2	0.89
		No sabe/No contesta	1	0.17	0	0.00
p605	¿Actualmente está asistiendo a control médico por ser una persona con VIH?	Si	568	98.95	221	98.22
		No	3	0.52	1	0.44
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	3	0.52	3	1.33
p607(a-k)	¿Qué tipo de servicios recibe cuando asiste a control médico por ser una persona con VIH?	Examen médico	541	94.25	209	92.89
		Tratamiento antirretroviral	550	95.82	212	94.22
		Tratamiento por enfermedades oportunistas	111	19.34	62	27.56

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p607(a-k)	¿Qué tipo de servicios recibe cuando asiste a control médico por ser una persona con VIH?	Exámenes de laboratorio	552	96.17	213	94.67
		Exámenes especiales CD4 y carga viral	560	97.56	211	93.78
		Seguimiento de problemas	33	5.75	14	6.22
		Atención en el hogar	21	3.66	5	2.22
		Consejería y educación	219	38.15	105	46.67
		Visitas domiciliarias	124	21.60	148	65.78
		Entrega de víveres/ nutrición	57	9.93	43	19.11
		Otro	3	0.52	1	0.44
p609(a-s)	¿Qué acciones realiza para cuidar su salud?	No hace nada	1	0.17	2	0.89
		Usa condón todas las veces que tiene relaciones sexuales	385	67.07	127	56.44
		Usa condón con las personas que no conoce	68	11.85	10	4.44
		Usa condón solo con su(s) pareja(s) estable(s)	75	13.07	6	2.67
		Usa condón algunas veces	34	5.92	3	1.33
		No tiene relaciones sexuales con personas desconocidas	160	27.87	66	29.33
		No tiene relaciones sexuales vaginales	247	43.03	102	45.33
		No tiene relaciones sexuales anales	192	33.45	82	36.44

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p609(a-s)	¿Qué acciones realiza para cuidar su salud?	No tiene relaciones sexuales orales	220	38.33	83	36.89
		Practica la abstinencia	169	29.44	76	33.78
		Practica la fidelidad mutua con su pareja	210	36.59	85	37.78
		Ha reducido el número de parejas sexuales	219	38.15	77	34.22
		Asiste a las consejerías, asiste a revisiones periódicas de los se	357	62.20	151	67.11
		Es miembro de un grupo de auto apoyo	275	47.91	64	28.44
		No consume alcohol	262	45.64	127	56.44
		No consume drogas	243	42.33	114	50.67
		Ha mejorado su alimentación	522	90.94	206	91.56
		Toma los medicamentos que le han recetado	544	94.77	201	89.33
p610 (a-n)	¿Qué lo motivó a tomar acciones para cuidar su salud?	Otro	40	6.97	15	6.67
		Nada me motiva	1	0.17	2	0.89
		Los mensajes de la radio	15	2.61		
		Los mensajes de la televisión	8	1.39	2	0.89
		Información escrita que ha leído	32	5.57	19	8.44
		Las conversaciones con amigos (as)	51	8.89	10	4.44

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p610 (a-n)	¿Qué lo motivó a tomar acciones para cuidar su salud?	Las charlas recibidas de ONG'S	43	7.49	11	4.89
		Sus creencias religiosas	54	9.41	25	11.11
		La muerte de una persona cercana	73	12.72	34	15.11
		Amor a sus hijos, familiares y/o pareja	426	74.22	153	68.00
		Amor propio, autoestima	535	93.21	193	85.78
		Asistir a los grupos de auto apoyo	170	29.62	51	22.67
		Quiero vivir	537	93.55	212	94.22
		Programa de visita domiciliar	94	16.38	83	36.89
	Otro	8	1.39	2	0.89	
p611	¿Ha tenido algún problema de salud o infección en los últimos 3 meses?	Sí	109	18.99	42	18.67
		No	460	80.14	183	81.33
		No sabe	0	0.00	0	0.00
		Sin información	5	0.87	0	0.00
p612(a-n)	¿En los últimos 3 meses ha presentado...?	Fiebre prolongada	55	9.58	19	8.44
		Diarrea	21	3.66	7	3.11
		Depresión	27	4.70	9	4.00
		Tos	63	10.98	25	11.11
		Abscesos en la piel	3	0.52	3	1.33
		Herpes	18	3.14	2	0.89
		Ganglios inflamados	13	2.26	2	0.89
		Enfermedades de la piel	12	2.09	7	3.11
		Convulsiones	2	0.35	2	0.89
		Dolor de cabeza persistente	73	12.72	20	8.89
		Candidiasis oral	7	1.22	2	0.89

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p612(a-n)	¿En los últimos 3 meses ha presentado...?	Neumonía	7	1.22	0	0.00
		Tuberculosis	16	2.79	5	2.22
		Otro	54	9.41	9	4.00
p613(a-i)	¿La última vez que presentó estos problemas de salud que hizo usted?	No hice nada	11	1.92	6	2.67
		Consultó en el servicio de salud donde asiste a control	103	17.94	39	17.33
		Consultó a otro médico particular	12	2.09	6	2.67
		Le recetaron medicamentos	70	12.20	27	12.00
		Tomó los medicamentos que le indicaron	64	11.15	26	11.56
		No le entregaron ninguno de los medicamentos en servicio de salud	12	2.09	2	0.89
		Tuvo que comprar algunos o todos los medicamentos	46	8.01	14	6.22
		El servicio de S le entregó unos medicamentos, no todos	64	11.15	21	9.33
		Otro	8	1.39	2	0.89
		p619	¿Usted diría que su estado de salud actual es?	Muy bueno	229	39.90
Bueno	186			32.40	58	25.78
Estable	99			17.25	65	28.89
Regular	59			10.28	8	3.56
Malo	0			0.00	0	0.00
No sabe/No contesta	0			0.00	0	0.00
Sin información	1			0.17	0	0.00

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p620	¿De qué manera le proporciona el servicio de salud sus medicamento	Completa y gratuita	400	69.69	155	68.89
		Solo completa	128	22.30	33	14.67
		Solo gratuita	39	6.79	35	15.56
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	7	1.22	2	0.89
p623	¿Actualmente está tomando antirretrovirales?	Si	546	95.12	199	88.44
		No	24	4.18	26	11.56
		No sabe/No contesta	4	0.70	0	0.00
p625(a-e)	¿Quién le brinda la atención en su control por terapia antirretroviral?	Médico especialista	217	37.80	103	45.78
		Médico general	333	58.01	99	44.00
		Enfermera	22	3.83	5	2.22
		Consejera	9	1.57	1	0.44
		Otro	2	0.35	0	0.00
p626	¿Conoce que medicamentos antirretrovirales está tomando?	Si	509	93.22	187	93.97
		No	36	6.59	11	5.53
		No contesta				
		Sin información	1	0.18	1	0.50
p627	¿Ha tenido efectos adversos producidos por la terapia antirretroviral?	Si	99	18.13	39	19.60
		No	446	81.68	160	80.40
		Sin información	1	0.18	0	0.00
p628(a-k)	¿Qué hizo usted cuando se presentaron efectos adversos por la terapia antirretroviral?	Le cambiaron el esquema de tratamiento antirretroviral	42	7.69	14	7.04
		Consultó a su médico en el servicio de salud	69	12.64	27	13.57
		Consultó a otro médico particular	1	0.18	1	0.50
		Suspendió la terapia sin consultar con nadie	7	1.28	7	3.52

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p628(a-k)	¿Qué hizo usted cuando se presentaron efectos adversos por la terapia antirretroviral?	No suspendió la terapia	45	8.24	20	10.05
		Siguió las indicaciones de su médico en el servicio de salud	41	7.51	21	10.55
		Acudió a la ONG	0	0.00	0	0.00
		Acudió a un amigo o pariente	2	0.37	0	0.00
		Acudió al educador o consejero del servicio de salud	4	0.73	1	0.50
		No hizo nada	1	0.18	2	1.01
		Otros	7	1.28	0	0.00
p629	¿Desde que comenzó con su terapia antirretroviral, alguna vez la ha suspendido por indicación propia?	Si	47	8.61	17	8.54
		No	498	91.21	182	91.46
		No sabe/No contesta	1	0.18		
p630(a-g)	¿Cuáles son las razones por las que usted ha faltado en tomar su medicamento?	Por el costo	2	4.26	0	0.00
		Porque no hay (escasez)	1	2.13		
		Causan efectos secundarios	14	29.79	6	35.29
		Es difícil recordar	19	40.43	0	0.00
		Es difícil/complicado tomarlo	11	23.40	0	0.00
		He faltado a mis citas médicas	15	31.91	5	29.41
		Otro	11	23.40	6	35.29
p631(a-g)	¿Qué efectos tiene en una persona con VIH tomar medicamentos antirretrovirales?	Se enferma menos	542	94.43	220	97.78
		Vive más tiempo	408	71.08	176	78.22
		Menos probabilidad de transmitir VIH	276	48.08	66	29.33

TABLA 6. SITUACIÓN DE SALUD POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p631(a-g)	¿Qué efectos tiene en una persona con VIH tomar medicamentos antirretrovirales?	Se enferma mas	5	0.87	1	0.44
		Muere más rápido	0	0.00	0	0.00
		Ningún efecto	2	0.35	3	1.33
		Otro	7	1.22	0	0.00
p632	¿Se ha realizado el examen de CD4?	Si	565	98.43	224	99.56
		No	6	1.05	1	0.44
		Sin Información	3	0.52	0	0.00
p633	¿Conoce los resultados de su último examen de CD4?	Si	494	86.06	174	77.33
		No	70	12.20	49	21.78
		No sabe/No contesta	10	1.74	2	0.89
p635	¿Se ha realizado el examen de carga viral?	Si	561	97.74	224	99.56
		No	10	1.74	1	0.44
		Si información	3	0.52	0	0.00
p636	¿Conoce los resultados de su último examen de carga viral?	Si	478	85.20	170	75.89
		No	82	14.62	53	23.66
		Sin información	1	0.18	1	0.45
p638	Después de saber que es una persona con VIH ¿Ha recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis?	Si	174	30.31	99	44.00
		No	398	69.34	126	56.00
		Sin información	2	0.35	0	0.00
p639	Siendo ud. una persona con VIH ¿Se ha enfermado de tuberculosis?	Si	93	16.20	41	18.22
		No	479	83.45	184	81.78
		Sin información	2	0.35	0	0.00
p640	Siendo usted una persona con VIH ¿Ha recibido tratamiento para curar tuberculosis?	Si	89	15.51	39	17.33
		No	483	84.15	186	82.67
		No sabe/No contesta	2	0.35	0	0.00


Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 9. MOTIVO DE CONOCIMIENTO DE ESTATUS SEROLÓGICO POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 10. TARV Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA



En el gráfico se presenta primero la población con y sin TARV y dentro de la submuestra de los que están en TARV se presenta posteriormente la población que la suspendió o no.

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

ADHERENCIA TERAPÉUTICA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

En la población mayor de 24 años encuestada en CASS se encontró

un auto-reporte de adherencia terapéutica del 91.5% en comparación con 91.01% del grupo Hogar. A continuación en la tabla 6.1 se detalla información acerca de la adherencia terapéutica en personas mayores de 24 años, diferencias por tipo de población y comparada por algunas variables que pueden ser de interés.

TABLA 6.1 PORCENTAJE DE PERSONAS > 24 AÑOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA CON ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV), POR TIPO DE POBLACIÓN

Variable		Surveyed individuals at CASS			Surveyed individuals at home		
		Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí	Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí
General	Reporte de Adherencia TARV	507	464	91.52	189	172	91.01
Sexo	Mujer	301	280	93.02	118	105	88.98
	Hombre	206	184	89.32	71	67	94.37
	Sin información	0	0	0	0	0	0
Prácticas sexuales	Heterosexual	454	416	91.63	178	162	91.01
	Bisexual	24	23	95.83	3	3	100
	Homosexual	22	21	95.45	7	6	85.71
	Otro	5	3	60.00***	0	0	0
	Sin información	2	1	50.00	1	1	100
Tercil de ingreso mensual	Ingreso bajo (incluye sin ingreso)	170	153	90.00	50	44	88
	Ingreso medio	166	151	90.96	76	69	90.79
	Ingreso alto	166	156	93.98	62	58	93.55
	Sin información	5	4	80.00	1	1	100
Educación	No asistió a la escuela	67	65	97.01	13	13	100
	Alfabetizada	13	13	100	5	5	100
	Primaria incompleta	98	91	92.86	42	35	83.33
	Primaria completa	160	146	91.25*	57	55	96.49
	Secundaria incompleta	53	47	88.68*	28	24	85.71
	Secundaria completa	96	82	85.42**	40	37	92.5
	Universitaria incompleta	10	10	100	3	2	66.67

TABLA 6.1 PORCENTAJE DE PERSONAS > 24 AÑOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA CON ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV), POR TIPO DE POBLACIÓN

Variable		Surveyed individuals at CASS			Surveyed individuals at home		
		Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí	Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí
Educación	Universitaria completa	10	10	100	1	1	100
	Sin información	0	0	0	0	0	0

Significancia estadística * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.001$

1. Pruebas estadísticas realizadas con regresión multilogit usando efecto de diseño para la muestra de individuos encuestados en CASS
Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

DISCRIMINACIÓN, ESTIGMA, APOYO Y DERECHOS

Con el propósito de conocer si las Persona con VIH cuentan con el apoyo de redes sociales se preguntó si su familia conocía su estatus serológico a la cual el 77 y 75% de CASS y Hogar respectivamente, respondió que sí y 69% del grupo CASS y 67% del grupo Hogar dijo contar actualmente con el apoyo de su familia, en el 7% del grupo CASS se encontró que algún miembro de la familia le ha manifestado desprecio o rechazo por ser una Persona con VIH, en comparación con el 9% encontrado en el grupo Hogar.

Respecto a actitudes concretas de discriminación, el 83% en el grupo CASS dijo haber sufrido violencia verbal y 88% exclusión de la convivencia familiar, en comparación con 76 y 81% respectivamente para el grupo Hogar. En el marco de los derechos, 77% en el grupo CASS refirió conocer la existencia de leyes que protegen a las

Personas con VIH en comparación con 82% en el grupo Hogar, y estar dispuestos a denunciar algún acto de violación de estos derechos en contra de su persona (83 y 81%) para los respectivos grupos. En el grupo de quienes dijeron no estar dispuestos a denunciar estos hechos la principal razón mencionada en ambos grupos fue que denunciar no cambiara en nada las cosas. En la tabla 7 se detalla más información acerca de reporte de estigma, discriminación y derechos, diferenciada por tipo de población.

TABLA 7 DISCRIMINACIÓN, ESTIGMA, APOYO Y DERECHOS POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p707	¿Su familia sabe que usted es una persona con VIH?	Si	441	76.83	168	74.67
		No	131	22.82	57	25.33
		No sabe/No contesta	2	0.35	0	0.00
p708_a	¿Qué hizo su familia cuando se enteró de su diagnóstico?	Me apoyaron	383	66.72	151	67.11
		Me rechazaron	27	4.70	15	6.67
		Me abandonaron	4	0.70		
		No hicieron nada	23	4.01	3	1.33
		Mi familia no sabe	125	21.78	49	21.78
		Otros	9	1.57	4	1.78
		No sabe/No contesta	3	0.52	3	1.33
p709	¿Alguien de su familia le ha mostrado desprecio, rechazo por ser una persona con VIH?	Si	42	7.32	21	9.33
		No	529	92.16	199	88.44
		No sabe/No contesta	3	0.52	5	2.22
p710(a-f)	¿Cómo ha sido el rechazo que recibió de su familia?	Le excluyeron de convivencias familiares	37	88.10	17	80.95
		Ha tenido que cambiar de domicilio	15	35.71	5	23.81
		Violencia física contra usted	3	7.14	2	9.52
		Violencia sexual contra usted	0	0.00	1	4.76
		Violencia verbal contra usted	35	83.33	16	76.19
		Otra	2	4.76	0	0.00
p711	Actualmente, ¿recibe apoyo de algunos de sus familiares?	Si	395	68.82	150	66.67
		No	177	30.84	74	32.89
		No sabe/No contesta	2	0.35	1	0.44

TABLA 7 DISCRIMINACIÓN, ESTIGMA, APOYO Y DERECHOS POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p715	¿Conoce si existe alguna ley que proteja a las personas con VIH?	Si	442	77.00	184	81.78
		No	130	22.65	38	16.89
		No sabe/No contesta	1	0.17	2	0.89
		Sin información	1	0.17	1	0.44
p716	¿Denunciaría usted un acto de violación a sus derechos?	Si	477	83.10	182	80.89
		No	50	8.71	41	18.22
		No sabe/No contesta	34	5.92	2	0.89
		Sin información	13	2.26	0	0.00
p717(a-f)	¿Por qué no denunciaría usted un acto de violación a sus derechos?	No cambiaría nada con hacerlo	35	36.08	30	69.77
		Se darían cuenta que soy una persona con VIH	53	54.64	21	48.84
		Para proteger a mi familia	21	21.65	6	13.95
		No sabe cómo hacerlo	6	6.19	4	9.30
		No tiene tiempo	1	1.03	16	37.21
		Otro	6	6.19	1	2.33

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 11. REPORTE DE DISCRIMINACIÓN POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

USO DE ALCOHOL Y DROGAS

Se exploró el consumo de alcohol encontrándose que 15% en el grupo CASS y 12% en el grupo Hogar reportó haber consumido alcohol/licor en el último mes. Al explorar el consumo de drogas se encontró en el grupo de CASS que 7% respondió haber probado algún tipo de droga en alguna

ocasión y en el grupo Hogar 4% respondió lo mismo. La droga más frecuentemente mencionada en ambos grupos fue la marihuana fumada.

Respecto al uso de drogas inyectadas, en el grupo CASS 0.5% de la población total refirió haberse inyectado drogas alguna vez, en comparación con 0% del grupo Hogar. En el subgrupo CASS que refirió haberse inyectado drogas alguna vez, 33% (1) refirió haber compartido la aguja en los encuestados en CASS. A continuación se detalla información sobre consumo de alcohol y drogas diferenciada por tipo de población (Tabla 8).

TABLA 8. REPORTE DE USO DE ALCOHOL Y DROGAS POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p801	¿Usted ha tomado alcohol o licor durante el último mes?	Si	87	15.16	26	11.56
		No	485	84.49	199	88.44
		No sabe/No contesta	2	0.35	0	0.00
p803	¿Usted alguna vez ha probado drogas?	Si	41	7.14	10	4.44
		No	528	91.99	214	95.11
		No sabe/No contesta	5	0.87	1	0.44

TABLA 8. REPORTE DE USO DE ALCOHOL Y DROGAS POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p804(a-k)	En el último año ¿usted ha...?	Fumado marihuana	26	63.41	5	50.00
		Fumado piedra o crack?	9	21.95	1	10.00
		Inhalado piedra o crack?	6	14.63	1	10.00
		Inhalado cocaína?	23	56.10	4	40.00
		Inyectado cocaína	1	2.44	0	0.00
		Inyectado heroína	0	0.00	0	0.00
		Inhalado thiner o resistol?	3	7.32	0	0.00
		Consumido éxtasis	2	4.88	0	0.00
		Tomado anfetaminas?	0	0.00	0	0.00
		Tomado diazepam?	0	0.00	0	0.00
Usado otra droga?	4	9.76	0	0.00		
p806	¿Alguna vez se ha inyectado droga?	Si	3	0.52	0	0.00
		No	561	97.74	225	100.00
		No sabe/No contesta	10	1.74	0	0.00
p807	Cuando se ha inyectado droga, ¿otra persona se inyectó antes o después de usted con la jeringa, aguja, u otro equipo de inyección que usted usó?	Si	1	33.33	0	0.00
		No	2	66.67	0	0.00
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 12. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS ESTABLES

En la población encuestada en CASS, 45% refirió tener pareja estable al momento de la encuesta, en el grupo Hogar 40% lo refirió. Entendiéndose por

pareja estable: personas con las que tuvo relaciones sexuales que no le pagaron y que mantiene una relación afectiva/constante/regular/ por ejemplo su conyugue, novio o marido, aunque no vivan en la misma casa. 64% en CASS y 77% en Hogar que refirieron tener pareja estable refirieron también que su pareja es una Persona con VIH (pareja seroconcordante). En la tabla 9 se detalla más información acerca de relaciones sexuales con parejas estables, diferenciada por tipo de población.

TABLA 9. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS ESTABLES POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p901	¿Actualmente tiene pareja estable?	Si	256	44.60	91	40.44
		No	314	54.70	132	58.67
		No sabe/No contesta	4	0.70	2	0.89
p902	¿Su pareja estable es una persona con VIH?	Sí	164	64.06	70	76.92
		No	91	35.55	20	21.98
		No tengo pareja estable	1	0.39	1	1.10
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00

TABLA 9. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS ESTABLES POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p904	¿Su pareja estable sabe que usted es una persona con VIH?	Sí	241	94.14	87	95.60
		No	14	5.47	3	3.30
		No tengo pareja estable	1	0.39	1	1.10
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
p905	La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable ¿usaron un condón?	Sí	229	89.45	77	84.62
		No	23	8.98	12	13.19
		No sabe/No contesta	4	1.56	2	2.20
p906	¿Quién propuso el uso de condón en esa oportunidad?	Yo misma (o)	103	44.98	19	24.68
		Mi pareja	19	8.30	6	7.79
		Decisión conjunta	106	46.29	52	67.53
		No sabe/No contesta	1	0.44	0	0.00
p907(a-i)	¿Por qué no usaron un condón usted y su pareja sexual estable la última vez que tuvieron relaciones sexuales?	Confío en mi pareja	1	3.70	0	0.00
		Está sano	0	0.00	0	0.00
		Mi pareja no quiso usar	16	59.26	8	57.14
		Yo no quise usar	7	25.93	4	28.57
		Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	1	3.70	0	0.00
		No tenía un condón en ese momento	0	0.00	0	0.00
		Los condones son muy caros	0	0.00	0	0.00
		Los condones no funcionan	0	0.00	0	0.00
		Otra	5	18.52	1	7.14

TABLA 9. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS ESTABLES POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p908	La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable con un condón, ¿usaron lubricante todo el tiempo de la penetración?	Si	34	13.28	8	8.79
		No	198	77.34	76	83.52
		No uso lubricante con mi pareja estable	21	8.20	7	7.69
		No sabe/No contesta	3	1.17	0	0.00
p909	¿En el último año, con qué frecuencia usó ud. condones con su pareja sexual estable?	Siempre	215	83.98	76	83.52
		Algunas veces	23	8.98	6	6.59
		Nunca	15	5.86	8	8.79
		No contesta	3	1.17	1	1.10
p910	¿En el último mes, con qué frecuencia usó ud. lubricante con su pareja sexual estable?	Siempre	31	12.11	5	5.49
		Algunas veces	38	14.84	11	12.09
		Nunca	185	72.27	75	82.42
		No contesta	2	0.78	0	0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 13. PRÁCTICAS SEXUALES PROTEGIDAS CON PAREJA ESTABLE POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Personas con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS OCASIONALES

Se indagó acerca de la existencia de parejas sexuales ocasionales en el último año. Por pareja ocasional se hizo referencia a personas con las que el entrevistado tuvo relaciones sexuales y que no le pagó o no mantiene una relación estable/constante/afectiva o regular. El 26% en el grupo CASS dijo haber tenido al menos una relación sexual con pareja ocasional en el último año y el grupo Hogar lo refirió en 23%. Las frecuencias de reporte en el uso de condón en la última relación sexual con pareja ocasional fueron 88 y 94% para grupos CASS y Hogar respectivamente.

Dentro del grupo que no usó condón los motivos principales por los cuales no lo usaron fueron porque la pareja o la persona entrevistada no quisieron usarlo. El uso de lubricante durante todo el tiempo de la penetración en la última relación sexual con este tipo de pareja fue

referido en el 39% de los casos para el grupo CASS y 25% para el grupo Hogar. El uso consistente (siempre) del condón con pareja ocasional fue reportado en el 81% de los casos en el grupo CASS y en 88% en el grupo Hogar. En relación al estatus serológico de la pareja ocasional, 15% en el grupo CASS y 25% en el grupo Hogar dijo conocer que la pareja ocasional es una Persona con VIH. En la tabla 10 se detalla más información acerca de relaciones sexuales con parejas ocasionales, diferenciada por tipo de población.

TABLA 10. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS OCASIONALES POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p1001	En el último año ¿ha tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales?	Si	150	26.13	51	22.67
		No	419	73.00	172	76.44
		No sabe/No contesta	5	0.87	2	0.89
p1002	La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja ocasional ¿usaron un condón?	Si	132	88.00	48	94.12
		No	18	12.00	2	3.92
		No sabe/No contesta	0	0.00	1	1.96
p1003	¿Quién propuso el uso de condón en esa oportunidad?	Yo misma (o)	111	74.00	44	86.27
		La otra persona	7	4.67	0	0.00
		Decisión conjunta	13	8.67	5	9.80
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	19	12.67	0	0.00
p1004(a-i)	¿Por qué no usaron un condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales?	Confío en mi pareja	0	0.00	0	0.00

TABLA 10. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS OCASIONALES POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p1004(a-i)	¿Por qué no usaron un condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales?	Está sano	0	0.00	0	0.00
		Mi pareja no quiso usar	6	33.33	2	66.67
		Yo no quise usar	9	50.00	0	0.00
		Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	8	44.44	1	33.33
		No tenía un condón	2	11.11	0	0.00
		Los condones son muy caros	0	0.00	0	0.00
		Los condones no funcionan	0	0.00	0	0.00
		Otra	3	16.67	0	0.00
p1005	La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja ocasional ¿usaron lubricante todo el tiempo de la penetración?	Si	58	38.67	13	25.49
		No	91	60.67	37	72.55
		No sabe/No contesta	1	0.67	1	1.96
p1006	Piense en sus relaciones sexuales con parejas ocasionales ¿con qué frecuencia usa condón?	Siempre	121	80.67	45	88.24
		Algunas veces	25	16.67	6	11.76
		Nunca	2	1.33	0	0.00
		No he tenido pareja ocasional	0	0.00	0	0.00
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	0	0.00	0	0.00
p1007	¿La última pareja ocasional con la que tuvo relaciones sexuales tiene el VIH?	Si	22	14.67	13	25.49
		No	60	40.00	20	39.22
		No sabe/No contesta	65	43.33	18	35.29
		Sin información	3	2.00	0	0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 14. PRÁCTICAS SEXUALES PROTEGIDAS CON PAREJA OCASIONAL POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS COMERCIALES

Por pareja comercial se refiere a aquella a la cual se le realiza un pago o intercambio comercial por tener relaciones sexuales. En el grupo CASS 3% refirió haber tenido sexo en el último año con una pareja comercial en comparación con el grupo Hogar donde se reportó una frecuencia de 2%. Del subgrupo que reportó haber tenido sexo con pareja comercial 89% en el grupo CASS reportó haber usado condón en la última relación sexual con pareja comercial y 100% en el grupo Hogar. El uso de lubricante durante la última relación sexual con pareja comercial fue de 32% para el grupo CASS y 20% en grupo Hogar. Con este tipo de

pareja, el uso consistente (siempre) de condón fue reportado en un 68% en CASS y 100% en hogar. En la mayor parte de los casos la Persona con VIH encuestada no le comunica su condición de "Persona con VIH" a la pareja comercial. A continuación se detalla más información acerca de relaciones sexuales con parejas comerciales, diferenciada por tipo de población (Tabla 11).

TABLA 11. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS COMERCIALES POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p1101	En el último año ¿Ha tenido relaciones sexuales con parejas comerciales?	Si	19	3.31	5	2.22
		No	134	23.34	47	20.89
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	421	73.34	173	76.89

TABLA 11. RELACIONES SEXUALES CON PAREJAS COMERCIALES POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p1104	La última vez que pagó para tener relaciones sexuales, ¿utilizaron un condón?	Si	17	89.47	5	100.00
		No	1	5.26	0	0.00
		No sabe/No contesta	1	5.26	0	0.00
p1105	Durante el último año, ¿Con qué frecuencia utilizó usted condones todas las veces que pagó por tener relaciones sexuales?	Siempre	13	68.42	5	100.00
		Algunas veces	3	15.79	0	0.00
		Nunca	0	0.00	0	0.00
		No he pagado por sexo	2	10.53	0	0.00
		No sabe/No contesta	1	5.26	0	0.00
p1106	La última vez que pagó para tener relaciones sexuales, ¿utilizaron lubricante durante la penetración?	Si	6	31.58	1	20.00
		No	12	63.16	4	80.00
		No sabe/No contesta	1	5.26	0	0.00
p1108	¿Ud. le dice a los trabajadores (as) sexuales que es una persona con VIH?	Si	0	0.00	1	20.00
		No	17	89.47	4	80.00
		No sabe/No contesta	2	10.53	0	0.00
p1109	De las personas con las que ha tenido sexo pagado ¿sabe usted si alguna tenía VIH?	Si	1	5.26	1	20.00
		No	9	47.37	1	20.00
		No sabe/No contesta	7	36.84	3	60.00
		Sin información	2	10.53	0	0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 15. PRÁCTICAS SEXUALES PROTEGIDAS CON PAREJA COMERCIAL POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

Se indagó acerca de la adopción de medidas preventivas en la última relación sexual, definida esta como "la última vez que la persona encuestada tuvo relaciones sexuales, con la pareja estable, con una pareja ocasional, pareja comercial o con cliente". En el grupo CASS 73% mencionó que ésta última relación sexual la tuvo con pareja estable con la que vive o no y 23% con pareja ocasional en comparación con el grupo Hogar que reportó 75% para ambos tipos de pareja estable pero 23% para pareja ocasional.

En la última relación sexual el 78% del grupo CASS refirió haber usado condón y 84% del grupo hogar también lo refirió. Relativo

al uso de lubricante, en el grupo CASS 15% reportó haberlo usado y en el grupo Hogar 10%. Finalmente 48% del grupo CASS refirió conocer que su pareja en la última relación sexual es una Persona con VIH, en comparación con 63% en el grupo Hogar. En la tabla 12 se detalla más información acerca de las prácticas sexuales en la última relación, diferenciada por tipo de población.

TABLA 12. ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p1201	Piense en su última relación sexual, ¿Con que tipo de pareja tuvo	Pareja estable, vive con ella	326	56.79	109	48.44
		Pareja estable, no vive con ella	92	16.03	59	26.22
		Cliente	7	1.22	0	0.00
		Pareja ocasional	132	23.00	52	23.11
		Pareja comercial	10	1.74	5	2.22
		Desconocido	0	0.00	0	0.00
		No sabe/No contesta	7	1.22	0	0.00
p1202	Esa última vez que tuvo relaciones sexuales ¿utilizaron un condón?	Si	447	77.87	190	84.44
		No	114	19.86	31	13.78
		No sabe/No contesta	13	2.26	4	1.78
p1203	¿Quién sugirió el uso del condón en esa última relación sexual?	Yo misma (o)	257	57.49	83	43.68
		La otra persona	27	6.04	5	2.63
		Decisión conjunta	160	35.79	101	53.16
p1204(a-i)	¿Por qué no usaron un condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales?	No sabe/No contesta	3	0.67	1	0.53
		Confío en mi pareja	0	0.00	0	0.00
		Está sano	0	0.00	0	0.00
		Mi pareja no quiso usar	0	0.00	0	0.00
		Yo no quise usar	0	0.00	0	0.00
		Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	0	0.00	0	0.00
		No tenía un condón en ese momento	1	0.17	0	0.00
		Los condones son muy caros	0	0.00	0	0.00
		Los condones no funcionan	0	0.00	0	0.00
Otra	33	5.75	0	0.00		

TABLA 12. ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=574)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=225)	%
p1205	En esta última vez que tuvo relaciones sexuales ¿usó lubricante todo el tiempo de la penetración?	Si	86	14.98	22	9.78
		No	263	45.82	91	40.44
		Nunca uso lubricante	219	38.15	109	48.44
		No sabe/No contesta	6	1.05	3	1.33
p1206(a-d)	Entonces tomando en cuenta todas sus parejas sexuales, durante el último mes	¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales sin usar condón?	64	11.15	20	8.89
		¿alguna vez ha tenido relaciones anales sin que usaran un condón	44	7.67	14	6.22
		¿Algún hombre se vino o eyaculó en su boca sin usar un condón?	47	8.19	13	5.78
		¿Usó lubricante en todas las relaciones sexuales?	60	10.45	17	7.56
p1207	¿Esta pareja, con quien tuvo relaciones sexuales la última vez, es una persona con VIH?	Si	274	47.74	142	63.11
		No	200	34.84	56	24.89
		No sabe/No contesta	93	16.20	27	12.00
			7	1.22	0	0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 16. TIPO DE PAREJA Y SEXO PROTEGIDO EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

REPORTE DE USO DE CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

Al analizar en la población total el uso de condón por grupo etéreo se encontró que en el grupo de jóvenes de entre 18 y 24 años de los CASS el uso de condón

reportado en la última relación sexual fue de 80.85% y el reportado en el grupo Hogar fue de 100%. En la población mayor de 24 años fue de 77.61% para las personas del grupo CASS y 83.17% para las personas del grupo Hogar. A continuación en las tablas 12.1 y 12.2 se presentan los resultados del reporte de uso de condón en última relación sexual, estratificada por edad (menores de 24 y mayores de 24 años), diferenciándolas por sexo, práctica sexual, ingreso y nivel de escolaridad y comparando por grupo población.

TABLA 12.1. PORCENTAJE DE PERSONAS DE 18-24 AÑOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA QUE REPORTAN USO DE CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

Variable	Categorías	Individuos encuestados en CAAS			Individuos encuestados en hogar		
		Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí	Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí
General	Usó condón en última relación sexual	47	38	80.85	17	17	100
Sexo	Mujer	20	15	75.00	10	10	100
	Hombre	27	23	85.19**	7	7	100
	Sin información	0	0	-	0	0	-

TABLA 12.1. PORCENTAJE DE PERSONAS DE 18-24 AÑOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA QUE REPORTAN USO DE CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

Variable	Categorías	Individuos encuestados en CAAS			Individuos encuestados en hogar		
		Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí	Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí
Prácticas sexuales	Heterosexual	29	20	68.97	15	15	100
	Bisexual	7	7	100***	1	1	100
	Homosexual	10	10	100***	1	1	100
	Otro	1	1	100***	0	0	-
	Sin información	0	0	-	0	0	-
Tercil de ingreso mensual	Ingreso bajo (incluye sin ingreso)	26	20	76.92	8	8	100
	Ingreso medio	10	8	80	6	6	100
	Ingreso alto	11	10	90.91***	2	2	100
	Sin información	0	0	-	1	1	100
Escolaridad	No asistió a la escuela	1	1	100	0	0	-
	Alfabetizada	0	0	-	0	0	-
	Primaria incompleta	1	0	-	2	2	100
	Primaria completa	12	9	75	2	2	100
	Secundaria incompleta	9	8	88.89	5	5	100
	Secundaria completa	19	15	78.95	8	8	100
	Universitaria incompleta	5	5	100	0	0	0
	Universitaria completa	1	1	100	0	0	0
	Sin información	1	0	-	0	0	0

Significancia estadística * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.001$

1. Pruebas estadísticas realizadas con regresión multilogit usando efecto de diseño para la muestra de individuos encuestados en CASS

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

TABLA 12.2. PORCENTAJE DE PERSONAS DE MAYORES DE 24 AÑOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA QUE REPORTAN USO DE CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

Variable	Categorías	Individuos encuestados en CASS			Individuos encuestados en hogar		
		Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí	Total observaciones	Total individuos que contestaron sí	% individuos que contestaron sí
General	Usó condón en última relación sexual	507	409	77.61	208	173	83.17
Sexo	Mujer	310	222	71.61	128	96	75.00
	Hombre	217	187	86.18***	80	77	96.25***
	Sin información	0	0	-	0	0	-
Prácticas sexuales	Heterosexual	467	358	76.66	191	156	81.68
	Bisexual	27	23	85.19	6	6	100
	Homosexual	25	22	88	10	10	100
	Otro	5	4	80	0	0	-
	Sin información	3	2	66.67	1	1	100
Tercil de ingreso mensual	Ingreso bajo (incluye sin ingreso)	176	117	66.48	54	37	68.52
	Ingreso medio	175	142	81.14**	81	67	82.72
	Ingreso alto	171	148	86.55**	72	68	94.44***
	Sin información	5	2	40.00	1	1	100
Escolaridad	No asistió a la escuela	69	45	65.22	14	8	57.14
	Alfabetizada	14	11	78.57**	5	4	80.00
	Primaria incompleta	99	72	72.73	42	29	69.05
	Primaria completa	170	132	77.65*	60	49	81.67**
	Secundaria incompleta	54	43	79.63*	34	30	88.24**
	Secundaria completa	100	88	88.00***	45	45	100
	Universitaria incompleta	11	8	72.73	6	6	100
	Universitaria completa	10	10	100***	2	2	100
Sin información	69	45	65.22	14	8	57.14	

Significancia estadística * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.001$

1. Pruebas estadísticas realizadas con regresión multilogit usando efecto de diseño para la muestra de individuos encuestados en CASS

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

TRABAJO SEXUAL

Se indagó acerca de si las personas encuestadas realizan trabajo sexual, al respecto 3 % de los entrevistados en CASS refirieron dedicarse al trabajo sexual en comparación con 2% de quienes fueron entrevistados en hogar. La mayoría de quienes refirieron realizar trabajo sexual se auto-identificaron como trabajadores sexuales. Más del 47% del grupo CASS refirió haber estado en el último año en otras ciudades, distintas a la de su residencia, para ejercer trabajo sexual en comparación con 80% del grupo Hogar. En este grupo de trabajadores sexuales 71% de los encuestados en CASS refirió haber usado condón en su última relación sexual

comercial, mientras que en el grupo encuestado en hogar el reporte fue de 40%. Las causas mayormente referidas por las que no usaron condón fue porque el cliente no quiso usar o porque pagó más para no usarlo. Así mismo, en el grupo CASS 53% refirió haber usado lubricante en esa última relación sexual comercial en comparación con 20% en el grupo Hogar.

TABLA 13. TRABAJO SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN ANALIZADA


Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=17)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=5)	%
q1302	¿Actualmente se dedica usted al trabajo sexual?	Si	17	2.97	5	2.22
		No	556	97.03	220	97.78
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin información	0	0.00	0	0.00
q1304	¿Por su trabajo sexual, usted como se identifica?	Trabajador(a) sexual	16	94.12	5	100.00
		Masajista/ fichera/ mesera(o)/ bailarín(a), pero algunas veces hago entradas	0	0.00	0	0.00
		Ama de casa, pero algunas veces hago entradas	0	0.00	0	0.00
		Estudiante, pero algunas veces hago entradas	0	0.00	0	0.00
		Otro	0	0.00	0	0.00
		Sin información	0	0.00	0	0.00
q1305	¿Le dice usted a sus clientes que tiene VIH?	Si	0	0.00	0	0.00
		No	16	94.12	5	100.00
		No sabe/No contesta	1	5.88	0	0.00
		Sin información	0	0.00	0	0.00

TABLA 13. TRABAJO SEXUAL POR TIPO DE POBLACIÓN ANALIZADA

Número de Pregunta	Pregunta	Categoría	Individuos encuestados en CASS Observaciones (n=17)	%	Individuos encuestados en hogar Observaciones (n=5)	%
p1306	Durante el último año ¿ha estado en otras ciudades para hacer trabajo sexual?	Si	8	47.06	4	80.00
		No	8	47.06	1	20.00
		No sabe/No contesta	1	5.88	0	0.00
p1313	La última vez que tuvo relaciones sexuales con un cliente, ¿usaron condón?	Si	12	70.59	2	40.00
		No	5	29.41	3	60.00
		No sabe/NZo contesta	0	0.00	0	0.00
		Sin Información	0	0.00	0	0.00
p1315	¿Por qué no usaron un condón usted y su cliente esa vez?	El cliente me pago más	5	100.00	3	100.00
		Creo que está sano				
		El cliente no quiso usar	5	100.00	3	100.00
		Yo no quise usar	2	40.00		
		Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	4	80.00	1	33.33
		No tenía un condón en ese momento	1	20.00	0	0.00
		Los condones son muy caros	0	0.00	0	0.00
p1317	La última vez que tuvo relaciones sexuales con un cliente, ¿usaron lubricante durante la penetración?	Si	9	52.94	1	20.00
		No	7	41.18	3	60.00
		No uso lubricante con mis clientes	1	5.88	1	20.00
		No sabe/No contesta	0	0.00	0	0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

GRÁFICA 17. TRABAJO SEXUAL Y SEXO PROTEGIDO POR TIPO DE POBLACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto "Perfil de Riesgo de Persona con VIH de los países beneficiarios del Programa Regional REDCA+".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomando como base, que el presente informe de país, hace parte integral del Informe Regional del Perfil de Riesgos de las personas con VIH, las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, son las del estudio regional; sin embargo estas mismas aplican de manera individual a todos y cada uno de los países.

La población de personas con VIH analizada en los siete países beneficiarios del programa REDCA+, es una población joven en edad económicamente productiva, con nivel educativo básico, pero solo la mitad de ellos cuenta con empleo remunerado. Al menos uno de cada dos personas con VIH son solteros con dependientes económicos.

La actitud de las personas con VIH frente la epidemia de VIH es positiva, más de la mitad dijo tener planes para su vida futura y se visualizan a futuro en mejores condiciones que las del presente, refieren que pueden contribuir en algo para detener la epidemia, las formas de contribución más identificadas son el uso consistente del condón y la adherencia a la terapia antirretroviral.

En el caso de las prácticas sexuales, la población tiene diferencias marcadas entre hombres y mujeres. Casi la totalidad de las mujeres refiere prácticas heterosexuales mientras en el caso de los hombres al menos una tercera parte refiere prácticas homosexuales, sin embargo este grupo (hombres que tienen sexo con otros hombres) es justamente el que muestra mayor posibilidad para uso de condón en la última relación sexual. Llama la atención que casi la mitad no percibe riesgo de reinfección (o percibe muy bajo riesgo) por VIH, lo cual, para el caso de riesgo nulo, se observa en el análisis multivariado que está asociado negativamente al reporte de uso de condón en la última relación sexual.

El uso de condón como método efectivo para prevención de reinfección es identificado por casi toda la población y refieren que acceder a éstos en su localidad es fácil, gran parte de ellos lo consigue forma gratuita, lo cual se correlaciona con la asociación positiva encontrada para reporte de uso de condón en la última relación sexual. Sin embargo, casi la mitad refiere no usar ningún tipo de lubricante durante las relaciones sexuales.

En este estudio, no se cuenta con información médica-clínica que permita evaluar el estado de salud de las personas con VIH; no obstante, con la información analizada se identificó que en al menos la tercera parte de la población se realizó la prueba de VIH, porque en ese momento cursaban con cuadro clínico de enfermedad. Si bien la encuesta se aplicó en CASS, aun en el grupo encuestado en hogares la proporción de personas con VIH que refirieron estar bajo control médico fue alta (90%) lo cual nos hace suponer que el acceso y uso de servicios de salud para personas con VIH no es limitado. En este mismo sentido siete de cada diez personas con VIH refiere recibir tratamiento completo ante una enfermedad y ocho de cada diez refiere recibir TAR completa y gratuita.

Los datos previos ilustran un panorama favorable para la atención médica de personas con VIH. No obstante, se debe destacar también que aún hay una pequeña proporción de personas con VIH a quienes no se les ha realizado recuento de CD4 ni Carga

Viral, más aún una tercera parte de la población refirió que no ha recibido tratamiento profiláctico de tuberculosis.

El estigma y discriminación hacia las personas con VIH sigue estando presente, incluso dos de cada diez reporta como fuentes de estigma y discriminación a la propia familia y esta misma proporción refiere que no denunciaría un acto de discriminación porque consideran que ello no cambiaría en nada dicha situación.

El consumo de alcohol y de drogas fue referido por una proporción pequeña del grupo, pero llama la atención que dentro del grupo que refiere usar drogas inyectables, el intercambio de jeringas reportado fue alto (más del 30%) lo cual sin duda es un elemento de riesgo para re-infección que debe considerarse al planificar campañas que busque la mitigación o reducción del daño.

El reporte de uso de condón en la última relación sexual, independientemente del tipo de pareja, fue bajo (no más del 70%), se observan diferencias en el uso de condón por tipo de pareja sexual, siendo el reporte de uso más alto en relaciones sexuales con pareja estable y más bajo en relaciones sexuales comerciales cuando el encuestado es quien contrata el servicio (quien paga). El uso referido de lubricante es bajo, menos de la mitad refiere usarlo, una buena estrategia para incrementar su uso puede ser favorecer la accesibilidad preferentemente con gratuidad en la población de personas con VIH.

En los análisis multivariados, tanto para el modelo de uso condón como para el modelo de adherencia, se encontraron resultados consistentes con otros estudios y con el estudio mismo realizado en Centroamérica para REDCA+ en 2010. Se identifican a que quienes tiene mayor posibilidad de referir uso de condón en la última relación sexual son: población de hombres, con nivel educativo alto, con pareja estable, con identidad homosexual o bisexual, que se perciben con algún nivel de riesgo para re-infectarse con VIH, que identifican el uso de condón como una medida efectiva de prevención y que tienen accesibilidad fácil a condones en su localidad.

Considerado lo mencionado en el párrafo anterior, las recomendaciones pertinentes son trabajar en el empoderamiento de la mujeres con VIH en la negociación del uso de condón con sus parejas, así estas sean también VIH, así como en temas de la importancia de la equidad de género en la población de hombres. Continuar con la sensibilización de la importancia del sexo

protegido, independientemente de la identidad o práctica sexual. En el marco conceptual de la percepción de riesgo, sensibilizar a la población sobre las prácticas sexuales de riesgo y la importancia del sexo protegido identificando al condón como medida efectiva de prevención. Se debe continuar con los esfuerzos realizados hasta ahora para garantizar la accesibilidad a los condones, pero también a los lubricantes a base de agua en esta población.

En lo referente a la adherencia terapéutica, si bien, la población tiene conocimiento de las ventajas de la TARV para la sobrevida y el incremento de la calidad de ésta, se sugiere continuar trabajado en la difusión de los beneficios del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno rescatando la importancia que pueden tener una sobrevida con buena calidad para las personas con VIH y su proyección de vida futura. En la población con adicciones como consumo de alcohol y drogas, se debe prestar atención especial a la presencia de estos factores en personas con VIH candidatas a TARV, teniendo conciencia el personal de salud, que estos factores están asociados con baja adherencia terapéutica. Finalmente se sugiere implementar o fortalecer, según sea el caso, acciones e intervenciones que garanticen servicios de salud libres de estigma y discriminación hacia las personas con VIH en los países de la región.

ACRÓNIMOS

TARV: Terapia antiretroviral.

CD4: Cúmulo de diferenciación 4.

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.

HSH: Hombres que tienen sexo con hombres.

REDCA+: Red Centroamericana de Personas con VIH.

ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.

USD: Dólar de los Estados Unidos.

CASS: Centros de Autoayuda de los Servicios de Salud.



Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador.
Teléfono: (503) 2565-1400; fax: (503) 2248-6943

www.redca.org