

Informe Regional
PERFIL DE RIESGO
DE PERSONAS CON VIH DE LOS PAISES
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REGIONAL REDCA+
2014



CREDITOS

Proyecto: Ampliando y consolidando el desarrollo y fortalecimiento de las Capacidades Técnico-profesionales de las Personas con VIH de la Región Centroamericana, para su participación efectiva en los procesos de incidencia política, contraloría social y veeduría ciudadana en VIH-Sida, e influir el desarrollo humano y la calidad de vida en sus pares de la región”

Subvencionado por el Fondo Mundial de Lucha con el SIDA, Tuberculosis y Malaria a la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+) y administrado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), bajo el acuerdo MAR-H-SISCA.

El presente estudio se realizó bajo los lineamientos Protocolo de Investigación Perfil de Riesgo de Personas con VIH de Centroamérica 2014, cuyo comité regional estuvo conformado por:

Dra. Sonia Morales.	Universidad del Valle de Guatemala.
Lic. Manuel Francisco Abarca.	CIPAC, Costa Rica.
Sr. Rodrigo Pascal.	ONUSIDA, Guatemala.
Dr. René Leyva.	INSP de México.
Dr. Salvador Sorto.	PNS de El Salvador en Representación del MCR.
Sra. Haydee Laínez.	REDTRASEX.
Sra. Johana Esmeralda Ramírez.	REDLACTRANS.
Licda. Alma De León.	REDCA+.
Dra. María Eugenia De León.	USAID/ CAPACITY.
Dr. Oscar Azúcar.	USAID/ CAPACITY.
Dra. SannyNorthbrook.	CDC, Centroamérica.
Sra. Guadalupe Castaneda.	ICW Latina.
Dr. Azael Jovel.	SE-COMISCA.
Dra. Elizabeth Rodríguez.	OPS/OMS.
Dr. Eliseo Orellana.	Health Focus.
Lic. Sergio R. Montealegre B.	UCP SISCA/REDCA+
Dra. Julissa Mena Santamaría.	UCP SISCA/REDCA+
Dra. Evelyn Cardoza Hernández.	UCP SISCA/REDCA+

Informe:

Asistencia Técnica:

Lic. Sergio R. Montealegre B.	Director Programa Regional REDCA+
Dra. Julissa Mena Santamaría.	Especialista M&E para Belize, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Dra. Evelyn Cardoza Hernández.	Especialista M&E para Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Consultor Compilador:

Lic. Marco Vinicio Fournier.

Organización responsable de la recolección de la información en

Belice: Organización CNET

Costa Rica: Esperanza Viva y Manú

El Salvador: Asociación Atlacatl Vivo Positivo

Honduras: Fundación Llaves

Nicaragua: ANICP+VIDA

Panamá: La Asociación Viviendo Positivamente



RESUMEN EJECUTIVO

La Red Centroamericana de Personas viviendo con VIH (REDCA+) implementó en el segundo semestre de 2014 el estudio Perfil de Riesgo de Personas con VIH con el fin de actualizar las características sociodemográficas de la población de Personas con VIH, así como la identificación de los hábitos asociados al uso del condón y lubricante en la última relación sexual, la adherencia a TAR en los últimos 12 meses, las condiciones de salud, la actividad sexual, la victimización y los conocimientos sobre VIH, para posteriormente diseñar estrategias y tomar decisiones programáticas en cada país. El estudio se realizó en seis países de la región: Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

El presente informe muestra los resultados correspondientes a toda la región en su conjunto. A continuación se resumen los objetivos, la metodología, los resultados y las principales conclusiones de la investigación.

I. OBJETIVOS

A. Generales

1. Describir las características socio demográficas, el comportamiento vinculado al VIH y el uso de los servicios de atención de salud de las Personas con VIH en la Región Centroamericana durante 2014.
2. Producir información detallada que sirva de base para planificar nuevas y mejores estrategias de intervención para promover prevención y mejorar las condiciones de vida de las Personas con VIH.

B. Específicos:

1. Conocer las características socio demográficas de las personas diagnosticadas con VIH en la Región Centroamericana.
2. Determinar las pautas de comportamiento sexual de las Personas con VIH.
3. Identificar las características asociadas al uso del condón en las Personas con VIH.
4. Describir las condiciones de salud de las Personas con VIH.
5. Identificar las características asociadas a la adherencia a la TAR en los últimos doce meses en Personas con VIH
6. Determinar perfiles de riesgo en las prácticas sexuales de las Personas con VIH según características socio demográficas, consumo de alcohol y drogas, experiencia de discriminación, estigma y/o apoyo.
7. Determinar perfiles de riesgo en la adherencia a la TAR según características socio demográficas, consumo de alcohol y drogas, experiencia de discriminación, estigma y/o apoyo y comportamiento sexual.



II. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de corte transversal con una muestra de Personas con VIH entrevistadas aleatoriamente en los servicios de salud y un censo de las y los beneficiarios del Programa de Visitas Domiciliarias.

En toda la región se entrevistó a un total de 2003 personas en los centros de salud, 1677 en las visitas domiciliarias y en el caso de Belice 213 personas más ubicadas por otros medios. El proceso de selección en los centros de salud fue polietápico, escogiéndose como conglomerados primero los centros a visitar. En cada uno de ellos se estableció un tamaño muestral proporcional a la cantidad de Personas con VIH atendidas al año. Dentro de cada centro de salud seleccionado se escogió a las personas a entrevistar mediante un procedimiento sistemático, escogiendo a las personas en función de su presentación al servicio de salud. El procedimiento de muestreo utilizado y el tamaño sugerido permite trabajar con un nivel de error máximo por país de 3,7% y con un nivel de confianza del 95%, asumiendo variabilidad máxima en las distribuciones proporcionales.

La información se obtuvo mediante entrevistas personales cara a cara, utilizando como guía un cuestionario estructurado diseñado en conjunto en un taller programado especialmente para este fin y constituido por personal de REDCA+, una o un representante de cada una de las organizaciones de cada país participante y por el consultor metodológico.

La recolección de la información estuvo a cargo de las siguientes organizaciones en cada país:

Belice: Organización CNET
Costa Rica: Esperanza Viva y Manú
El Salvador: Asociación Atlacatl Vivo Positivo
Honduras: Fundación Llaves
Nicaragua: ANICP+VIDA
Panamá: La Asociación Viviendo Positivamente

La información obtenida se procesó electrónicamente para obtener distribuciones de frecuencia de cada pregunta del cuestionario, así como tablas de contingencia para preguntas claves de cada sección, con su respectiva prueba de significancia según la distribución Chi Cuadrada. Adicionalmente, se combinaron diferentes preguntas para calcular indicadores mediante adición de respuestas, previa transformación unidireccional. Estos indicadores también fueron cruzados por variables de control y se evaluó el nivel de significancia de diferencias de promedios basándose en la distribución t de Student o F de Fisher, según la cantidad de categorías de cada variable de control. Por último, se calcularon regresiones múltiples con los principales indicadores para determinar modelos explicativos y su posible alcance.

Para el caso del presente informe regional, se procedió a pesar la base de datos por país, de modo que la distribución de las diferentes muestras se ajustara a las proporciones reales de personas con VIH en cada uno.

III.RESULTADOS


A.Participación en grupos de autoayuda y perspectiva de futuro

Las personas entrevistadas tienden a participar poco en grupos de apoyo (32,8%). También resulta relativamente baja la participación en actividades relacionadas con el VIH en los últimos doce meses. La asistencia a grupos de autoayuda aumenta entre los hombres que tienen sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres, las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que mejor perciben su estado de salud, las de mayor edad, las personas trans, las que no saben leer y escribir, las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia, las que solo se dedican a las labores del hogar, las que laboran en ocupaciones no calificadas y las que desarrollan servicio doméstico.

Aunque la participación es baja, el 87,9% considera que puede contribuir a detener la epidemia de VIR, pero al solicitar que especifiquen de qué forma podrían hacerlo, la mayoría se refiere a acciones individuales y relacionadas con su cuidado personal como el uso del condón o el tomar medicamentos.

Por otra parte, se presenta un nivel bastante alto de optimismo hacia el futuro, con un 81,3% de las personas afirmando que tienen planes definidos para los próximos años, el90% opina que puede cambiar positivamente su futuro y el 80% considera que estará mejor que ahora.

GRÁFICO A
PRERSPECTIVA DE FUTURO




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

El índice de perspectiva de futuro muestra un promedio de 81,3 en una escala de 0 a100. El nivel de optimismo hacia el futuro es más alto para Honduras y más bajo para Belice.Por otra parte, resulta más alto entre las personas que no han tenido relaciones sexuales con penetración, las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH , las que recibieron consejería en el momento del examen de VIH, las que cuidan más su salud desde su diagnóstico, las que mejor perciben su estado de salud, las que están actualmente tomando medicamentos antirretrovirales, las que no han tenido efectos adversos por la terapia antirretroviral, las que perciben en forma extrema los medicamentos

antirretrovirales, es decir, o muy mal o muy bien, las que no han sufrido maltrato en los servicios de salud o las que en general han sido menos victimizadas, las que tienen una pareja estable, las que saben leer y escribir, las que tienen mayor nivel educativo, las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia, las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico, las que viven con su pareja, las que estudian y trabajan, las que laboran en actividades profesionales y las que trabajan para el Estado.


B. Embarazo y planificación



Casi la tercera parte de las mujeres entrevistadas ha estado embarazada después de conocer su diagnóstico de VIH y llama la atención el hecho de que estos embarazos se dieron en alta proporción sin planificarlos, a pesar de que en general reconocen haber recibido información pertinente sobre el riesgo de transmisión del virus de madre a hijo. Como resultado de esta situación, un 29,5% de las mujeres que han estado embarazadas reconocen tener al menos un hijo con VIH.

Un 59% de las mujeres afirman utilizar algún método de planificación, sobre todo el condón. La utilización de métodos de planificación familiar resulta superior en Nicaragua e inferior en Panamá. Del mismo modo, el uso es mayor entre las personas que mejor perciben su estado de salud, las que tienen una pareja estable, las de menor edad, las que viven con su pareja y las que solo estudian.

C. Nivel de conocimientos sobre VIH




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

D. Preocupación por la salud

El nivel de conocimientos básicos sobre el VIH resulta moderado, con un promedio de 68,1 en una escala de 0 a 100.

Los conocimientos presentan el promedio más alto para Costa Rica y el más bajo para Belice. Además, los conocimientos son mejores entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias, los hombres que tienen sexo solo con hombres, las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que mejor perciben su estado de salud, las que tienen una pareja estable, las que tienen entre 36 y 45 años, las mujeres trans, las personas que saben leer y escribir, las que tienen mayor nivel educativo, las mormonas, las que asisten al culto de su iglesia varias veces al mes, las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico, las que viven con su pareja, las que ocupan puestos de dirección y las y los empleados públicos.

GRÁFICO D
¿QUE TANTO SE PREOCUPA POR SU
SALUD DESPUÉS DE CONOCER SU
DIAGNÓSTICO?




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Existe una tendencia muy marcada a cuidar más de su salud después de conocer que se es una persona VIH. Esta tendencia es superior para Panamá e inferior para Belice y aumenta entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias, las que tienen mejor perspectiva de futuro, las que tienen mejores conocimientos sobre VIH, mayor acceso a condones y a lubricantes, las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que recibieron consejería en el momento del examen de VIH, las que practican una mayor cantidad de acciones para cuidar su salud y las que tienen más motivos para hacerlo, las que no han tenido problemas de salud en los últimos tres meses, las que mejor perciben su estado de salud, las que están actualmente tomando medicamentos antirretrovirales, las que no han tenido efectos adversos por la TAR, las que mejor perciben los medicamentos antirretrovirales, las que cuentan con alguien que las pueda acompañar al servicio de salud, las que menos han sufrido victimización, las que menos alcohol y/o drogas consumen, las de mayor edad, las que saben leer y escribir, las que tienen mayor nivel educativo, las mormonas, las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia, las que no han cambiado su residencia desde el diagnóstico, las personas pensionadas o que viven de las rentas y las y los empleados públicos.

E. Problemas de salud

GRÁFICO E
¿HA TENIDO PROBLEMAS
DE SALUD EN LOS
ÚLTIMOS 3 MESES?




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cerca de una cuarta parte de las personas entrevistadas afirma haber tenido algún tipo de problema de salud o infección en los últimos tres meses. Esta situación es más marcada en Honduras y menos en Belice. Se evidencia también una mayor proporción de personas con problemas recientes de salud entre las entrevistadas en los servicios de salud, las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que peor perciben su estado de salud, las de mayor edad, las mormonas, las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico, separadas o divorciadas y las que trabajan en servicios domésticos.

La mayoría acudió a consulta médica menos de una semana después de los primeros síntomas y consideran que se les atendió adecuadamente y se les medicó para enfrentar el problema.

F. Percepción del estado de salud

GRÁFICO # F
PERCEPCIÓN DE ESTADO DE SALUD ACTUAL




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

La percepción del estado actual de la salud resulta muy positiva con la mayoría de las personas calificándola como buena o muy buena. El nivel más alto corresponde a Belice y el más bajo a Panamá. La percepción mejora entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias, las que tienen mejor perspectiva de futuro, las que tienen mejores conocimientos sobre VIH, las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que mejor perciben los medicamentos antirretrovirales, las que tienen una pareja estable, las de menor edad, las personas trans, las que saben leer y escribir, las que tienen mayor nivel educativo, las mormonas, las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico, las solteras o las que viven con su pareja, las que estudian y trabajan, las profesionales o las que laboran sin remuneración. Un 24,7% de las personas entrevistadas asegura que ha tenido que pagar por los servicios de salud dentro del sector público, de manera especial por los exámenes de laboratorio y por medicamentos ARV. Además, un 17,7% también ha tenido que pagar por servicios de salud privados.

G. Tratamiento antirretroviral

GRÁFICO G
¿ACTUALMENTE ESTÁ
TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


El 89,4% de las personas entrevistadas afirma estar tomando medicamentos antirretrovirales al momento de la entrevista. La proporción es mayor para Honduras y menor para Belice. Además la misma aumenta entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias, entre las personas con mejor perspectiva de futuro, las mujeres que tienen sexo solo con hombres y los hombres que tienen sexo solo con mujeres, las que tienen mejores conocimientos sobre VIH, las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que recibieron consejería antes del examen de VIH, las que realizan una mayor proporción de acciones para cuidar su salud y las que tienen mayor cantidad de motivos para hacerlo, las que mejor perciben su estado de salud, las que mejor perciben los medicamentos antirretrovirales, las que menos alcohol y/o drogas consumen, las que se han realizado el examen de CD4 en los últimos 12 meses y tienen un recuento más bajo, así como las que se han realizado el examen de carga

viral, conoce su resultado y el mismo fue indetectable, las que menos han sufrido victimización, las personas cuya familia sabe que tienen VIH, las que tienen alguien que pueda acompañarlas al servicio de salud, las que tienen una pareja estable, las de mayor edad, las personas con identidad de género femenino, las que tienen mayor nivel educativo, las mormonas, las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia, las viudas y las pensionadas o que viven de las rentas.

La variedad de medicamentos que se menciona es muy grande, pero sobresalen de manera especial Efavirenz y Zidovudina+Lamivudina. Poco más de una quinta parte ha sufrido reacciones secundarias adversas al medicamento, pero en general le han mantenido el esquema de tratamiento.

H. Adherencia

GRÁFICO H
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL SEGÚN EDAD



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 17,7% de las personas entrevistadas acepta haber suspendido por decisión propia la terapia antirretroviral. Esta situación es superior en Belice e inferior en Costa Rica.

La tendencia a suspender la terapia es un más marcada entre las personas menores de 24 años, en donde el indicador de adherencia es de 76,4%, mientras que entre las personas de 24 años o mayores es del 82,9%.


La adherencia resulta inferior entre las personas entrevistadas en los servicios de salud, las personas con peor perspectiva de futuro, las que tienen peores conocimientos sobre VIH, las que peor perciben su estado de salud y los medicamentos antirretrovirales, las que más han sufrido victimización, las que menos alcohol y/o drogas consumen, las de menor edad, las que no saben leer y escribir, las que no profesan ninguna religión, las que nunca asisten al culto de su iglesia, las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico y las que laboran sin remuneración.

Entre las principales razones para suspender el tratamiento están los efectos secundarios, el fallar las citas médicas y el cansancio asociado al tratamiento.

Por otra parte, un 19% dice haber olvidado al menos una vez en los últimos 12 meses retirar el medicamento antirretroviral en el centro de salud. Por otra parte, a un 9,7% de las personas le han dejado de suministrar sus medicamentos en los últimos 12 meses.

I. Percepción del medicamento antirretroviral

GRÁFICO I
PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


La percepción de los medicamentos antirretrovirales tiende a ser positiva, con un promedio de 75,3 en una escala de 0 a 100. El promedio más alto corresponde a Honduras y el más bajo a Costa Rica.

La percepción resulta más positiva entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias, las personas con mejor perspectiva de futuro, las que tiene mejores conocimientos sobre VIH, las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que mejor perciben su estado de salud, entre las que están actualmente tomando antirretrovirales, las que menos han sufrido victimización, las que tienen una pareja estable, las de mayor edad, las personas con identidad de género femenino, las que tienen mayor nivel educativo, las cristianas evangélicas, las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia, las que viven con su pareja y las que estudian y trabajan.

La mayoría de las personas entrevistadas considera que quien toma los medicamentos vive más y se enferma menos y tiene menos probabilidad de transmitir el VIH.

J. Victimización

GRÁFICO J
NIVELES DE VICTIMIZACIÓN




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 18,5% de las personas entrevistadas afirma haber sufrido algún tipo de maltrato en servicios de salud públicos y un 29,9% considera necesario ocultar su diagnóstico al ser atendido en un centro de salud. Del mismo modo, más de la mitad considera necesario ocultar su condición de Persona con VIH cuando buscan trabajo.

A pesar de lo anterior, la mayoría ha recibido un fuerte apoyo por parte de su familia y existe una importante disposición a denunciar cualquier acto de violación de sus derechos.

K. Relaciones sexuales

GRÁFICO K
¿TIENE PAREJA ESTABLE?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Poco menos de la mitad de las personas entrevistadas tenía una pareja estable al momento de la entrevista. Entre éstos, el 50,2% afirma que su pareja es también una Persona con VIH, mientras que un 11,8% acepta que su pareja estable ignora que la persona entrevistada es una Persona con VIH.


Por otra parte, un 31,6% afirma haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales en los últimos 12 meses, de las cuales 41,3% ignora si su compañero o compañera es una persona VIH y solo el 21,1% le dice a su pareja ocasional que es una Personas con VIH.

Un 5,4% ha pagado para tener relaciones sexuales. En estos casos no acostumbran decirle a la trabajadora o el trabajador sexual que son Personas con VIH e ignoran si su pareja lo es.

Del mismo modo, un 4% ha practicado el trabajo sexual en los últimos 12 meses y casi ninguna de las personas acostumbra decirle a sus clientes que es una Persona con VIH.

L. Uso del condón

GRÁFICO # L
NIVEL DE USO DEL CONDÓN



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


El uso del condón tiende a ser moderado entre las personas entrevistadas.

El uso sistemático es de 67,2% en relaciones con la pareja estable, de 64,4% con parejas ocasionales, de 64,1% con trabajadoras o trabajadores sexuales, pero de apenas 2,4 cuando la persona entrevistada practica el sexo comercial. La iniciativa para sugerir su uso tiende a ser moderadamente alta en las diferentes relaciones.

El indicador de uso del preservativo presenta un promedio de 62,0 en una escala de 0 a 100 y la mayoría de las personas entrevistadas muestra un nivel medio alto.

El uso del condón muestra el promedio más alto para Nicaragua y el más bajo para Belice. Además, el uso se incrementa entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias, las que tienen la peor perspectiva de futuro, las que tiene peores conocimientos sobre VIH , menor acceso a condones y a lubricantes, las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH , las que mejor perciben su estado de salud, las que menos alcohol y/o drogas consumen, las que tienen una pareja estable, las de menor edad, las mujeres trans, las personas que saben leer y escribir, las que tienen mayor nivel educativo, las que asisten varias veces al mes al culto de su iglesia, las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico, las que viven con su pareja, las que estudian y trabajan y los patronos con más de 10 empleados.

GRÁFICO # M
USO DEL CONDÓN SEGÚN EDAD




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

La última vez que se tuvo relaciones sexuales el 72,9% de las personas menores de 24 años y el 74,5% de las de 24 o más años utilizaron el condón.

M. Uso del lubricante

GRÁFICO N
USO DE LUBRICANTE



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

El uso del lubricante es muy bajo, independientemente del tipo de pareja, con un promedio de apenas 39,9 en una escala de 0 a 100. El valor más alto se observa en Belice y el más bajo en Honduras.

El uso del lubricante es un más alto entre las personas entrevistadas en los servicios de salud, las que tienen mejor perspectiva de futuro, las mujeres que tienen sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres, los hombres que tienen sexo solo con hombres, las personas que tienen mejores conocimientos sobre VIH, las que tienen mayor acceso a condones y a lubricantes, las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH, las que mejor perciben su estado de salud, las que más alcohol y/o drogas consumen, las que no tienen una pareja estable, las de menor edad, los hombres trans, las personas que saben leer y escribir, las que tienen mayor nivel educativo, las que nunca asisten al culto de su iglesia, las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico, las solteras, las que estudian y trabajan, las que ocupan puestos directivos y las y los empleados públicos.

N. Conclusiones

- 1- La población muestra un nivel socioeconómico limitado, con una proporción importante de desocupación, inactividad, concentración en el sector informal, ingresos limitados y una cantidad importante de dependientes.
- 2- El nivel de identidad como grupo poblacional específico es bajo y la participación es también limitada.
- 3- Existe una tendencia a una buena perspectiva de futuro con optimismo y confianza.
- 4- Entre las mujeres existe una proporción importante de embarazos no planificados después de recibir el diagnóstico de VIH y una proporción también significativa de hijos con VIH.
- 5- El nivel de conocimientos sobre VIH es moderado.
- 6- Existe un acceso alto a consulta médica y a los medicamentos antirretrovirales y a los exámenes de laboratorio.
- 7- Un 89,4% se mantiene en tratamiento antirretroviral y existe una buena imagen del mismo.
- 8- La adherencia es de 76,4% en menores de 24 años y de 82,7 % en personas de 24 o más años. Preocupa de manera especial la cantidad de personas que reconocen olvidar recoger sus medicamentos en el centro de salud.
- 9- Alto porcentaje de personas con exámenes recientes de CD4 y carga viral, pero bajo conocimiento del resultado de los mismos, sobre todo para el segundo.
- 10- Existe un nivel moderado de victimización en los centros de salud y a la hora de buscar trabajo.
- 11- El uso del condón es moderado, con un uso sistemático de alrededor del 64% en las diferentes tipos de relaciones, pero casi nulo entre las personas que practican trabajo sexual.
- 12- El uso del lubricante es bajo.
- 13- Hay una proporción importante de personas que no le dicen a su pareja que son VIH y que a su vez no saben si su pareja lo es.
- 14- Los modelos explicativos muestran algunas variables de control con un peso importante al predecir actitudes y prácticas preventivas, entre éstas sobresalen: la perspectiva de futuro, el nivel de conocimientos sobre VIH, el nivel educativo, las actitudes hacia la salud, la percepción de los medicamentos antirretrovirales, el consumo de alcohol y otras drogas y el tiempo transcurrido desde que recibió su diagnóstico de VIH.



O. Recomendaciones

- 1- Analizar posibles opciones para mejorar nivel de empleo y de productividad.
- 2- Mejorar los niveles de identidad y participación como grupo poblacional.
- 3- Promover mejores opciones de planificación y mejor información sobre riesgo de transmisión de madre a hijo.
- 4- Mejores estrategias de capacitación y sensibilización en temas generales de VIH y prevención.
- 5- Controlar la victimización en los centros de salud.
- 6- Trabajar sobre las principales causas de la suspensión del tratamiento antirretroviral.
- 7- Mejorar el proceso de comunicación de resultados de pruebas de laboratorio en los centros de salud.
- 8- Mejorar el acceso a tratamiento preventivo de la tuberculosis.
- 9- Intensificar el uso sistemático del preservativo y promocionar el uso del lubricante.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CRÉDITOS	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
I. Objetivos	3
A. Generales	3
B. Específicos	3
II. METODOLOGÍA	4
III. Resultados	5
A. Participación en grupos de autoayuda y perspectiva de futuro	5
B. Embarazo y planificación	6
C. Nivel de conocimientos sobre VIH	6
D. Preocupación por la salud	7
E. Problemas de salud	8
F. Percepción del estado de salud	8
G. Tratamiento antirretroviral	9
H. Adherencia	10
I. Percepción del medicamento antirretroviral	11
J. Victimización	11
K. Relaciones sexuales	12
L. Uso del condón	13
M. Uso de lubricante	14
ÍNDICE DE CONTENIDOS	17
ÍNDICE DE TABLAS	19
INTRODUCCIÓN	41
Objetivos	42
I. Objetivos Generales	42
METODOLOGÍA	42
I. Diseño	42
II. Procedimiento de muestreo	43
III. Población de referencia	43
IV. Procedimiento de recolección de información	44
V. Dimensiones a evaluar	45
VI. Procedimiento de análisis	45
A. Análisis descriptivos	45
B. Recodificación de variables continuas	46
C. Indicadores	46
D. Análisis de regresión múltiple	47
VII. Descripción de la muestra	47
LIMITACIONES DEL ESTUDIO	59
CONSIDERACIONES ÉTICAS	59

RESULTADOS	60
Participación en grupos de autoayuda y perspectiva de futuro	61
I. Participación	61
II. Perspectiva de futuro	62
Comportamiento sexual	78
III. Inicio de relaciones sexuales con penetración	78
IV. Actividad sexual	83
Embarazo y planificación	84
Conocimientos sobre VIH	95
Acceso a condones y lubricantes	105
I. Condones	105
II. Acceso a lubricante	115
Situación de salud	128
I. Proceso de diagnóstico	128
II. Preocupación por la salud	136
III. Problemas de salud	147
IV. Percepción del estado de salud	153
V. Acceso a servicio de salud públicos	160
Tratamiento antirretroviral	162
Adherencia al tratamiento antirretroviral	177
Percepción de los medicamentos antirretrovirales	192
Exámenes de laboratorio	201
Control de la tuberculosis	212
Victimización	219
Consumo de alcohol y drogas	230
Relaciones sexuales con una pareja estable	241
Parejas ocasionales	249
Relaciones con trabajadores/as sexuales	268
Ultima relacion sexual	276
Trabajo sexual	292
Uso del Condón	304
Uso de lubricante	312
CONCLUSIONES	324
RECOMENDACIONES	327

ÍNDICE DE TABLAS

1	LUGAR DE ENTREVISTA	50
2	EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	51
3	¿CÓMO DEFINIRÍA USTED SU IDENTIDAD DE GÉNERO?	51
4	¿SABE LEER Y ESCRIBIR?	51
5	¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE?	52
6	¿CUÁL ES SU RELIGIÓN?	52
7	¿CUÁNTAS VECES POR MES ASISTE A SU IGLESIA?	53
8	¿RESIDE USTED PERMANENTEMENTE EN ESTE PAÍS?	53
9	¿HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE QUE SUPO QUE TENÍA VIH?	53
10	¿CUÁL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL CAMBIÓ DE RESIDENCIA?	54
11	PROBLEMAS POR CAMBIAR DE RESIDENCIA (respuesta múltiple)	54
12	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?	54
13	¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL?	55
14	CON QUIÉN VIVE ACUTALMENTE (respuesta múltiple)	55
15	NIVEL DE ACTIVIDAD	55
16	OCUPACIÓN PRINCIPAL	56
17	RELACIÓN LABORAL	56
18	¿TIENE OTRA FUENTE DE INGRESO?	57
19	INGRESO MENSUAL EN DÓLARES	57
20	NÚMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE	57
21	ACTIVIDAD SEXUAL SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	58
22	¿HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO DE VIH?	58
23	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?	63
24	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	63
25	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS	64
	HOMBRES ENTREVISTADOS	
26	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO	64
	DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	
27	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU	64
	ESTADO DE SALUD	
28	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN EDAD DE LA	65
	PERSONA ENTREVISTADA	
29	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	65
30	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	65
31	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE	65
	AL CULTO DE SU IGLESIA	
32	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	66
33	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	66



34	¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	66
35	¿QUÉ TIPO DE GRUPO ES?	67
36	¿EN EL ÚLTIMO AÑO HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES SOBRE VIH?	67
37	¿PUEDE CONTRIBUIR EN ALGO PARA DETENER LA EPIDEMIA DE VIH?	67
38	¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR A CONTROLAR LA EPIDEMIA DE VIH? (respuesta múltiple)	68
39	¿TIENE USTED PLANES DEFINIDOS PARA SU FUTURO?	68
40	¿PUEDE HACER ALGO PARA CAMBIAR POSITIVAMENTE SU FUTURO?	68
41	¿EN EL FUTURO USTED ESTARÁ MEJOR, PEOR O IGUAL QUE AHORA?	69
42	PERSPECTIVA DE FUTURO Estadísticas descriptivas	69
43	PERSPECTIVA DE FUTURO	69
44	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	70
45	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN	70
46	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIO DIAGNOSTICO DE VIH	70
47	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH	71
48	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN CUÁNTO CUIDA SU SALUD DESDE SU DIAGNÓSTICO	71
49	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	72
50	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES	72
51	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI HA TENIDO EFECTOS ADVERSOS POR LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL	72
52	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	73
53	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI HA SIDO VÍCTIMA DE MALTRATO EN SERVICIOS DE SALUD	73
54	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN VICTIMIZACIÓN	73
55	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	74
56	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	74
57	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	74
58	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	75
59	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	75
60	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN ESTADO CIVIL	75
61	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	76
62	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	76
63	PERSPECTIVA DE FUTURO SEGÚN RELACIÓN LABORAL	77
64	ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA LA PERSPECTIVA DE FUTURO	77
65	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?	79
66	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	79
67	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	79
68	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	80
69	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	80
70	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN RELIGIÓN	80
71	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	80
72	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	81
73	¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	81

74	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN	81
75	PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN ¿ERA MAYOR DE EDAD?	82
76	RELACIÓN CON PAREJA DE PRIMERA RELACIÓN	82
77	ACTIVIDAD SEXUAL	83
78	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?	85
79	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	86
80	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	86
81	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	86
82	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN SI ACTUALMENTE	86
83	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	87
84	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	87
85	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	87
86	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	87
87	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN ESTADO CIVIL	88
88	¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	88
89	¿PLANIFICO USTED ESE(ESOS) EMBARAZO(S)?	88
90	¿INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VIH DE MADRE A HIJO?	89
91	TIENE HIJOS QUE CON VIH	89
92	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	89
93	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	90
94	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	90
95	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	90
96	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN RELIGIÓN	90
97	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	91
98	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN ESTADO CIVIL	91
99	TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN RELACIÓN LABORAL	91
100	¿CUÁNTAS CITOLOGÍAS SE HA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES?	92
101	¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?	92
102	¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	92
103	¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	93
104	¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	93
105	¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	93
106	¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? SEGÚN ESTADO CIVIL	93
107	¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	94
108	¿CUÁLES MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN UTILIZA? (respuesta múltiple)	94
109	¿POR QUÉ NO UTILIZA MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN?	95
110	¿QUÉ PUEDE HACER UNA MUJER PARA PREVENIR TRANSMISIÓN DEL VIH A SU BEBÉ? (respuesta múltiple)	97



111	¿CREE USTED QUE UNA PERSONA CON VIH PUEDA REINFECTARSE?	97
112	¿CREE QUE USANDO CONDÓN SE PUEDE PREVENIR LA REINFECCIÓN DEL VIH?	97
113	¿CREE QUE SIENDO FIEL SE PUEDE PREVENIR LA REINFECCIÓN DEL VIH?	98
114	¿SU RIESGO DE RE-INFECTARSE POR VIH ES...?	98
115	¿QUÉ PUEDEN HACERSE PARA PREVENIR LA REINFECCIÓN?	98
116	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH Estadísticas descriptivas	99
117	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	99
118	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	99
119	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	100
120	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	100
121	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	100
122	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	101
123	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	101
124	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	101
125	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	102
126	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	102
127	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	102
128	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN RELIGIÓN	103
129	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	103
130	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	103
131	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN ESTADO CIVIL	104
132	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	104
133	CONOCIMIENTOS SOBRE VIH SEGÚN RELACIÓN LABORAL	104
134	ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	105
135	LUGARES QUE CONOCE EN DONDE PUEDE CONSEGUIR CONDONES (respuesta múltiple)	107
136	¿PARA USTED CONSEGUIR UN CONDÓN ES...?	107
137	¿POR QUÉ LE ES FÁCIL CONSEGUIR CONDONES? (respuesta múltiple)	107
138	¿POR QUÉ LE ES DIFÍCIL CONSEGUIR CONDONES? (respuesta múltiple)	108
139	CANTIDAD DE CONDONES RECIBIDOS GRATIS	108
140	ACCESO AL CONDÓN Estadísticas descriptivas	108
141	ACCESO A CONDONES	109
142	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	109
143	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	109
144	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	110
145	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	110
146	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	110
147	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	111
148	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	111
149	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	111
150	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	112
151	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	112
152	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN RELIGIÓN	112
153	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	113
154	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN ESTADO CIVIL	113

155	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	113
156	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	114
157	ACCESO AL CONDÓN SEGÚN RELACIÓN LABORAL	114
158	ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL NIVEL DE ACCESO AL CONDÓN	115
159	LUGARES QUE CONOCE EN DONDE PUEDE CONSEGUIR LUBRICANTE (respuesta múltiple)	117
160	¿PARA USTED CONSEGUIR LUBRICANTE ES?	117
161	¿ACOSTUMBRA UTILIZAR LUBRICANTE EN RELACIONES SEXUALES?	117
162	¿QUÉ TIPO DE LUBRICANTES USA? (respuesta múltiple)	118
163	¿DISPONE EN ESTE MOMENTO DE LUBRICANTES?	118
164	CUANDO LE BRINDAN CONDONES, ¿LE BRINDAN TAMBIÉN LUBRICANTES?	118
165	ACCESO A LUBRICANTE Estadísticas descriptivas	119
166	ACCESO A LUBRICANTES	119
167	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	119
168	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	120
169	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	120
170	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	120
171	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	121
172	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	121
173	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN SI ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES	121
174	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	122
175	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	122
176	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN ACCESO A CONDONES	122
177	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	123
178	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	123
179	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	123
180	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	124
181	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN RELIGIÓN	124
182	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	125
183	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	125
184	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN ESTADO CIVIL	125
185	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	126
186	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	126
187	ACCESO A LUBRICANTE SEGÚN RELACIÓN LABORAL	127
188	ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL ACCESO A LUBRICANTE	127
189	¿HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO DE VIH?	129
190	¿RAZÓN POR LA QUE USTED DECIDIÓ HACERSE LA PRUEBA DE VIH?	129
191	¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?	129
192	¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	130



193	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	130
194	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	130
195	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBÍ DIAGNÓSTICO DE VIH	131
196	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	131
197	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	131
198	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	132
199	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN RELIGIÓN	132
200	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN ESTADO CIVIL	132
201	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	133
202	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	133
203	¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	133
204	¿DÓNDE SE HIZO LA PRUEBA DE VIH?	134
205	¿ESTÁ ASISTIENDO A CONTROL MÉDICO POR SER UNA PERSONA CON VIH?	134
206	¿CADA CUÁNTO TIENE CONTROL MÉDICO POR SU DIAGNÓSTICO?	134
207	¿REALMENTE CADA CUÁNTO VA A ESE CONTROL MÉDICO?	135
208	¿QUÉ SERVICIOS RECIBE CUANDO ASISTE A CONTROL MÉDICO? (respuesta múltiple)	135
209	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?	137
210	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	137
211	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	137
212	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	138
213	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	138
214	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN ACCESO A CONDONES	138
215	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN ACCESO A LUBRICANTES	139
216	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBÍ DIAGNÓSTICO DE VIH	139
217	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN SI RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH	139
218	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN PROPORCIÓN DE ACCIONES QUE REALIZA PARA CUIDAR SALUD	140
219	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN PROPORCIÓN MOTIVOS PARA CUIDAR SALUD	140
220	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN SI HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES	140
221	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	141
222	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN SI ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES	141
223	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN SI HA TENIDO EFECTOS ADVERSOS POR LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL	141

225	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	141
226	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN SI ALGUIEN QUE LE PUEDA ACOMPAÑAR AL MÉDICO O A UN HOSPITAL	142
227	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN VICTIMIZACIÓN	142
228	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	142
229	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	142
230	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	143
231	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	143
232	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN RELIGIÓN	143
233	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	144
234	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	144
235	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	144
236	¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	145
237	ACCIONES QUE REALIZA PARA CUIDAR SU SALUD (respuesta múltiple)	145
238	MOTIVOS PARA CUIDAR SU SALUD (respuesta múltiple)	146
239	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?	148
240	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	148
241	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	148
242	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	148
243	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	149
244	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	149
245	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN RELIGIÓN	149
246	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	149
247	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN ESTADO CIVIL	150
248	¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	150
249	PROBLEMAS DE SALUD EN ÚLTIMOS TRES MESES (respuesta múltiple)	150
250	¿QUÉ HIZO LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO PROBLEMAS DE SALUD? (respuesta múltiple)	151
251	¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS BUSCÓ AYUDA?	151
252	¿RECIBIÓ RECETA PARA MEDICINAS?	151
253	¿LE SUMINISTRÓ EL CENTRO DONDE CONSULTÓ LA(S) MEDICINA(S)?	152
254	¿CONSIGUIÓ LA MEDICINA RECETADA EN OTRO LUGAR?	152
255	¿TOMÓ O SE APLICÓ LA DOSIS COMPLETA QUE LE RECETARON?	152
256	¿POR QUÉ NO TOMÓ LA DOSIS COMPLETA? (respuesta múltiple)	153
257	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?	154
258	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	154
259	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	155



260	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	155
261	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	155
262	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	156
263	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	156
264	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	156
265	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	157
266	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	157
267	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	157
268	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	158
269	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN RELIGIÓN	158
270	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	158
271	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN ESTADO CIVIL	159
272	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	159
273	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	160
274	¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	160
275	¿PAGO POR SERVICIOS DE SALUD DENTRO DEL SERVICIO PÚBLICO?	161
276	¿CUÁLES SERVICIOS HA TENIDO QUE PAGAR? (respuesta múltiple)	161
277	¿Y HA TENIDO QUE PAGAR SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS?	161
278	¿CUÁLES SERVICIOS PRIVADOS HA TENIDO QUE PAGAR? (respuesta múltiple)	162
279	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?	164
280	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	164
281	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	164
282	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	164
283	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	165
284	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	165
285	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	166
286	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	166
287	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH	166
288	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PROPORCIÓN DE ACCIONES QUE REALIZA PARA CUIDAR SALUD	167
289	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PROPORCIÓN MOTIVOS PARA CUIDAR SALUD	167
290	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	167
291	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	168
292	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	168

293	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	168
294	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN CUÁNTO FUE RECuento DE CD4	168
295	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL	169
296	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI CONOCE LOS RESULTADOS DE SU ÚLTIMO EXAMEN DE CARGA VIRAL	169
297	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN CUÁL FUE EL RECuento DE CARGA VIRAL	169
298	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN VICTIMIZACIÓN	
299	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI SU FAMILIA SABE QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH	169
300	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI ALGUIEN QUE LE PUEDA ACOMPAÑAR AL MÉDICO O A UN HOSPITAL	170
301	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	170
302	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	170
303	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	171
304	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	171
305	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN RELIGIÓN	171
306	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	172
307	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN ESTADO CIVIL	172
308	¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	172
309	¿CÓMO LE PROPORCIONAN SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?	173
310	¿TIEMPO EMPEZÓ A TOMAR MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?	173
311	¿CUÁLES PERSONAS LE BRINDAN ATENCIÓN EN SU CONTROL ANTIRRETROVIRAL? (respuesta múltiple)	174
312	¿CUÁLES ANTIRRETROVIRALES ESTÁ TOMANDO ACTUALMENTE? (respuesta múltiple)	175
313	¿HA TENIDO EFECTOS ADVERSOS POR LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?	176
314	¿QUÉ HIZO CUANDO SE PRESENTARON EFECTOS?	176
315	¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO LA CONSULTA?	176
316	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?	179
317	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	179
318	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN GRUPOS DE EDAD CON 24 AÑOS COMO SEPARADOR	180
319	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	180
320	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	180
321	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	180
322	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	181
323	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	181
324	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN VICTIMIZACIÓN	181



325	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	181
326	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	182
327	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	182
328	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN RELIGIÓN	182
329	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	182
329	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN FRECUENCIA CON	182
330	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	183
331	¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	183
332	ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA LA ADHERENCIA	183
333	¿POR QUÉ HA DEJADO DE TOMAR SU MEDICAMENTO? (respuesta múltiple)	184
334	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?	184
335	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	184
336	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	185
337	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	185
338	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	185
339	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	185
340	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	186
340	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO	186
341	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	186
342	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTE ANTI-RETROVIRAL	186
343	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN VICTIMIZACIÓN	186
343	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN VICTIMIZACIÓN	187
344	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	187
345	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	187
346	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	187
347	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN RELIGIÓN	187
348	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	188
349	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	188
350	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN ESTADO CIVIL	188
351	¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	188
352	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?	189

353	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	189
354	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	189
355	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	189
356	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	190
357	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTE ANTI-RETROVIRAL	190
358	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	190
359	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	190
360	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN RELIGIÓN	191
361	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	191
362	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	191
363	¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	192
364	¿SE ENFERMA MENOS, IGUAL O MÁS QUE SI NO TOMARA LOS ARTV?	193
365	¿VIVE MENOS, IGUAL O MÁS TIEMPO QUE SI NO LOS TOMARA?	193
366	¿TIENE MENOS, IGUAL O MÁS PROBABILIDAD DE TRANSMITIR EL VIH?	194
367	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES Estadísticas descriptivas	194
368	PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTE ANTI-RETROVIRAL	194
369	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	195
370	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	195
371	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	195
372	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	196
373	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBÍ DIAGNÓSTICO DE VIH	196
374	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	196
375	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN SI ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES	197
376	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN VICTIMIZACIÓN	197
377	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	197
378	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	198
379	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	198
380	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	199
381	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN RELIGIÓN	199
382	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	200
383	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN ESTADO CIVIL	200
384	PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	200



385	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?	202
386	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?	203
	SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
387	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	203
388	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	203
389	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	203
390	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	204
391	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	204
392	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	204
393	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	204
394	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	205
395	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	205
396	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	205
397	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN RELIGIÓN	205
398	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN FRECUENCIA	206
399	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	206
400	¿CONOCE LOS RESULTADOS DE SU ÚLTIMO EXAMEN DE CD4?	206
401	¿CUÁNTO FUE RECuento DE CD4?	207
402	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?	207
403	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	207
404	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	208
405	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	208
406	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	208
407	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	209
408	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	209
409	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	209
410	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	209
411	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	210
412	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	210
413	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN RELIGIÓN	210
414	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	210
415	¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	211
416	¿CONOCE LOS RESULTADOS DE SU ÚLTIMO EXAMEN DE CARGA VIRAL?	211
417	¿CUÁL FUE EL RECuento DE CARGA VIRAL?	211

418	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?	213
419	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	213
420	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?	213
	SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	
421	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	214
422	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	214
423	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	214
424	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL	214
425	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	215
426	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	215
427	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	215
428	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	215
429	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN RELIGIÓN	216
430	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	216
431	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	216
432	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN ESTADO CIVIL	216
433	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	217
434	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	217
435	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	217
436	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS? SEGÚN ¿SE HA ENFERMADO DE TUBERCULOSIS?	218
437	¿SE HA ENFERMADO DE TUBERCULOSIS?	218
438	¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA CURAR LA TUBERCULOSIS?	218
439	¿VÍCTIMA DE MALTRATO EN SERVICIOS DE SALUD POR SER PERSONA CON VIH?	220
440	¿CONSIDERA NECESARIO OCULTAR QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH?	220
441	POR TRABAJO, ¿LE HAN OBLIGADO A REALIZARSE EXAMEN DE VIH?	221
442	¿SU FAMILIA SABE QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH?	221
443	¿QUÉ HIZO SU FAMILIA CUANDO SE ENTERÓ DE SU DIAGNÓSTICO?	221
444	¿NECESIDAD DE OCULTAR QUE ES PERSONA CON VIH AL BUSCAR TRABAJO?	222
445	¿ALGUIEN QUE LE PUEDA ACOMPAÑAR AL MÉDICO O A UN HOSPITAL?	222
446	¿DENUNCIARÍA USTED UN ACTO DE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS?	222
447	¿POR QUÉ RAZÓN NO DENUNCIARÍA? (respuesta múltiple)	223
448	VICTIMIZACIÓN Estadísticas descriptivas	223
449	VICTIMIZACIÓN	223
450	VICTIMIZACIÓN SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	224
451	VICTIMIZACIÓN SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	224
452	VICTIMIZACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	224
453	VICTIMIZACIÓN SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	225
454	VICTIMIZACIÓN SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	225



455	VICTIMIZACIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	225
456	VICTIMIZACIÓN SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	226
457	VICTIMIZACIÓN SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	226
458	VICTIMIZACIÓN SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	226
459	VICTIMIZACIÓN SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	226
460	VICTIMIZACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	227
461	VICTIMIZACIÓN SEGÚN RELIGIÓN	227
462	VICTIMIZACIÓN SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	228
463	VICTIMIZACIÓN SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	228
464	VICTIMIZACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL	228
465	VICTIMIZACIÓN SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	229
466	VICTIMIZACIÓN SEGÚN RELACIÓN LABORAL	229
467	¿USTED HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?	231
468	COPAS O CERVEZAS CONSUMIDAS EN UN MES	231
469	¿CUÁLES DROGAS HA CONSUMIDO? (respuesta múltiple)	232
470	CANTIDAD DE VECES QUE CONSUME DROGA EN UN MES	232
471	¿OTRA PERSONA UTILIZÓ EL MISMO EQUIPO DE INYECCIÓN QUE USTED USÓ?	233
472	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS Estadísticas descriptivas	233
473	CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	233
474	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	234
475	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	234
476	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	234
477	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	235
478	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	235
479	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	235
480	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	236
481	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN VICTIMIZACIÓN	236
482	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	236
483	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	237
484	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	237
485	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	237
486	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	238
487	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN RELIGIÓN	238
488	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	239
489	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	239
490	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN ESTADO CIVIL	239
491	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	240
492	CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS SEGÚN RELACIÓN LABORAL	240
493	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?	242
494	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	242

495	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	242
496	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	243
497	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	243
498	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	243
499	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	243
500	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	244
501	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	244
502	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	244
503	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	244
504	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN RELIGIÓN	245
505	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	245
506	¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	245
507	¿SU PAREJA ESTABLE ES UNA PERSONA CON VIH?	246
508	¿SU PAREJA ESTABLE SABE QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH?	246
509	LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES ¿USARON CONDÓN?	246
510	¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN CON PAREJA ESTABLE?	247
511	¿POR QUÉ NO USÓ EL CONDÓN CON SU PAREJA ESTABLE? (respuesta múltiple)	247
512	¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ CONDOMES CON SU PAREJA SEXUAL ESTABLE?	248
513	LA ÚLTIMA VEZ, ¿USARON LUBRICANTE TODO EL TIEMPO DE LA PENETRACIÓN?	248
514	¿ACOSTUMBRAN, UTILIZAR EN SUS RELACIONES SEXUALES LUBRICANTE?	248
515	¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ LUBRICANTE CON SU PAREJA ESTABLE?	249
516	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	251
517	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	251
	SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
518	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	252
519	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	252
	SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	
520	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	252
	SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	
521	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	253
	SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	
522	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	253
	SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	
523	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	253
	SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	
524	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	253
	SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
525	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	254
526	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	254
527	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	254
528	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN RELIGIÓN	254
529	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?	255
	SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	



530	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN ESTADO CIVIL	255
531	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	255
532	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	256
533	¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	256
534	¿USÓ CONDÓN CON ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL?	256
535	¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN CON PAREJA OCASIONAL?	257
536	POR QUÉ NO USÓ EL CONDÓN CON PAREJA OCASIONAL? (respuesta múltiple)	258
537	¿CON QUÉ FRECUENCIA USA CONDÓN CON PAREJAS OCASIONALES?	258
538	ÚLTIMA VEZ, ¿USÓ LUBRICANTE TODO EL TIEMPO DE LA PENETRACIÓN?	259
539	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	259
540	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	259
	SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
541	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	260
542	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	260
543	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	260
	SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	
544	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	261
	SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	
545	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	261
	SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	
546	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	261
	SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
547	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	262
548	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN RELIGIÓN	262
549	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	262
	SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	
550	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	263
	SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	
551	¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	263
552	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?	263
553	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?	264
	SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
554	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	264
555	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?	264
	SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	
556	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?	265
	SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
557	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	265
558	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	265
559	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN RELIGIÓN	266
560	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?	266
	SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	

561	¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	266
562	¿DÓNDE ACOSTUMBRA TENER ENCUENTROS SEXUALES OCASIONALES? (respuesta múltiple)	267
563	LA ÚLTIMA RELACIÓN ¿FUE CON UNA PERSONA CONOCIDA O DESCONOCIDA?	267
564	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	269
565	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	269
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA		
566	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	269
567	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	270
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS		
568	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	270
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH		
569	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	270
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE		
570	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	271
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA		
571	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	271
572	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO? SEGÚN RELIGIÓN	271
573	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	272
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA		
574	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?	272
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO		
575	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO? SEGÚN ESTADO CIVIL	272
576	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	273
577	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	273
578	¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	273
579	¿QUÉ SERVICIOS SEXUALES HA COMPRADO? (respuesta múltiple)	274
580	LA ÚLTIMA VEZ QUE PAGÓ, ¿UTILIZARON CONDÓN?	274
581	¿POR QUÉ NO USÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL? (respuesta múltiple)	274
582	¿CON QUÉ FRECUENCIA USA CONDÓN CUANDO PAGA?	275
583	ÚLTIMA VEZ QUE PAGÓ ¿UTILIZARON LUBRICANTE DURANTE PENETRACIÓN?	275
584	¿USTED DICE A TRABAJADORES/AS SEXUALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?	275
585	¿SABE USTED SI ALGUNA DE LAS PERSONAS A LAS QUE PAGÓ TENÍA VIH?	276
586	¿CON QUÉ TIPO DE PAREJA TUVO LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL?	278
587	LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES ¿UTILIZARON CONDÓN?	278
588	LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES ¿UTILIZARON CONDÓN?	278
SEGÚN GRUPOS DE EDAD CON 24 AÑOS COMO SEPARADOR		
589	¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN?	279
590	¿POR QUÉ NO USÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL? (respuesta múltiple)	279
591	EN ÚLTIMA RELACIÓN, ¿USÓ LUBRICANTE DURANTE LA PENETRACIÓN?	279
592	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?	280
593	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	280
594	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	280



595	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	281
596	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	281
597	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	281
598	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	282
599	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	282
600	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	282
601	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	283
602	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	283
603	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	283
604	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	284
605	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN RELIGIÓN	284
606	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	284
607	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	285
608	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN ESTADO CIVIL	285
609	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	285
610	¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	286
611	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?	286
612	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	286
613	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	287
614	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	287
615	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	287
616	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	288
617	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	288
618	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	288
619	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	288
620	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	289
621	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	289
622	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN RELIGIÓN	289
623	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	289
624	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN ESTADO CIVIL	290
625	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	290

626	¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	290
627	¿EN ÚLTIMO MES HA TENIDO RELACIONES SIN USAR UN CONDÓN?	291
628	¿EN ÚLTIMO MES HA TENIDO RELACIONES ANALES SIN CONDÓN?	291
629	¿EN ÚLTIMO MES ALGÚN HOMBRE EYACULÓ EN SU BOCA SIN CONDÓN?	291
630	¿USÓ LUBRICANTE EN TODAS SUS RELACIONES SEXUALES?	291
631	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	293
632	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	293
	SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
633	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	294
634	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	294
	SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	
635	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	294
	SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	
636	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	295
	SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	
637	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	295
	SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	
638	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	295
	SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	
639	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL? SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	295
640	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL? SEGÚN RELIGIÓN	296
641	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	296
	SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	
642	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?	296
	SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	
643	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL? SEGÚN ESTADO CIVIL	297
644	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL? SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	297
645	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	297
646	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	298
647	EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMERCIAL	298
648	¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH?	298
649	¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	299
650	¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH? SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	299
651	¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH? SEGÚN RELACIÓN LABORAL	299
652	EL ÚLTIMO AÑO ¿HA HECHO TRABAJO SEXUAL EN OTRAS CIUDADES?	300
653	EL ÚLTIMO AÑO ¿HA HECHO TRABAJO SEXUAL EN OTRO PAÍS?	300
654	LUGAR PRINCIPAL DE TRABAJO SEXUAL	300
655	CANTIDAD DE CLIENTES POR SEMANA	301
656	LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES CON UN CLIENTE, ¿USARON CONDÓN?	301
657	¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN EN ÚLTIMO TRABAJO SEXUAL?	301
658	¿POR QUÉ NO USARON EL CONDÓN USTED Y SU CLIENTE ESA ÚLTIMA VEZ? (respuesta múltiple)	302
659	EN ÚLTIMO TRABAJO SEXUAL ¿USARON CONDÓN EN TODA LA PENETRACIÓN?	302
660	EN ÚLTIMO TRABAJO ¿USARON LUBRICANTE EN TODA LA PENETRACIÓN?	302



661	¿CON QUE FRECUENCIA USA EL CONDÓN EN RELACIONES CON CLIENTES?	303
662	¿CON QUE FRECUENCIA USA LUBRICANTE EN RELACIONES CON CLIENTES?	303
663	¿CUÁNDO DEJA DE USAR EL CONDÓN? (respuesta múltiple)	304
664	USO DEL CONDÓN Estadísticas descriptivas	305
665	USO DE CONDÓN	305
666	USO DEL CONDÓN SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	306
667	USO DEL CONDÓN SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	306
668	USO DEL CONDÓN SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	306
669	USO DEL CONDÓN SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	307
670	USO DEL CONDÓN SEGÚN ACCESO A CONDOMES	307
671	USO DEL CONDÓN SEGÚN ACCESO A LUBRICANTES	307
672	USO DEL CONDÓN SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	308
673	USO DEL CONDÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	308
674	USO DEL CONDÓN SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	308
675	USO DEL CONDÓN SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	309
676	USO DEL CONDÓN SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	309
677	USO DEL CONDÓN SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	309
678	USO DEL CONDÓN SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	309
679	USO DEL CONDÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	310
680	USO DEL CONDÓN SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	310
681	USO DEL CONDÓN SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	310
682	USO DEL CONDÓN SEGÚN ESTADO CIVIL	311
683	USO DEL CONDÓN SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	311
684	USO DEL CONDÓN SEGÚN RELACIÓN LABORAL	311
685	ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL USO DEL CONDÓN	312
686	USO DE LUBRICANTE Estadísticas descriptivas	314
687	USO DE LUBRICANTE	314
688	USO DE LUBRICANTE SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA	314
689	USO DE LUBRICANTE SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA	315
690	USO DE LUBRICANTE SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO	315
691	USO DE LUBRICANTE SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS	315
692	USO DE LUBRICANTE SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS	316
693	USO DE LUBRICANTE SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH	316
694	USO DE LUBRICANTE SEGÚN ACCESO A CONDOMES	316
695	USO DE LUBRICANTE SEGÚN ACCESO A LUBRICANTES	317
696	USO DE LUBRICANTE SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH	317
697	USO DE LUBRICANTE SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD	317
698	USO DE LUBRICANTE SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS	318
699	USO DE LUBRICANTE SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE	318
700	USO DE LUBRICANTE SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA	318
701	USO DE LUBRICANTE SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO	319
702	USO DE LUBRICANTE SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR	319

703	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS	319
704	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN RELIGIÓN	320
705	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA	320
706	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO	320
707	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN ESTADO CIVIL	321
708	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD	321
709	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL	322
710	USO DE LUBRICANTE	SEGÚN RELACIÓN LABORAL	322
711	ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL USO DEL LUBRICANTE		323



PRESENTACIÓN



INTRODUCCIÓN

La sociedad civil ha jugado un papel central en los esfuerzos de enfrentamiento de la epidemia de VIH, tanto en su participación en instancias de toma de decisión como en el planeamiento y puesta en práctica de estrategias de capacitación y de abogacía en pro de una atención integral y en la reducción del estigma y la discriminación para asegurar una mejor calidad de vida para las Personas con VIH.

En Centroamérica se formó hace más de 12 años una red regional de Personas con VIH bajo el nombre de REDCA+ y que coordina organizaciones a nivel de los cinco países más Belice y Panamá.

Una parte fundamental del aporte de esta organización ha sido el desarrollo de investigación que permita la toma de decisiones informadas y la planificación de actividades con base en evidencia empírica sobre la situación de las personas VIH en la región.

Un primer esfuerzo importante se realizó en 2010 con un estudio en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá que permitió recabar información clave sobre características sociodemográficas, comportamientos sexuales, situación de salud, uso del condón y calidad de vida de las personas VIH.

En 2012 se implementó un segundo estudio con cobertura en los siete países y con una revisión y ampliación considerable del cuestionario.

En 2014 se ha diseñado una nueva ronda de investigación con el fin de actualizar indicadores y estadísticas en toda la región.

Una vez más, se ha hecho un afinamiento importante del cuestionario que sirve de guía para la entrevista y se diseñó para cada país una muestra de personas VIH conformada por 500 sujetos de los centros de salud en donde existe servicio de control para esta población y 200 personas que participan en el Programa de Visitas Domiciliarias.

El presente documento muestra los resultados obtenidos en este estudio para toda la región, con excepción de Guatemala que por razones administrativas no pudo participar en el proceso. A continuación se plantean los objetivos y la metodología que orientaron la investigación. En una segunda sección se presentan los resultados para cada una de las preguntas del cuestionario y en un tercer apartado se resumen los principales hallazgos y se sugieren algunas recomendaciones derivadas de los resultados. En el anexo se presenta el cuestionario utilizado como guía para la recolección de la información.



Objetivos

El estudio tiene los siguientes objetivos:

I. OBJETIVOS GENERALES

1. Describir las características socio demográficas, el comportamiento vinculado al VIH y el uso de los servicios de atención de salud de las Personas con VIH en la Región Centroamericana durante 2014.
2. Producir información detallada que sirva de base para planificar nuevas y mejores estrategias de intervención para promover prevención y mejorar las condiciones de vida de las Personas con VIH.

I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Conocer las características socio demográficas de las personas diagnosticadas con VIH en la Región Centroamericana.
2. Determinar las pautas de comportamiento sexual de las Personas con VIH.
3. Identificar las características asociadas al uso del condón en las Personas con VIH.
4. Describir las condiciones de salud de las Personas con VIH.
5. Identificar las características asociadas a la adherencia a la TAR en los últimos doce meses en Personas con VIH.
6. Determinar perfiles de riesgo en las prácticas sexuales de las Personas con VIH según características socio demográficas, consumo de alcohol y drogas, experiencia de discriminación, estigma y/o apoyo.
7. Determinar perfiles de riesgo en la adherencia a la TAR según características socio demográficas, consumo de alcohol y drogas, experiencia de discriminación, estigma y/o apoyo y comportamiento sexual.

Metodología

I. DISEÑO

El estudio fue de corte transversal, dirigido a Personas con VIH seleccionadas aleatoriamente en los servicios de salud y con un censo de las personas que forman parte del Programa de Visitas Domiciliarias en seis de los siete países beneficiarios del Programa REDCA+. Después de la colecta de datos de la encuesta, se analizan los resultados para conocer las características sociodemográficas, así como la identificación de los hábitos asociados al uso del condón y lubricante en la última relación sexual, la adherencia a TAR en los últimos 12 meses, las condiciones de salud, la actividad sexual, la victimización y los conocimientos sobre VIH, para posteriormente diseñar estrategias y tomar decisiones programáticas en cada país.

II. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Los niveles de prevalencia por país son muy disímiles, por lo que no resulta conveniente un muestreo proporcional. Por el contrario, se trabajó con una muestra fija de 700 personas por país, a excepción de Belice, que por presentar una población muy pequeña se le fija un tamaño de 384 personas. Luego, para el cálculo a nivel regional se procedió a ponderar la base de datos con respecto a la distribución de la población de Personas con VIH en cada país.

En todos los casos, se intentó entrevistar en cada país a la totalidad de las personas del Programa de Visitas Domiciliarias, que corresponde aproximadamente a 200.

Las otras 500 personas se seleccionaron en los centros de salud que atienden a Personas con VIH.

Para cada país se utilizó como marco muestral el listado que preparó cada organización coordinadora con el total de los centros de salud y la respectiva cantidad de Personas con VIH atendidas al año.

El proceso de selección fue polietápico, escogiéndose como conglomerados primero los centros a visitar en cada país. En cada uno de ellos se estableció un tamaño muestral proporcional a la cantidad de Personas con VIH atendidas al año. Dentro de cada centro de salud seleccionado se escogió a las personas a entrevistar mediante un procedimiento sistemático, escogiendo a las personas en función de su presentación al servicio de salud.

El procedimiento de muestreo utilizado y el tamaño sugerido permite trabajar con un nivel de error máximo de 3,7% por país y con un nivel de confianza del 95%, asumiendo variabilidad máxima en las distribuciones proporcionales.

III. POBLACIÓN DE REFERENCIA

La recolección de la información se realiza con referencia a los centros de salud, pues es el medio más adecuado para localizar a Personas con VIH concentradas. Sin embargo, este procedimiento limita de manera muy importante la población de referencia, pues existe en cada país una diferencia grande entre la prevalencia reportada y la cantidad de Personas con VIH que asisten a los centros de salud. Ante esta situación resulta muy importante limitar los alcances de la generalización que se pretenda por país y para toda la región, de modo que en todos los casos se definirá la población del siguiente modo:

Personas con VIH de 18 años o más que asisten a consulta a los centros de salud que brindan atención especializada para estas personas o que forman parte del servicio de visita domiciliar.

Siendo así, se establecen los siguientes criterios de inclusión, tanto en la población como en la muestra:

- Ser persona diagnosticada con VIH
- Tener 18 años o más
- Dar su consentimiento informado en forma verbal para participar en el estudio
- Asistir a uno de los servicios de salud para Personas con VIH o ser beneficiario/a del programa de visita domiciliar de REDCA+.



Por otra parte, se establecen los siguientes criterios de exclusión en la muestra:

- Persona bajo efecto de alcohol o drogas al momento de la entrevista
- Personas en crisis de salud física y/o mental

En el caso de las personas del Programa de Visitas Domiciliarias se realizó en cada país un censo, por lo que no se estableció ningún tipo de muestreo.

IV. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La información se obtuvo mediante entrevistas personales cara a cara, utilizando como guía un cuestionario estructurado diseñado en conjunto en un taller programado especialmente para este fin y constituido por personal de REDCA+, una o un representante de cada una de las organizaciones de cada país participante y por el consultor metodológico. En un anexo se adjunta la versión final de este cuestionario.

La recolección de la información estuvo a cargo de las siguientes organizaciones en cada país:

Belice: Organización CNET
Costa Rica: Esperanza Viva y Manú
El Salvador: Asociación Atlacatl Vivo Positivo
Honduras: Fundación Llaves
Nicaragua: ANICP+VIDA
Panamá: La Asociación Viviendo Positivamente

Para orientar y normalizar el trabajo de campo, se elaboró un Manual del/la Entrevistador/a que brinda toda la información necesaria para que cada persona entrevistadora realice su trabajo con objetividad y precisión.

El trabajo de campo estuvo supervisado por personal especial de cada organización y por personal de REDCA+. También se elaboró un Manual del/la Supervisor/a de Campo con el fin de orientar dicha labor de coordinación en cada centro de salud y en las viviendas visitadas.

La recolección de la información con pequeñas variantes por país se realizó en los meses de julio a diciembre de 2014.



V. DIMENSIONES A EVALUAR

A través del cuestionario se pretende obtener información relevante sobre las siguientes 14 dimensiones:

1. Características sociodemográficos.
2. Participación en grupos de autoayuda.
3. Perspectiva de futuro.
4. Comportamiento sexual.
5. Planificación y embarazo.
6. Conocimientos, opiniones y actitudes respecto al VIH.
7. Acceso y uso del condón.
8. Situación de salud.
9. Discriminación, estigma, apoyo y derechos
10. Uso de alcohol y drogas
11. Relaciones sexuales con parejas estables.
12. Relaciones sexuales con parejas ocasionales.
13. Relaciones sexuales con trabajadores/as sexuales.
14. Última relación sexual.
15. Trabajo sexual

VI. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

La información obtenida en cada país fue digitalizada mediante un programa diseñado especialmente para la ocasión en Visual Basic.

Para el caso del presente informe regional, se procedió a pesar la base de datos por país, de modo que la distribución de las diferentes muestras se ajustara a las proporciones reales de personas con VIH en cada uno.

A. Análisis descriptivos:

1- El informe presenta los resultados respetando las mismas secciones que dividen al cuestionario.

2- En cada sección, cada una de las preguntas o ítems del cuestionario se analiza mediante distribución de frecuencias que muestra valores absolutos y relativos.

3- Los porcentajes se calculan utilizando como total la cantidad de respuestas válidas, es decir, sin tomar en cuenta las personas que no responden ni aquellas a las que no les aplica la pregunta, cuando ésta depende de una pregunta filtro.

3- Para las preguntas claves de cada sección se presenta también un gráfico.



4- En algunos casos, las respuestas solo adquieren sentido si se cruzan con alguna otra pregunta, de modo que para éstas se presenta una tabla de distribución de frecuencias para cada una de las categorías de la variable con la que se cruza.

5- En otros casos, la pregunta prevé más de una respuesta, por lo que la tabla muestra un total de respuestas que normalmente será superior al total de sujetos que respondieron. Para diferenciar estas preguntas de las tradicionales, siempre se especificará en el título que se trata de un caso de respuesta múltiple.

6- En cada sección se han seleccionado preguntas claves que se analizan con mayor detalle, estableciendo un gráfico, pero también analizando su distribución según determinadas variables de control. Estos cruces se evaluarán mediante la distribución χ^2 . Solo se mostrarán y comentarán aquellas tablas que resulten con una chi cuadrada significativa al 0,05 o menos.

La única excepción corresponde a las tablas de distribución por país, las cuales siempre se presentarán, independientemente de si existen o no diferencias estadísticamente significativas.

7- En todos los casos se presentan los porcentajes según columna, es decir, se distribuye la variable principal en cada una de las categorías de la variable de control.

B. Recodificación de variables continuas:

En el cuestionario existen diferentes variables continuas que se recodifican para facilitar su análisis, pero manteniendo la variable original para utilizarla en los análisis multivariados.

C. Indicadores:

Interesa resumir la información mediante el desarrollo de índices o indicadores que combinen diferentes preguntas. En todos los casos, la combinación se hace mediante la suma de las respuestas a las preguntas combinadas, previa transformación de éstas a una misma escala. El resultado de la suma se transforma a su vez a una escala que varía de 0 y 100 para facilitar su interpretación. En cada caso se mostrará el mínimo, el máximo, el promedio y la desviación estándar resultante del índice correspondiente.

Estos índices se cruzarán también según diferentes variables de control y se analizará el correspondiente nivel de significancia con la distribución t de Student o F de Fisher, dependiendo del tipo de variable de control. En todos los casos, estos cruces se presentarán y comentarán solo si la significancia es igual o inferior a 0,05; a excepción, de nuevo, de los cruces por país.

Para facilitar su interpretación, en todos los casos, además de la variable continua se crea una segunda variable que recodifica el indicador en las siguientes cuatro categorías:

- Muy baja (de 0 a 25)
- Media baja (de más de 25 a 50)
- Media alta (de más de 50 a 75)
- Muy alta (de más de 75 a 100)

D. Análisis de regresión múltiple:

Se realizará un análisis de regresión (múltiple o logística, según el tipo de variable dependiente) para las siguientes preguntas o indicadores:

- Perspectiva de futuro
- Conocimientos sobre VIH
- Acceso al condón
- Acceso a lubricante
- P534
- Uso del condón
- Uso de lubricante


VII. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

En total se trabajó con una muestra de 3893 Personas con VIH distribuidas en todo el territorio de cada país. El 41% de las personas corresponde al Programa de Visitas Domiciliarias, mientras que el 57,2% fue entrevistado en servicios de salud. Además, un 1,9% fue localizado por otras vías en Belice (ver cuadro # 1).

La mayoría de las personas entrevistadas tienen edades medias, comprendidas entre 26 y 45 años (ver cuadro # 2).

El 48,6% se manifiesta con identidad de género femenino, un 49,4% masculino, un 1,1% mujer trans y un 0,9% se identifica como hombre trans (ver cuadro # 3).

GRÁFICO # 1
NIVEL EDUCATIVO



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


El 88,1% de las personas sabe leer y escribir (ver cuadro # 4) y de éstas, la mayoría tiene un nivel educativo medio, privando la primaria o secundaria completa o incompleta (ver cuadro # 5 y gráfico # 1).

Existe un 21,1% que afirma no tener ninguna religión, del resto, un 39,2% se declara católico, mientras que un 34,7% pertenecen a iglesias cristiano-evangélicas (ver cuadro # 6). La mayor parte asiste al culto de su templo al menos una vez mes (ver cuadro # 7).

Casi todas las personas entrevistadas (98%) residen permanentemente en su país (ver cuadro # 8). Pero un 18,6% ha cambiado su lugar de residencia después de conocer que era una Persona con VIH (ver cuadro # 9). El principal motivo para cambiar de residencia radica en la búsqueda de mejores condiciones familiares o de vecindario (ver cuadro # 10). Por otra parte, existe una pequeña proporción de las personas que han cambiado de residencia que indica haber tenido problemas por su traslado, especialmente en lo que se refiere al acceso al tratamiento antirretroviral (ver cuadro # 11).

Poco menos de la mitad de las personas tiene actualmente una pareja estable (ver cuadro # 12), mientras que un 49% se declara soltero/a, un 41,9% casado o en unión libre, un 3,8% separado/a o divorciado/a y un 5,3% viudo/a (ver cuadro # 13). El 53,5% vivía con su familia en el momento de la entrevista y un 27,6% solo con su pareja (ver cuadro # 14).

GRÁFICO # 2
NIVEL DE ACTIVIDAD




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Solo el 41,7% de las personas entrevistadas se encuentra trabajando, mientras que un 26,5% se declara desempleado o desempleada (ver cuadro # 15 y gráfico # 2). Entre los que se encuentran laborando, un 36,4% lo hace en actividades de apoyo al proceso administrativo y/o en atención al público y un 25,1% en ocupaciones no calificadas (ver cuadro # 16). Un 38,3% dice trabajar por cuenta propia, mientras que un 34,8% trabaja como empleado/a en la empresa privada (ver cuadro # 17). Existe un 20,7% que tiene un ingreso adicional al de la ocupación principal (ver cuadro # 18). El nivel de ingreso es muy variable entre las personas de la muestra, pero sobresale un 54% que gana entre \$501 y \$1000 al mes (ver cuadro # 19).

La gran mayoría de las personas tienen al menos un dependiente y el 58,8% tiene de 2 a 5 (ver cuadro # 20).


GRÁFICO # 3
ORIENTACIÓN SEXUAL SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Entre las personas que se identifican con el género femenino, la gran mayoría (96,9%) solo practican sexo con hombres. Por el contrario, entre los hombres existe bastante variabilidad, con un 30,5% que solo tiene sexo con hombres, un 55% solo con mujeres y el resto en diferentes proporciones, tanto de hombres como de mujeres. Para las personas que se identifican como mujeres trans un 88,1% solo tiene sexo con hombres, un 2,4% con mujeres y ocasionalmente con hombres y un 9,5% solo con mujeres. Entre los hombres trans el 82,8% dice tener relaciones sexuales solo con hombres, un 6,9% solo con mujeres y el resto dice practicar la bisexualidad (ver cuadro # 21 y gráfico # 3).

GRÁFICO # 4
HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH



Por último, la mayoría de las personas entrevistadas recibió su diagnóstico de VIH hace 3 años o más, un 13,7% hace uno o dos años y el resto hace apenas meses (ver cuadro # 22 y gráfico # 4).

Cuadro # 1
LUGAR DE ENTREVISTA

	Frecuencia	Porcentaje
Servicio de Salud	1595	41,0
Visita domiciliar	2226	57,2
Otros	73	1,9
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 2
EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Frecuencia	Porcentaje
25 o menos	435	11,2
De 26 a 35	1174	30,2
De 36 a 45	1271	32,7
De 46 a 60	841	21,6
Más de 60	164	4,2
Total	3884	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		4
Sistema		5
Total		9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 3
¿CÓMO DEFINIRÍA USTED SU IDENTIDAD DE GÉNERO?

	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	1891	48,6
Masculino	1925	49,4
Mujer trans	44	1,1
Hombre trans	33	,9
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 4
¿SABE LEER Y ESCRIBIR?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3406	88,1
No	461	11,9
Total	3867	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		26

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 5
¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE?

	Frecuencia	Porcentaje
No asistió a la escuela	27	,8
Alfabetizada	72	2,1
Primaria incompleta	719	21,1
Primaria completa	694	20,4
Secundaria incompleta	701	20,6
Secundaria completa	738	21,7
Universitaria incompleta	286	8,4
Universitaria completa	151	4,4
Post grado universitario	12	,3
Total	3399	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		7
No aplica		487
Total		494

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 6
¿CUÁL ES SU RELIGIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Católica	1519	39,2
Cristiana Evangélica	1343	34,7
Testigo de Jehová	60	1,5
Adventista	59	1,5
Mormón/a	25	,7
Otra	52	1,3
Ninguna	817	21,1
Total	3874	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		19

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 7
¿CUÁNTAS VECES POR MES ASISTE A SU IGLESIA?

	Frecuencia	Porcentaje
Al menos una vez por semana	1495	49,5
Una, dos o tres veces al mes	643	21,3
Menos de una vez por mes	494	16,4
Nunca	389	12,9
Total	3020	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		37
No aplica		836
Total		873

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 8
¿RESIDE USTED PERMANENTEMENTE EN ESTE PAÍS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3801	98,0
No	78	2,0
Total	3879	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		14

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 9
¿HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE QUE SUPO QUE TENÍA VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	720	18,6
No	3159	81,4
Total	3880	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		13

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 10
¿CUÁL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL CAMBIÓ DE RESIDENCIA?

	Frecuencia	Porcentaje
Búsqueda de trabajo	134	20,8
Por razones de trabajo	110	17,1
Discriminación por su condición de persona con VIH	120	18,6
Búsqueda de mejores condiciones familiares de vivienda o de comunidad	282	43,6
Total	646	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		74
No aplica		3173
Total		3247

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 11
PROBLEMAS POR CAMBIAR DE RESIDENCIA
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Acceso a tratamiento antirretroviral	90	64,0
Acceso a condones	18	13,1
Acceso a lubricantes	12	8,6
Acceso a servicios de salud	66	47,1
Total	141	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		579
No aplica		3173
Total		3752

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 12
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1812	46,6
No	2077	53,4
Total	3889	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 13
¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL?

	Frecuencia	Porcentaje
Soltero/a	1897	49,0
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	41,9
Separado/a o divorciado/a	147	3,8
Viudo/a	204	5,3
Total	3872	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		21

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 14
CON QUIÉN VIVE ACUTALMENTE
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Vive con su pareja	1069	27,6
Vive con la familia de su pareja	137	3,5
Vive con su familia	2071	53,5
Vive solo/a	539	13,9
Vive con amiga (o)	122	3,1
Otro	151	3,9
Total	3875	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		18

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 15
NIVEL DE ACTIVIDAD

	Frecuencia	Porcentaje
Solo trabaja	1612	41,7
Estudia y trabaja	116	3,0
Está desempleado	1026	26,5
Es pensionado o rentista	99	2,6
Solo estudia	103	2,7
Solo se dedica a tareas del hogar	850	22,0
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	1,7
Total	3871	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		22

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 16
OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Frecuencia	Porcentaje
Rentas	1	,1
Directivo de la administración pública o de empresas privadas	11	,7
Profesional	111	6,5
Técnico medio	277	16,2
Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	622	36,4
Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	109	6,4
Calificadas de industrias, construcción y operación	149	8,7
No calificadas	429	25,1
Total	1710	100,0

Personas fuera del análisis		
No contesta		18
No aplica		2164
Total		2183

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 17
RELACIÓN LABORAL

	Frecuencia	Porcentaje
No remunerado	35	2,0
Empleado del Gobierno o Institución	172	10,2
Empleado de empresa privada	589	34,8
Servicio doméstico	117	7,0
Cuenta propia	647	38,3
Patrono con menos de 10 empleados	112	6,6
Patrono con 10 o más empleados	18	1,0
Total	1690	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		38
No aplica		2164
Total		2203

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 18
¿TIENE OTRA FUENTE DE INGRESO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	343	20,7
No	1317	79,3
Total	1661	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		68
No aplica		2164
Total		2232

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 19
INGRESO MENSUAL EN DÓLARES

	Frecuencia	Porcentaje
No sabe	132	4,3
\$50 o menos	84	2,7
De \$51 a \$100	151	4,9
De \$101 a \$200	297	9,7
De \$201 a \$300	270	8,8
De \$301 a \$500	437	14,2
De \$501 a 1000	1662	54,0
Más de \$1000	46	1,5
Total	3078	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		114
No recibe ingreso		340
Sistema		361
Total		815

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 20
NÚMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE

	Frecuencia	Porcentaje
Ninguno	252	15,3
Uno	361	21,9
De 2 a 5	969	58,8
Más de 5	65	3,9
Total	1647	100,0
Personas fuera del análisis		
No aplica		2164
No contesta		81
Total		2246

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 21
ACTIVIDAD SEXUAL
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

identidad de género	Femenino		Masculino		Mujer trans		Hombre trans	
Orientación sexual	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Solo práctica sexo con hombres	1689	96,9	543	30,5	37	88,1	24	82,8
Práctica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	1,1	67	3,8	0	0,0	1	3,4
Práctica el sexo tanto con hombres como con mujeres	7	0,4	108	6,1	0	0,0	2	6,9
Práctica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	5	0,3	82	4,6	1	2,4	0	0,0
Solo práctica el sexo con mujeres	23	1,3	979	55,0	4	9,5	2	6,9
Total	1743	100,0	1779	100,0	42	100,0	29	100,0
Personas fuera del análisis								
No contesta		55		50		1		2
No aplica		93		95		2		1
Total		148		145		3		3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 22
¿HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED
EL DIAGNÓSTICO DE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 mes	47	1,2
De 1 a 5 meses	159	4,1
De 6 a 11 meses	134	3,5
De 1 o 2 años	530	13,7
De 3 a 5 años	901	23,3
De 5 a 10 años	1231	31,8
Más de 10 años	871	22,5
Total	3873	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		20

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Como ya se ha mencionado en el procedimiento metodológico, no existe un marco muestral de la población por país de Personas con VIH y no puede establecerse en forma precisa, puesto que existen muchas exclusiones sistemáticas debido a múltiples factores, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

- Personas con VIH que nunca se han hecho el examen o que no conocen el resultado
- Personas con VIH que conocen su diagnóstico pero que no asisten a los centros de salud especializados en su atención
- Personas con VIH que conocen su diagnóstico pero que asisten de manera muy asistemática a los centros de salud

En todos estos casos es esperable que no exista adherencia al tratamiento o que la misma sea muy deficiente.

Por lo tanto, cualquier valoración que se establezca con una muestra de personas que asisten a los centros de salud visitados resultará necesariamente en una sobrevaloración de la proporción de adherencia en cada país. De ahí la importancia de insistir en la definición precisa de la población que se ha establecido en este informe antes de pretender cualquier tipo de generalización por país o a nivel regional.

Además de la importante limitación descrita hasta aquí, debe también mencionarse el sesgo que pueda implicar el nivel de rechazo a la entrevista, puesto que podría estar excluyendo sistemáticamente a Personas con VIH con alguna característica especial que le hace rechazarla, como, por ejemplo, el deseo de permanecer absolutamente en el anonimato, por más que se le garantice el mismo en el proceso de entrevista.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los individuos fueron informados sobre la encuesta y su propósito y se pidió su consentimiento informado. El mismo se hizo a nivel verbal para garantizar el anonimato y la confidencialidad de la información suministrada. Todos los datos que proporcionó la persona encuestada son absolutamente confidenciales y se analizan sin utilizar el nombre de las personas o cualquier otro tipo de identificación personal. El cuestionario es anónimo y cada boleta se identifica únicamente por un número consecutivo por país.

La participación en el estudio no implicó ningún riesgo para la salud de los participantes y de ninguna manera estuvo condicionada por los apoyos recibidos por parte del programa, grupo de autoayuda, o centro de salud. La participación en la encuesta quedó a decisión del participante y se obtuvo el consentimiento informado antes de proceder a la entrevista.

En este estudio no se realizaron tomas de muestras de biomarcadores por lo que no hubo toma de muestras de ningún fluido o excreta corporal. No se ofertó tampoco prueba rápida de detección de VIH ya que el estudio está dirigido a personas que son seropositivas.




RESULTADOS



PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE AUTOAYUDA Y PERSPECTIVA DE FUTURO

I. PARTICIPACIÓN

GRÁFICO # 5
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO
PARA PERSONAS CON VIH?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 32,8% de las personas entrevistadas afirma que asiste a algún grupo de apoyo para Personas con VIH (ver cuadro # 23 y gráfico # 5). El nivel de participación resulta más elevado para Costa Rica y alcanza la menor proporción en Panamá (ver cuadro # 24).

La participación tiende a aumentar entre los hombres que tienen sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver cuadro # 25), las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 26), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 27), las de mayor edad (ver cuadro # 28), las personas trans (ver cuadro # 29), las que no saben leer y escribir (ver cuadro # 30), las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 31), las que solo se dedican a las labores del hogar (ver cuadro # 32), las que laboran en ocupaciones no calificadas (ver cuadro # 33) y las que desarrollan servicio doméstico (ver cuadro # 34).

Un 53,6% asiste al grupo de autoayuda de su centro de salud y existe un 29,4% que participa en un grupo de una ONG y un 17,1% lo hace en un grupo independiente y espontáneo (ver cuadro # 35).


Por otra parte, casi la mitad de las personas entrevistadas (47,1%) afirman haber participado en el último año en algún tipo de actividad relacionada con el VIH (ver cuadro # 36).

Un 87,7% de las personas considera que puede contribuir en algo para detener la epidemia de VIH (ver cuadro # 37) y al solicitársele que indique de qué manera específica puede hacerlo, un 78,3% indica el uso del condón en todas sus relaciones sexuales, un 55,1% tomando sus medicamentos sin interrupción y un 50,2% cuidando su salud (ver cuadro # 38).

II. PERSPECTIVA DE FUTURO

La gran mayoría de las personas entrevistadas (81,3%) afirma que actualmente tiene planes definidos para su futuro (ver cuadro # 39) y un 90% tiene la opinión de que se puede hacer algo para cambiar positivamente el futuro (ver cuadro # 40), mientras que un 80% considera que en el futuro estará mejor que ahora (ver cuadro # 41).

GRÁFICO # 6
PRERSPECTIVA DE FUTURO



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Si se combinan estas tres preguntas en un indicador sobre perspectiva de futuro en una escala de 0 a 100, se obtiene un promedio de 84,5, lo cual implica que la mayoría de las personas entrevistadas tienden a tener una percepción bastante positiva sobre su futuro. Se observa también en este indicador una desviación estándar de 27,8 implicando que existe una variabilidad moderadamente baja, es decir, que la mayoría de las personas muestra una perspectiva parecida sobre su futuro (ver cuadro # 42).

Tal y como puede apreciarse en el cuadro 43 y en el gráfico # 6, el 73,4% de las personas entrevistadas muestran una perspectiva muy alta, mientras que solamente un 8,1% presentan un indicador muy bajo.

El nivel de optimismo hacia el futuro resulta superior para Honduras y más bajo para Belice (ver cuadro # 44).

La perspectiva de futuro resulta más positiva entre las personas que no han tenido relaciones sexuales con penetración (ver cuadro # 45), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 46), las que recibieron consejería en el momento del examen de VIH (ver cuadro # 47), las que cuidan más su salud desde su diagnóstico (ver cuadro # 48), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 49), las que están actualmente tomando medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 50), las que no han tenido efectos adversos por la terapia antirretroviral (ver cuadro # 51), las que perciben en forma extrema los medicamentos antirretrovirales, es decir, o muy mal o muy bien (ver cuadro # 52), las que no han sufrido maltrato en los servicios de salud (ver cuadro # 53) o las que en general han sido menos victimizadas (ver cuadro # 54), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 55), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 56), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 57), las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 58), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 59), las que viven con su pareja (ver cuadro # 60), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 61), las que laboran en actividades profesionales (ver cuadro # 62) y las que trabajan para el Estado (ver cuadro # 63). El resto de las variables no muestra diferencias significativas.

Si se analiza mediante regresión múltiple el peso relativo de las diferentes variables de control en la predicción de la perspectiva de futuro, se identifica un modelo relativamente limitado, con una correlación múltiple de 0,308 para un porcentaje explicado de la variabilidad de la perspectiva de futuro de apenas 9,5%. El modelo muestra diez variables predictoras: los conocimientos sobre VIH, la percepción de los medicamentos antirretrovirales, si sabe leer y escribir, si tiene pareja estable, si la entrevista se realizó en un servicio de salud, la percepción de su estado de salud, el nivel de actividad, si ha cambiado de residencia desde el diagnóstico, la frecuencia con que asiste al culto de su iglesia y la identidad de género masculina (ver cuadro # 64).

Cuadro # 23
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1274	32,8
No	2613	67,2
Total	3887	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 24
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	36,6	39,8	37,9	30,6	37,2	19,4	32,8
No	63,4	60,2	62,1	69,4	62,8	80,6	67,2
$\chi^2 = 72,865$ $\alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 25
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el seco con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	29,9	35,8	38,0	41,5	26,1	29,1
No	70,1	64,2	62,0	58,5	73,9	70,9
$\chi^2 = 15,975 \quad \alpha = ,003$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 26
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	de 1 a 5 meses	de 6 a 11 meses	de 1 a 2 años	de 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	10,6	21,4	17,2	26,5	31,1	33,5	43,0	32,8
No	89,4	78,6	82,8	73,5	68,9	66,5	57,0	67,2
$\chi^2 = 86,699 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 27
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	36,4	35,6	27,4	18,5	25,0	32,8
No	63,6	64,4	72,6	81,5	75,0	67,2
$\chi^2 = 38,717 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 28
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	26,7	29,2	35,8	35,1	38,4	32,7
No	73,3	70,8	64,2	64,9	61,6	67,3
$\chi^2 = 24,185 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 29
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	36,3	29,0	40,9	39,4	32,8
No	63,7	71,0	59,1	60,6	67,2
$\chi^2 = 24,520 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 30
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	32,1	38,0	32,8
No	67,9	62,0	67,2
$\chi^2 = 6,453 \quad \alpha = ,011$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 31
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	36,0	33,6	26,7	25,0	32,6
No	64,0	66,4	73,3	75,0	67,4
$\chi^2 = 26,314 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 32
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	Total
Sí	31,5	31,6	32,0	26,5	28,4	37,5	34,4	32,8
No	68,5	68,4	68,0	73,5	71,6	62,5	65,6	67,2
$\chi^2 = 12,980 \quad \alpha = ,043$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 33
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Directivo de las administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No calificadas	Total
Sí		18,2	33,3	30,3	33,2	29,1	18,1	35,0	31,5
No	100,0	81,8	66,7	69,7	66,8	70,9	81,9	65,0	68,5
$\chi^2 = 17,716 \quad \alpha = ,013$									

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 34
¿ASISTE A ALGÚN GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON VIH?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a más empleados	Total
Sí	35,3	37,8	25,0	39,8	34,4	25,0	27,8	31,2
No	64,7	62,2	75,0	60,2	65,6	75,0	72,2	68,8
$\chi^2 = 23,595 \quad \alpha = ,001$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 35
¿QUÉ TIPO DE GRUPO ES?

	Frecuencia	Porcentaje
Del centro de salud	671	53,6
De una ONG	368	29,4
De grupo independiente y espontáneo	214	17,1
Total	1253	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		21
No aplica		2619
Total		2640

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 36
¿EN EL ÚLTIMO AÑO HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES SOBRE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1818	47,1
No	2046	52,9
Total	3864	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		29

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 37
¿PUEDE CONTRIBUIR EN ALGO PARA DETENER LA EPIDEMIA DE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3252	87,7
No	457	12,3
Total	3709	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		184

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 38
¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR A CONTROLAR LA EPIDEMIA DE VIH?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Usando condón en todas mis relaciones sexuales	2535	78,3
Tomando mis medicamentos sin interrupción	1783	55,1
Cuidando mi salud	1627	50,2
Siendo fiel o teniendo una sola pareja	1172	36,2
Participando activamente en alguna ONG	756	23,3
No teniendo sexo	331	10,2
No hay nada que yo pueda hacer	11	,3
Otro	286	8,8
Total	3239	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		13
No aplica		641
Total		654

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 39
¿TIENE USTED PLANES DEFINIDOS PARA SU FUTURO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3090	81,3
No	709	18,7
Total	3799	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		94

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 40
¿PUEDE HACER ALGO PARA CAMBIAR POSITIVAMENTE SU FUTURO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3401	90,0
No	377	10,0
Total	3778	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		115

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 41
**¿EN EL FUTURO USTED ESTARÁ MEJOR,
 PEOR O IGUAL QUE AHORA?**

	Frecuencia	Porcentaje
Mejor	3098	80,0
Peor	109	2,8
Igual	410	10,6
No sabe	255	6,6
Total	3872	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		21

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 42
PERSPECTIVA DE FUTURO
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	,00	100,00	84,4537	27,75601

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 43
PERSPECTIVA DE FUTURO

	Frecuencia	Porcentaje
Muy baja	316	8,1
Media baja	259	6,6
Media alta	462	11,9
Muy alta	2857	73,4
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 44
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
Belice	131	64,6157	35,00620
Costa Rica	250	85,5445	27,12356
El Salvador	1263	81,9781	27,31482
Honduras	1328	89,4080	24,87328
Nicaragua	358	80,6310	32,19570
Panamá	562	84,8958	27,51136
Total	3893	84,4537	27,75601
F = 26,183 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 45
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI HA TENIDO RELACIONES SEXUALES
CON PENETRACIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Sí	3702	84,4208	27,73653
No	165	90,8797	19,54833
t = -4,062 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 46
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE
QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Menos de 1 mes	47	77,6674	32,21650
De 1 a 5 meses	159	84,0102	27,45267
De 6 a 11 meses	134	79,8790	32,29285
De 1 o 2 años	530	82,1283	29,56928
De 3 a 5 años	901	83,7870	28,63140
De 5 a 10 años	1231	85,7336	26,53747
Más de 10 años	871	86,7470	25,31756
Total	3873	84,6447	27,57557
F = 3,237 $\alpha = ,004$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 47
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE
REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Si, la recibí antes de la prueba	622	86,1537	27,72943
Si, al recibir el resultado de la prueba	1019	81,8640	29,13803
Si, antes y al recibir el resultado	1125	86,1460	26,18775
No recibí consejería	1058	84,8999	27,25293
Total	3824	84,6618	27,58760
F = 5,228 $\alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 48
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGUN CUÁNTO CUIDA SU SALUD
DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, tip,
Menos	80	81,8570	33,29228
Igual	730	71,6300	35,29892
Más	3037	87,7607	24,24829
Total	3847	84,5781	27,62301
F = 106,210 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 49
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv, tip,
Muy bueno	909	92,8565	18,45984
Bueno	1711	83,3424	27,96374
Estable	1111	81,2678	30,72333
Malo	131	72,6997	34,22993
Muy malo	12	70,8481	33,50572
Total	3873	84,5806	27,63098
F = 33,082 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 50
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI ACTUALMENTE ESTÁ
TOMANDO ANTIRRETROVIRALES

	N	Media	Desv, tip,
Sí	3477	85,1990	27,08533
No	412	78,6141	31,93444
Total	3889	84,5016	27,70877
F = 20,902 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 51
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI HA TENIDO EFECTOS ADVERSOS
POR LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

	N	Media	Desv, tip,
Sí	730	83,5665	28,40959
No	2717	85,7680	26,56756
Total	3447	85,3018	26,97890
F = 3,835 $\alpha = ,050$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 52
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO
ANTIRRETROVIRAL

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	29	89,7940	23,74807
Media baja	494	71,9428	36,49926
Media alta	556	79,6687	30,86093
Muy alta	2814	87,5404	24,43488
Total	3893	84,4537	27,75601
F = 52,965 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 53
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI HA SIDO VÍCTIMA DE
MALTRATO EN SERVICIOS DE SALUD

	N	Media	Desv, tip,
Sí	716	82,4936	29,85514
No	3153	85,1215	27,02269
Total	3869	84,6353	27,58355
F = 5,301 $\alpha = ,021$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 54
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN VICTIMIZACIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	2406	85,7229	26,42178
Media baja	1122	84,3566	27,72306
Media alta	329	77,4991	33,51376
Muy alta	36	66,2779	40,57881
Total	3893	84,4537	27,75601
F = 13,851 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 55
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, típ,
Sí	1812	87,1397	25,30712
No	2077	82,1156	29,55232
t = 5,711 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 56
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	N	Media	Desv, típ,
Sí	3406	85,5882	26,87775
No	461	76,4556	32,24665
t = 5,812 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 57
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	N	Media	Desv, típ,
No asistió a la escuela	27	78,9741	30,25332
Alfabetizada	72	73,2574	38,24794
Primaria incompleta	719	82,0603	28,94463
Primaria completa	694	85,2199	26,77537
Secundaria incompleta	701	86,6383	26,15160
Secundaria completa	738	86,3982	26,70217
Universitaria incompleta	286	90,3465	21,99814
Universitaria completa	151	92,7260	18,14271
Post grado universitario	12	91,4540	17,14186
Total	3399	85,5846	26,88954
F = 6,476 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 58
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE
AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip,
Al menos una vez por semana	1495	85,7215	26,56273
Una, dos o tres veces al mes	643	86,9079	25,39072
Menos de una vez por mes	494	83,0867	28,30308
Nunca	389	82,3729	29,98688
Total	3020	85,1122	27,10894
F = 3,442 $\alpha = ,016$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 59
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA
DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, tip,
Sí	720	82,4540	29,90386
No	3159	85,0046	27,13219
t = -2,101 $\alpha = ,036$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 60
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN ESTADO CIVIL

	N	Media	Desv, tip,
Soltero/a	1897	83,0142	28,64078
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	86,4482	26,17350
Separado/a o divorciado/a	147	84,3700	28,44031
Viudo/a	204	82,7423	29,46892
Total	3872	84,4916	27,71068
F = 4,782 $\alpha = ,002$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 61
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	N	Media	Desv, tip,
Solo trabaja	1612	85,5238	26,34108
Estudia y trabaja	116	91,6149	20,86551
Está desempleado	1026	81,8779	30,59698
Es pensionado o rentista	99	78,5304	32,87573
Solo estudia	103	86,9173	25,35196
Solo se dedica a tareas del hogar	850	84,9687	26,63099
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	89,5799	23,81801
Total	3871	84,5432	27,64727
F = 4,516 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 62
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	N	Media	Desv, tip,
Rentas	1	94,5332	40,96402
Directivo de la administración pública o de empresa privada	11	92,1394	12,31936
Profesional	111	95,3973	14,42856
Técnico medio	277	90,3461	22,64910
Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	622	84,4099	27,10765
Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	109	85,9293	23,20941
Calificadas de industrias, construcción y operación	149	83,0473	28,42972
No calificadas	429	83,2352	28,28528
Total	1710	85,8244	26,10721
F = 4,596 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 63
PERSPECTIVA DE FUTURO
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	N	Media	Desv, tip,
No remunerado	35	87,3496	25,26012
Empleado del Gobierno o Institución	172	89,3000	22,68659
Empleado de empresa privada	589	88,3250	24,74713
Servicio doméstico	117	80,4373	29,81529
Cuenta propia	647	84,4560	27,28798
Patrón con menos de 10 empleados	112	82,1352	25,08681
Patrón con 10 o más empleados	18	85,1362	29,03847
Total	1690	85,9296	26,09579
F = 2,953 $\alpha = ,007$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 64
ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA LA PERSPECTIVA DE FUTURO


	N
Correlación múltiple	0,308
Porcentaje de variabilidad predicha (R^2)	9,5
VARIABLES EN LA ECUACIÓN	
	Peso (β)
Conocimientos sobre VIH	0,195
Percepción de los medicamentos antirretrovirales	0,150
Sabe leer y escribir	0,066
Tienen una pareja estable	0,054
Lugar de entrevista	-0,058
Percepción de su estado de salud	0,050
Nivel de actividad	-0,034
Ha cambiado su residencia desde el diagnóstico	0,038
Frecuencia con que asisten al culto de su iglesia	-0,037
Identidad de género masculino	0,034

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

COMPORTAMIENTO SEXUAL

I. INICIO DE RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN

GRÁFICO # 7
¿HA TENIDO RELACIONES
SEXUALES CON PENETRACIÓN?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 95,7% de las personas entrevistadas ha tenido relaciones sexuales con penetración del pene en la vagina, ano o boca (ver cuadro # 65 y gráfico # 7).

No existen diferencias significativas según país para esta variable (ver cuadro # 66).

El inicio de relaciones es significativamente más frecuente entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 67), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 68), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 69), las personas testigos de Jehová (ver cuadro # 70), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 71), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 72) y las que trabajan como patronos con más de 10 empleados (ver cuadro # 73).

La edad de inicio de relaciones sexuales con penetración resulta muy variable entre las personas entrevistadas, pero sobresalen aquellas personas que inician entre los 15 y los 17, seguidas por aquellas que lo hicieron entre los 18 y los 25 (ver cuadro # 74).

Entre aquellas personas que afirmaron iniciar relaciones siendo menores de edad, un 68,7% tuvo ese inicio con personas mayores de edad (ver cuadro # 75).

Por otra parte, la mayor proporción de las personas inició sus relaciones con un novio o una novia, aunque también resulta bastante frecuente el comenzar con alguna persona amiga o conocida (ver cuadro # 76).

Cuadro #65
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3702	95,7
No	165	4,3
Total	3867	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		26

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #66
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	97,6	97,1	95,0	95,4	97,2	96,3	95,7
No	2,4	2,9	5,0	4,6	2,8	3,7	4,3
$\chi^2 = 6,582$ $\alpha = ,254$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #67
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN? SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Sí	97,0	94,8	97,1	95,7
No	3,0	5,2	2,9	4,3
$\chi^2 = 10,690$ $\alpha = ,005$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 68
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Si	No	Total
Sí	97,3	94,4	95,8
No	2,7	5,6	4,2
$\chi^2 = 21,179 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 69
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Si	No	Total
Sí	96,2	92,6	95,7
No	3,8	7,4	4,3
$\chi^2 = 12,654 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 70
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	97,4	94,5	98,3	93,2	96,2	94,1	95,0	95,8
No	2,6	5,5	1,7	6,8	3,8	5,9	5,0	4,2
$\chi^2 = 18,108 \quad \alpha = ,006$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 71
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	95,0	96,6	96,7	97,9	96,0
No	5,0	3,4	3,3	2,1	4,0
$\chi^2 = 8,612 \quad \alpha = ,035$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 72
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	Total
Sí	96,9	98,3	94,3	96,0	92,2	95,3	96,8	95,7
No	3,1	1,7	5,7	4,0	7,8	4,7	3,2	4,3
$\chi^2 = 15,919 \quad \alpha = ,014$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 73
¿HA TENIDO RELACIONES SEXUALES CON PENETRACIÓN?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o Institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 o más empleados	Total
Sí	87,9	98,2	96,1	96,6	97,7	98,2	100,0	97,0
No	12,1	1,8	3,9	3,4	2,3	1,8		3,0
$\chi^2 = 14,123 \quad \alpha = ,028$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #74
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN CON PENETRACIÓN

	Frecuencia	Porcentaje
10 años o menos	114	3,2
De 11 a 14	985	27,5
De 15 a 17	1439	40,2
De 18 a 25	1001	28,0
Más de 25	37	1,0
Total	3577	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		125
No ha tenido relaciones		191
Total		316

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #75
PAREJA EN PRIMERA RELACIÓN ¿ERA MAYOR DE EDAD?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1748	68,7
No	744	29,2
No recuerda	53	2,1
Total	2545	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		45
No aplica		1303
Total		1348

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #76
RELACIÓN CON PAREJA DE PRIMERA RELACIÓN

	Frecuencia	Porcentaje
Novio/a	1637	46,2
Amigo/a/ conocido/a	1106	31,2
Esposo o marido/ Esposa o mujer	294	8,3
Desconocido/a	212	6,0
Persona a la que le pagó	101	2,9
Familiar no cónyuge	88	2,5
Otro	104	2,9
Total	3543	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		159
No aplica		191
Total		350

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

II. ACTIVIDAD SEXUAL

La orientación sexual tiende a concentrarse en relaciones solo con parejas masculinas entre las personas con identidad de género femenino y entre los hombres y las mujeres trans, mientras que es muy variable entre las personas con identidad masculina (ver cuadro # 77).


Cuadro # 77
ACTIVIDAD SEXUAL

identidad de género	Femenino		Masculino		Mujer trans		Hombre trans	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Solo práctica sexo con hombres	1689	96,9	543	30,5	37	88,1	24	82,8
Práctica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	1,1	67	3,8	0	0,0	1	3,4
Práctica el sexo tanto con hombres como con mujeres	7	0,4	108	6,1	0	0,0	2	6,9
Práctica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	5	0,3	82	4,6	1	2,4	0	0,0
Solo práctica el sexo con mujeres	23	1,3	979	55,0	4	9,5	2	6,9
Total	1743	100,0	1779	100,0	42	100,0	29	100,0
Sujetos fuera del análisis								
No contesta		55		50		1		2
No aplica		93		95		2		1
Total		148		145		3		3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

EMBARAZO Y PLANIFICACIÓN

GRÁFICO # 8
¿HA ESTADO EMBARAZADA
DESPUÉS DE SABER SU
DIAGNÓSTICO?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Entre todas las mujeres entrevistadas, un 32,1% ha estado embarazada alguna vez después de conocer su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 78 y gráfico # 8).

Esta proporción de mujeres con al menos un embarazo resulta más alta para Honduras y más baja para Belice y El Salvador (ver cuadro # 79).

Por otra parte, la proporción aumenta entre las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 80), las que perciben su estado de salud como malo (ver cuadro # 81), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 82), las de menor edad (ver cuadro # 83), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 84), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 85), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 86), las que viven con su pareja o están separadas o divorciadas (ver cuadro # 87) y las que trabajan ocupaciones calificadas de industria, construcción y operación (ver cuadro # 88).


Llama la atención que la mayor proporción de las mujeres que han estado embarazadas después de su diagnóstico de VIH afirma que en ninguno de los casos o muy pocas veces su embarazo fue planificado, mientras que solo poco más de una quinta parte dice siempre haberlo hecho (ver cuadro # 89).

Un 84,8% de las mujeres que han estado al menos una vez embarazadas afirma haber recibido información sobre el riesgo de transmisión del VIH de madre a hijo (ver cuadro # 72). Sin embargo, 29,5% dice tener hijos o hijas con VIH (ver cuadro # 91). La tendencia a tener hijos con VIH resulta mayor entre las personas de Panamá y menor en Belice (ver cuadro # 92). Del mismo modo, la proporción aumenta entre las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 93), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 94), las de mayor edad (ver cuadro # 95), las personas mormonas (ver cuadro # 96), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 97), las viudas (ver cuadro # 98) y las que laboran en forma no remunerada (ver cuadro # 99).

Por otra parte, un 30,2% de las mujeres que han tenido al menos un embarazo desde su diagnóstico de VIH nunca se han realizado una citología, mientras que un 9,5% se ha practicado más de 2 (ver cuadro # 100).

GRÁFICO 9
USO DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

■ Sí usa ■ No usa



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Del total de mujeres entrevistadas, un 59% afirma utilizar algún método de planificación familiar (ver cuadro # 101 y gráfico # 9). La utilización es superior en el caso de Panamá e inferior para Honduras (ver cuadro # 102). Del mismo modo, la proporción de mujeres utilizando algún método aumenta entre las personas que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 103), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 104), las de menor edad (ver cuadro # 105), las que viven con su pareja (ver cuadro # 106) y las que solo estudian (ver cuadro # 107).

El principal método de planificación mencionado resultan ser los condones con un 62% de mención, seguido por la esterilización quirúrgica con 45,6% de mención (ver cuadro # 108).

Entre las mujeres que no utilizan ningún método la principal razón radica en que no lo necesitan por no tener relaciones sexuales o por estar operada (ver cuadro # 109).

Cuadro #78
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	589	32,1
No	1243	67,9
Total	1832	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		87
No aplica		1974
Total		2061

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #79
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	20,3	37,0	20,6	45,7	33,6	25,3	32,2
No	79,7	63,0	79,4	54,3	66,4	74,7	67,8
$\chi^2 = 108,457 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 80
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 o 2 años	De 3 a 5 años	De 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí		17,0	29,8	22,4	28,5	31,2	43,5	32,2
No	100,0	83,0	70,2	77,6	71,5	68,8	56,5	67,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 81
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	38,1	28,8	33,1	38,5	25,0	32,2
No	61,9	71,2	66,9	61,5	75,0	67,8
$\chi^2 = 12,449 \quad \alpha = ,014$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #82
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS
DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Si	39,2	24,9	32,1
No	60,8	75,1	67,9
$\chi^2 = 43,363 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 83
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	50,3	41,1	34,1	12,4	2,7	32,1
No	49,7	58,9	65,9	87,6	97,3	67,9
$\chi^2 = 146,792 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 84
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS
DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	33,7	24,7	32,2
No	66,3	75,3	67,8
$\chi^2 = 9,004 \quad \alpha = ,003$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 85
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	25,8	39,7	41,3	35,1	31,5
No	74,2	60,3	58,7	64,9	68,5
$\chi^2 = 31,989 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 86
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA
DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	41,2	30,3	32,2
No	58,8	69,7	67,8
$\chi^2 = 14,752 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #87
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañado/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	24,1	40,2	40,3	20,0	32,2
No	75,9	59,8	59,7	80,0	67,8
$\chi^2 = 59,975 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #88
¿EMBARAZADA ALGUNA VEZ DESPUÉS DE DIAGNÓSTICO POR VIH?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Directivo de la administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No Calificadas	Total
Sí		40,0	36,0	25,0		44,4	32,2	29,7
No	100,0	60,0	64,0	75,0	100,0	55,6	67,8	70,3
$\chi^2 = 59,975 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #89
¿PLANIFICÓ USTED ESE(ESOS) EMBARAZO(S)?

	Frecuencia	Porcentaje
Todas las veces	120	21,4
La mayoría de las veces	33	5,9
Pocas veces	64	11,4
Nunca	342	61,2
Total	558	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		31
No aplica		3304
Total		3335

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 90
¿INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO DE
TRANSMISIÓN DEL VIH DE MADRE A HIJO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	478	84,8
No	86	15,2
Total	563	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		25
No aplica		3304
Total		3330

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 91
TIENE HIJOS CON VIH

	Frecuencia	Porcentaje
No	415	70,5
Sí	174	29,5
Total	589	100,0
Personas fuera del análisis		
No tiene hijos desde diagnóstico		3304

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 92
TIENE HIJOS CON VIH
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
No	36,4	37,0	72,0	74,2	63,3	77,3	70,6
Sí	63,6	63,0	28,0	25,8	36,7	22,7	29,4
$\chi^2 = 25,173 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #93
TIENE HIJOS CON VIH
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
No	67,9	76,5	66,3	53,3	100,0	70,5
Sí	32,1	23,5	33,7	46,7		29,5
$\chi^2 = 11,300 \quad \alpha = ,023$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #94
TIENE HIJOS CON VIH
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
No	67,9	75,2	70,7
Sí	32,1	24,8	29,3
$\chi^2 = 3,629 \quad \alpha = ,057$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #95
TIENE HIJOS CON VIH
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
No	75,8	74,9	65,0	66,0		70,4
Sí	24,2	25,1	35,0	34,0	100,0	29,6
$\chi^2 = 11,750 \quad \alpha = ,019$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #96
TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
No	68,1	75,3	100,0	54,5		57,1	66,0	70,4
Sí	31,9	24,7		45,5	100,0	42,9	34,0	29,6
$\chi^2 = 13,529 \quad \alpha = ,035$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #97
TIENE HIJOS CON VIH
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
No	74,0	72,5	56,9	78,9	71,3
Sí	26,0	27,5	43,1	21,1	28,7
$\chi^2 = 9,224 \quad \alpha = ,026$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #98
TIENE HIJOS CON VIH SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a, acompañado/a o unión libre	Separado/a o Divorciado/a	Viudo/a	Total
No	74,0	67,6	90,3	64,3	70,5
Sí	26,0	32,4	9,7	35,7	29,5
$\chi^2 = 8,824 \quad \alpha = ,032$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #99
TIENE HIJOS QUE CON VIH SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 o mas empleados	Total
No		63,6	87,5	68,2	60,0	64,3	100,0	69,8
Sí	100,0	36,4	12,5	31,8	40,0	35,7		30,2
$\chi^2 = 15,786 \quad \alpha = ,015$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 100
¿CUÁNTAS CITOLOGÍAS SE HA REALIZADO
EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES?

	Frecuencia	Porcentaje
0	168	30,2
1	225	40,4
2	111	20,0
Más de 2	53	9,5
Total	556	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		33
No aplica		3304
Total		3337

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #101
¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1095	59,0
No	760	41,0
Total	1855	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		64
No aplica		1974
Total		2038

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #102
¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Si	66,7	60,9	66,7	48,7	80,1	50,6	59,0
No	33,3	39,1	33,3	51,3	19,9	49,4	41,0
$\chi^2 = 82,211 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #103
¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Si	55,9	63,9	55,6	47,5		59,1
No	44,1	36,1	44,4	52,5	100,0	40,9
$\chi^2 = 27,150 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #104
¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Si	No	Total
Sí	74,6	43,8	59,1
No	25,4	56,2	40,9
$\chi^2 = 181,523 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #105
¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Si	54,9	68,2	65,2	45,1	23,4	59,1
No	45,1	31,8	34,8	54,9	76,6	40,9
$\chi^2 = 102,452 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #106
¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañado/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Si	49,7	72,5	52,6	27,6	59,0
No	50,3	27,5	47,4	72,4	41,0
$\chi^2 = 153,976 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #107
¿UTILIZA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	Total
Si	59,7	63,0	47,9	29,0	70,4	64,6	58,6	58,9
No	40,3	37,0	52,1	71,0	29,6	35,4	41,4	41,1
$\chi^2 = 44,540 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #108
¿CUÁLES MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN UTILIZA?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Condomes o preservativos	677	62,0
Esterilización quirúrgica	499	45,6
Pastillas anticonceptivas	73	6,6
Métodos inyectables	67	6,1
Dispositivos intrauterinos	23	2,1
Métodos naturales	14	1,2
Otro	16	1,5
Total	1092	100,0

Personas fuera del análisis		
No contesta		3
No aplica		2798
Total		2801

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 109
¿POR QUÉ NO UTILIZA MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
No tiene relaciones o está operada	331	51,3
No lo considera necesario	198	30,6
No le gustan	45	7,0
Se quiere embarazar	28	4,4
No sabe dónde conseguirlos	21	3,2
Su pareja se lo prohíbe	23	3,6
Total	645	100,0

Personas fuera del análisis		
No contesta		115
No aplica		3133
Total		3248

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

Ante la pregunta sobre qué puede hacer una mujer para prevenir la transmisión del VIH a su bebé, la gran mayoría de las personas entrevistadas indican la importancia de ponerse en control médico. También se mencionan la utilización de medicamentos antirretrovirales, el no amamantar al bebé y la solicitud de practicar una cesárea (ver cuadro # 110).

En otro orden de cosas, un 71,3% de las personas entrevistadas reconoce que una persona con VIH puede re infectarse (ver cuadro # 111).


Por otra parte, el 93,3% considera que el uso del condón puede prevenir la reinfección (ver cuadro # 112), mientras que un 82,2% considera que siendo fiel se puede prevenir (ver cuadro # 113).

Sin embargo, existe un 27,1% que considera que no tiene ningún riesgo de re infectarse, mientras que un 34,3% considera que el mismo es bajo, un 14,1% medio y un 20,3% alto (ver cuadro # 114).

Entre las opciones para prevenir la reinfección, un 86,9% menciona el uso del condón en todas las relaciones sexuales (ver cuadro # 115).



**NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN TIEMPO DE HABER RECIBIDO DIAGNÓSTICO DE VIH**



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Si se combinan todas estas preguntas en un solo indicador sobre conocimientos, se obtiene un promedio de 68,1% de respuestas correctas, con una desviación estándar de 21,3, mostrando relativamente poca variabilidad en el nivel de conocimientos de una persona a otra (ver cuadro # 116). Los conocimientos son moderadamente altos, con solo un 1,6% con un nivel muy bajo, un 21,9% medio bajo, 35,9% medio alto y un 40,5% muy alto (ver cuadro # 117).

Los conocimientos son mejores para Costa Rica, mientras que resultan más bajos para Belice (ver cuadro # 118). Del mismo modo, los conocimientos aumentan entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 119), los hombres que tienen sexo solo con hombres (ver cuadro # 120), las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 121), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 122), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 123), las que tienen entre 36 y 45 años (ver cuadro # 124), las mujeres trans (ver cuadro # 125), las personas que saben leer y escribir (ver cuadro # 126), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 127), las mormonas (ver cuadro # 128), las que asisten al culto de su iglesia varias veces al mes (ver cuadro # 129), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 130), las que viven con su pareja (ver cuadro # 131), las que ocupan puestos de dirección (ver cuadro # 132) y las y los empleados públicos (ver cuadro # 133).

Si se analiza la estructura predictiva del nivel de conocimientos mediante una regresión múltiple, es posible identificar una correlación múltiple de 0,371, para una proporción de variabilidad predicha del 13,8%. Se identifican 11 variables significativamente asociadas al nivel de conocimientos: perspectiva de futuro, tiempo desde que recibió su diagnóstico de VIH, nivel educativo, la identidad de género masculina, si tiene pareja estable, la percepción de los medicamentos antirretrovirales, si sabe leer y escribir, si recibió consejería al momento del examen de VIH, nivel de actividad, lugar de entrevista, si actualmente está tomando medicamentos antirretrovirales y si ha cambiado de residencia desde su diagnóstico (ver cuadro # 134).

Cuadro # 110

**¿QUE PUEDE HACER UNA MUJER PARA PREVENIR
TRANSMISIÓN DEL VIH A SU BEBÉ?
(respuesta múltiple)**

	Frecuencia	Porcentaje
Ponerse en control médico	2823	73,2
Tomar medicamentos antirretrovirales	2367	61,3
No amamantar al bebé	2202	57,1
Pedir que le hagan cesárea	1905	49,4
Otra	76	2,0
No sabe	518	13,4
Total	3859	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		34

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 111

**¿CREE USTED QUE UNA PERSONA
CON VIH PUEDA REINFECTARSE?
(respuesta múltiple)**

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2767	71,3
No	454	11,7
No sabe	662	17,1
Total	3883	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		10

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 112

**¿CREE QUE USANDO CONDÓN SE PUEDE
PREVENIR LA REINFECCIÓN DEL VIH?**

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2579	93,3
No	120	4,3
No sabe	65	2,3
Total	2764	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		3
No aplica		1126
Total		1129

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #113
¿CREE QUE SIENDO FIEL SE PUEDE PREVENIR LA REINFECCIÓN DEL VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2264	82,2
No	388	14,1
No sabe	101	3,7
Total	2753	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		14
Sistema		1126
Total		1140

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #114
¿SU RIESGO DE REINFECTARSE POR VIH ES...?

	Frecuencia	Porcentaje
Alto	559	20,3
Medio	390	14,1
Bajo	944	34,3
Ninguno	748	27,1
No sabe	113	4,1
Total	2754	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		14
No aplica		1126
Total		1139

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #115
¿QUÉ PUEDEN HACERSE PARA PREVENIR LA REINFECCIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Usar condón en toda relación sexual	2324	86,9
No tener relaciones sexuales	261	9,7
No puede hacer nada	25	,9
Otra	30	1,1
No sabe	34	1,3
Total	2674	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		94
No aplica		1126
Total		1219

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 116
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	10,00	100,00	68,0618	21,29220

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 117
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	64	1,6
Medio bajo	854	21,9
Medio alto	1397	35,9
Muy alto	1578	40,5
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 118
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, típ,
Belice	131	58,9184	20,08334
Costa Rica	250	76,5086	20,55383
El Salvador	1263	60,5492	18,02009
Honduras	1328	74,9893	21,32207
Nicaragua	358	69,3929	21,05208
Panamá	562	66,0973	21,87322
Total	3893	68,0618	21,29220
F = 81,083 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #119
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	N	Media	Desv, típ,
Servicio de Salud	1595	66,9006	20,75484
Visita domiciliar	2226	69,2151	21,60789
t = -3,319 α = ,001			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #120
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	N	Media	Desv, típ,
Solo practica el sexo con hombres	543	70,6296	20,75357
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	67	69,7024	23,26019
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	108	65,4977	20,41465
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	82	64,0690	18,48516
Solo practica el sexo con mujeres	979	63,8986	20,65283
Total	1779	66,2764	20,88743
F = 9,984 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #121
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, típ,
Menos de 1 mes	47	51,3805	23,54544
De 1 a 5 meses	159	58,7025	20,61974
De 6 a 11 meses	134	59,9110	20,38975
De 1 o 2 años	530	63,3138	21,44781
De 3 a 5 años	901	67,6750	21,04843
De 5 a 10 años	1231	69,5973	20,57257
Más de 10 años	871	73,3759	20,57557
Total	3873	68,1379	21,28575
F = 28,952 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #122
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv, típ,
Muy bueno	909	72,5543	20,68092
Bueno	1711	67,0086	20,98756
Estable	1111	66,8989	21,64210
Malo	131	63,6333	21,55976
Muy malo	12	62,7659	21,29945
Total	3873	68,1507	21,26581
F = 13,785 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #123
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, típ,
Sí	1812	70,3467	20,85759
No	2077	66,0535	21,46689
t = 6,304 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #124
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, típ,
25 o menos	435	64,8176	22,12692
De 26 a 35	1174	68,5823	21,42957
De 36 a 45	1271	69,8325	20,40119
De 46 a 60	841	67,0502	21,91528
Más de 60	164	65,2097	19,70788
Total	3884	68,0964	21,27227
F = 6,145 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #125
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv, típ,
Femenino	1891	69,8358	21,62671
Masculino	1925	66,2319	20,89338
Mujer trans	44	71,3143	19,49388
Hombre trans	33	68,7770	18,86772
Total	3893	68,0618	21,29220
F = 9,531 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #126
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN SI SABE LEER YESCRIBIR

	N	Media	Desv, típ,
Sí	3406	69,2592	21,12039
No	461	59,4472	20,71609
t = 9,380 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #127
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	N	Media	Desv, típ,
No asistió a la escuela	27	67,5444	19,01096
Alfabetizada	72	64,8187	21,42498
Primaria incompleta	719	65,7205	21,46112
Primaria completa	694	69,8184	21,37139
Secundaria incompleta	701	68,8048	20,88672
Secundaria completa	738	70,3604	21,28640
Universitaria incompleta	286	73,8298	19,52117
Universitaria completa	151	73,8411	18,70402
Post grado universitario	12	73,2580	20,84265
Total	3399	69,2652	21,11513
F = 5,981 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #128
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN RELIGIÓN

	N	Media	Desv, típ,
Católica	1519	69,1435	21,46267
Cristiana Evangélica	1343	68,9905	20,81767
Testigo de Jehová	60	65,5503	23,44956
Adventista	59	66,8622	20,39874
Mormón/a	25	74,8259	19,71020
Otra	52	71,1233	18,44388
Ninguna	817	64,7244	21,47880
Total	3874	68,1324	21,28214
F = 5,230 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #129
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, típ,
Al menos una vez por semana	1495	68,9890	20,15997
Una, dos o tres veces al mes	643	70,3217	21,50285
Menos de una vez por mes	494	69,8538	22,09802
Nunca	389	66,0249	22,72233
Total	3020	69,0326	21,14294
F = 3,678 α = ,012			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #130
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, típ,
Sí	720	69,9619	21,02229
No	3159	67,6459	21,32192
t = 2,638 α = ,008			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



**Cuadro #131
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN ESTADO CIVIL**

	N	Media	Desv, típ,
Soltero/a	1897	66,2561	21,37044
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	70,3014	20,89786
Separado/a o divorciado/a	147	69,0835	20,29499
Viudo/a	204	67,2545	22,21924
Total	3872	68,1124	21,26002
F = 10,855 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #132
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL**

	N	Media	Desv, típ,
Rentas	1	53,8605	85,95038
Directivo de la administración pública o de empresas privadas	11	71,1468	16,89598
Profesional	111	73,2826	19,14567
Técnico medio	277	68,6116	19,58360
Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	622	67,8866	20,62969
Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	109	60,9081	19,09127
Calificadas de industrias, construcción y operación	149	68,4949	21,58118
No calificadas	429	65,0679	20,44105
Total	1710	67,2663	20,42430
F = 4,099 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #133
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH
SEGÚN RELACIÓN LABORAL**

	N	Media	Desv, típ,
No remunerado	35	67,0498	17,18794
Empleado del Gobierno o Institución	172	71,3434	20,24418
Empleado de empresa privada	589	68,3850	20,25892
Servicio doméstico	117	66,9830	20,58075
Cuenta propia	647	66,5101	20,28717
Patrono con menos de 10 empleados	112	63,0883	21,48227
Patrono con 10 o más empleados	18	66,1718	24,41331
Total	1690	67,4684	20,41209
F = 2,369 $\alpha = ,028$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #134
ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N
Correlación múltiple	0,371
Porcentaje de variabilidad predicha (R ²)	13,8%
VARIABLES EN LA ECUACIÓN	
Perspectiva de futuro	0,179
Tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH	0,177
Nivel educativo	0,139
Identidad de género masculino	-0,071
Tiene pareja estable	0,067
Percepción de los medicamentos antirretrovirales	0,060
Sabe leer y escribir	0,063
Recibió consejería al momento del examen de VIH	0,053
Nivel de actividad	0,050
Lugar de entrevista	0,043
Actualmente está tomando medicamentos antirretrovirales	0,044
Ha cambiado de residencia desde diagnóstico	0,034

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

ACCESO A CONDONES Y LUBRICANTES

I. CONDONES

Al solicitar a las personas entrevistadas que indiquen dónde pueden conseguir condones, la gran mayoría (89,9%) menciona los centros de salud, mientras que un 59,4% se refiere a las farmacias, un 32,4% a supermercados o tiendas y un 29,7% a organizaciones no gubernamentales (ver cuadro # 135).


Para la gran mayoría de las personas resulta fácil (70,5%) o muy fácil (24,3%) conseguir condones, mientras que del total de la muestra solamente un 0,9% considera que es muy difícil (ver cuadro # 136). Para las personas que les resulta fácil, casi todas justifica su apreciación en el hecho de que se los regalan (ver cuadro # 137), mientras que para las que les es difícil, es sobre todo porque les da pena comprarlos (ver cuadro # 138).

Un 40,4% indica que no recibió ningún condón regalado la semana anterior a la entrevista. Para las personas que sí recibieron, la mayor parte obtuvo de una y cuatro docenas (ver cuadro # 139).

Al analizar en general el nivel de acceso al condón combinando todas las preguntas anteriores, se evidencia un nivel de acceso bajo con un promedio de apenas 41,5 en una escala de 0 a 100, pero con una desviación estándar que sugiere algunas diferencias importantes entre las personas entrevistadas (ver cuadro # 140). La mayor parte de las personas muestran un puntaje medio bajo, entre 25 y 50 (ver cuadro # 141).

El acceso al condón resulta más alto para Nicaragua y más bajo para El Salvador (ver cuadro # 142). También aumenta el acceso entre los hombres que tienen sexo solo con hombres (ver cuadro # 143), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 144), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 145), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 146), las que tienen mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 147), las de menor edad (ver cuadro # 148), los hombres trans (ver cuadro # 149), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 150), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 151), las mormonas (ver cuadro # 152), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 153), las que viven con su pareja (ver cuadro # 154), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 155), las que viven de las rentas y las que ocupan puestos de dirección (ver cuadro # 156) y las que trabajan sin remuneración (ver cuadro # 157).

GRÁFICO # 11
ACCESO AL CONDÓN SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Al analizar el modelo explicativo del acceso al condón mediante una regresión múltiple, se evidencia una correlación múltiple de 0,408 para una variabilidad explicada de 16,6%. Las variables que ingresan en la ecuación como significativamente asociadas al acceso son en orden de importancia: los conocimientos sobre VIH, el nivel educativo, la identidad de género femenina, si tiene pareja estable, el tiempo desde que recibió su diagnóstico de VIH, la perspectiva de futuro, la edad, la identidad de género masculina, la percepción de su estado de salud, la frecuencia con que asiste al culto de su iglesia, el nivel de actividad, si recibió consejería al momento del examen de VIH, si actualmente está tomando medicamentos antirretrovirales y la percepción de los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 158).

Cuadro #135
LUGARES QUE CONOCE EN DONDE PUEDE
CONSEGUIR CONDONES
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Centro de salud/hospital	3455	89,9
Farmacia	2285	59,4
Supermercado/tienda	1245	32,4
Ong	1140	29,7
Casa de citas/motel	260	6,8
Night club/bar/disco	189	4,9
Otro	154	4,0
Total	3843	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		50

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #136
¿PARA USTED CONSEGUIR UN CONDÓN ES...?

	Frecuencia	Porcentaje
Muy fácil	910	24,3
Fácil	2643	70,5
Difícil	162	4,3
Muy difícil	35	,9
Total	3750	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		143

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #137
¿POR QUÉ LE ES FÁCIL CONSEGUIR CONDONES?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Me los regalan	3123	88,3
Son baratos	1092	30,9
No me da pena	926	26,2
Está cerca el lugar donde compro	758	21,4
Otro	48	1,4
Total	3526	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		27
No aplica		340
Total		367

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #138
¿POR QUÉ LE ES DIFÍCIL CONSEGUIR CONDONES?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Me da pena comprar	114	60,7
No tengo dinero para comprar	37	19,6
Cuando voy a buscar nunca hay	33	17,4
Son muy caros	24	12,7
No sé dónde conseguirlos	16	8,6
Otro	35	18,5
Total	187	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		9
No aplica		3696
Total		3706

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #139
CANTIDAD DE CONDONES RECIBIDOS GRATIS

	Frecuencia	Porcentaje
Ninguno	1575	40,4
12 o menos	940	24,1
De 13 a 24	547	14,0
De 25 a 64	616	15,8
De 65 a 99	28	,7
Más de 100	187	4,8
91,00	0	,0
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #140
ACCESO AL CONDÓN
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	,00	94,90	41,4697	12,84475

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #141
ACCESO A CONDONES**

	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	267	6,9
Medio bajo	2792	71,7
Medio alto	785	20,2
Muy alto	50	1,3
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #142
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	N	Media	Desv, tip,
Belice	131	39,6346	10,10560
Costa Rica	250	40,6989	13,09178
El Salvador	1263	37,1200	12,33017
Honduras	1328	43,9501	12,39812
Nicaragua	358	46,6346	14,01574
Panamá	562	42,8607	11,69788
Total	3893	41,4697	12,84475
F = 56,206 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #143
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS**

	N	Media	Desv, tip,
Solo practica el sexo con hombres	543	46,3257	12,88723
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	67	44,8297	13,92600
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	108	41,0487	12,98918
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	82	44,8159	10,56396
Solo practica el sexo con mujeres	979	41,4315	12,41029
Total	1779	43,1857	12,76694
F = 14,634 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #144
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE
QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Menos de 1 mes	47	37,5145	12,90559
De 1 a 5 meses	159	38,7566	12,74119
De 6 a 11 meses	134	40,4521	12,24277
De 1 o 2 años	530	39,8429	12,74822
De 3 a 5 años	901	41,9512	12,64847
De 5 a 10 años	1231	40,7795	12,45033
Más de 10 años	871	43,9694	13,35269
Total	3873	41,5080	12,84308
F = 9,915 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #145
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv, tip,
Muy bueno	909	45,1991	13,37423
Bueno	1711	41,1108	12,29669
Estable	1111	39,6053	12,76935
Malo	131	37,5326	11,02453
Muy malo	12	35,1079	14,49921
Total	3873	41,4983	12,84810
F = 30,001 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #146
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, tip,
Sí	1812	43,1259	12,55635
No	2077	40,0384	12,92932
t = 7,529 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #147
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	64	32,2870	11,13099
Medio bajo	854	37,7436	12,99747
Medio alto	1397	39,7784	11,54727
Muy alto	1578	45,3549	12,81554
Total	3893	41,4697	12,84475
F = 97,824 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #148
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
25 o menos	435	41,2258	13,29625
De 26 a 35	1174	42,9507	13,20661
De 36 a 45	1271	42,1179	12,42379
De 46 a 60	841	40,0342	12,42960
Más de 60	164	34,4689	11,11780
Total	3884	41,4964	12,83827
F = 19,930 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #149
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv, tip,
Femenino	1891	39,5589	12,46273
Masculino	1925	43,0167	12,79567
Mujer trans	44	44,3598	14,20346
Hombre trans	33	56,7874	12,76074
Total	3893	41,4697	12,84475
F = 40,984 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #150
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	N	Media	Desv, tip,
Sí	3406	42,1966	12,75296
No	461	36,3681	12,34101
t = 9,242 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #151
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	N	Media	Desv, tip,
No asistió a la escuela	27	41,6767	13,27115
Alfabetizada	72	38,3490	11,57072
Primaria incompleta	719	38,9439	12,92154
Primaria completa	694	41,6991	11,71797
Secundaria incompleta	701	43,1736	13,25946
Secundaria completa	738	43,4565	12,60187
Universitaria incompleta	286	45,2380	12,56450
Universitaria completa	151	44,3371	11,71025
Post grado universitario	12	55,0507	13,74333
Total	3399	42,1925	12,75327
F = 12,599 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #152
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN RELIGIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Católica	1519	41,5722	12,40369
Cristiana Evangélica	1343	40,6535	12,75528
Testigo de Jehová	60	42,9488	14,31673
Adventista	59	39,6012	13,12824
Mormón/a	25	46,1334	12,52469
Otra	52	44,2500	12,41852
Ninguna	817	42,4223	13,59350
Total	3874	41,4899	12,84617
F = 2,975 $\alpha = ,007$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #153
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE
AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip,
Al menos una vez por semana	1495	40,0391	12,74559
Una, dos o tres veces al mes	643	42,2733	12,15073
Menos de una vez por mes	494	42,9331	12,39845
Nunca	389	42,0642	13,05018
Total	3020	41,2485	12,65789
F = 9,486 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #154
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN ESTADO CIVIL

	N	Media	Desv, tip,
Soltero/a	1897	41,5590	13,04884
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	42,5194	12,50321
Separado/a o divorciado/a	147	38,4903	11,94536
Viudo/a	204	34,4434	11,53550
Total	3872	41,4714	12,83386
F = 27,163 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #155
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	N	Media	Desv, tip,
Solo trabaja	1612	42,7214	12,92237
Estudia y trabaja	116	46,6731	12,26616
Está desempleado	1026	41,5524	12,20140
Es pensionado o rentista	99	39,9318	14,10033
Solo estudia	103	41,0796	11,42239
Solo se dedica a tareas del hogar	850	38,8068	12,54557
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	37,6894	18,04576
Total	3871	41,4720	12,84889
F = 13,246 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #156
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	N	Frecuencia	Porcentaje
Rentas	1	49,5103	133,66090
Directivo de la administración pública o de empresas privadas	11	49,0097	11,34038
Profesional	111	47,4868	16,35781
Técnico medio	277	44,3960	12,32980
Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	622	42,9997	13,03316
Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	109	39,7948	12,91144
Calificadas de industrias, construcción y operación	149	42,4516	11,58386
No calificadas	429	41,3470	12,09036
Total	1710	42,8928	12,91160
F = 4,820 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #157
ACCESO AL CONDÓN
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	N	Media	Desv. tip.
No remunerado	35	48,3557	10,26519
Empleado del Gobierno o Institución	172	45,2750	12,74793
Empleado de empresa privada	589	43,6868	12,63536
Servicio doméstico	117	38,1562	12,83003
Cuenta propia	647	42,4383	13,00316
Patrono con menos de 10 empleados	112	41,0728	11,95893
Patrono con 10 o más empleados	18	42,5022	16,67783
Total	1690	42,8953	12,86815
F = 5,651 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 158
ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL NIVEL DE ACCESO AL CONDÓN

	N
Correlación múltiple	0,408
Porcentaje de variabilidad predicha (R ²)	16,6%
VARIABLES EN LA ECUACIÓN	
Conocimientos sobre VIH	Peso (β) 0,204
Nivel educativo	0,134
Identidad de género femenino	-0,344
Tiene pareja estable	0,083
Tiempo desde que recibió diagnóstico de VIH	0,124
Perspectiva de futuro	0,078
Edad	-0,070
Identidad de género masculino	-0,222
Percepción de su estado de salud	0,063
Frecuencia con que asiste al culto de su iglesia	0,056
Nivel de actividad	0,044
Recibió consejería al momento del examen de VIH	0,047
Actualmente está tomando medicamentos antirretrovirales	0,043
Percepción de los medicamentos antirretrovirales	0,039

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

II .ACCESO A LUBRICANTE


En lo que respecta a los lubricantes, un 76,3% menciona las farmacias como el lugar donde conseguir lubricantes. También se menciona con un 30,6% los centros de salud, con un 23% los supermercados y las ONG con un 20,2% (ver cuadro # 159).

Por otra parte, la mayoría considera que le es algo o muy fácil conseguir lubricantes, pero hay un 27,7% que afirma que les es difícil y un 17,9% muy difícil (ver cuadro # 160).

Solo un 28,1% dice no acostumbrar la utilización de lubricante en sus relaciones sexuales (ver cuadro # 161). Mientras que entre los que sí lo usan, la gran mayoría accede a lubricantes a base de agua (ver cuadro # 162) y un 58,7% dice disponer de lubricantes en el momento de la entrevista (ver cuadro # 163).

Por último, a la mayoría de las personas entrevistadas no le brindan lubricantes cuando le dan condones (ver cuadro # 164).

GRÁFICO # 12
ACCESO A LUBRICANTE



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

El análisis del indicador de acceso a lubricantes combinando todas las preguntas correspondientes muestra un promedio muy bajo de apenas 34,5 en una escala de 0 a 100 y con un nivel de variabilidad moderado (ver cuadro # 165). Un 40,5% de las personas muestra un puntaje muy bajo con un valor entre 0 y 25, mientras que solo un 5% muestra un acceso muy alto (ver cuadro # 166). De hecho, muchas personas no lo conocen y no saben cuál es su utilidad.

El acceso a lubricantes es más alto en Nicaragua y más bajo en El Salvador (ver cuadro # 167). Del mismo modo, resulta significativamente superior entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 168), las mujeres que tienen sexo tanto con hombres como con mujeres (ver cuadro # 169) y entre los hombres que solo tienen sexo con hombres (ver cuadro # 170), entre las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 171), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 172), las que están actualmente tomando medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 173), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 174), las que tiene mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 175), las que tienen mayor acceso a condones (ver cuadro # 176), las de menor edad (ver cuadro # 177), los hombres trans (ver cuadro # 178), las personas que saben leer y escribir (ver cuadro # 179), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 180), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 182), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 183), las que viven con su pareja (ver cuadro # 184), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 185), las que ocupan puestos de dirección (ver cuadro # 186) y las que son patronos con más de 10 empleados (ver cuadro # 187).

El análisis de regresión múltiple para el indicador de acceso a lubricante muestra un modelo con una correlación múltiple de 0,383 para apenas un 14,7% de variabilidad explicada. Las variables que entran en la ecuación como predictoras son: acceso a condón, el nivel educativo, la identidad de género masculina, la identidad de género femenina, si sabe leer y escribir, el nivel de actividad, la adherencia, los conocimientos sobre VIH, lugar de entrevista, la frecuencia con que asiste al culto de su iglesia, si ha tenido problemas de salud en los últimos tres meses y la edad (ver cuadro # 188).

Cuadro # 159
LUGARES QUE CONOCE EN DONDE PUEDE CONSEGUIR LUBRICANTE
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Farmacia	2189	76,3
Centro de salud/hospital	876	30,6
Supermercado/tienda	660	23,0
Ong	579	20,2
Night club/bar/disco	67	2,3
Casa de citas/motel	62	2,2
Otro	206	7,2
Total	2868	100,0
Personas fuera del análisis		
No Sabe		1025

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 160
¿PARA USTED CONSEGUIR LUBRICANTE ES?

	Frecuencia	Porcentaje
Muy fácil	274	9,2
Fácil	1347	45,2
Difícil	824	27,7
Muy difícil	532	17,9
Total	2977	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		916

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #161
¿ACOSTUMBRA UTILIZAR LUBRICANTE EN RELACIONES SEXUALES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	983	28,1
No	2512	71,9
Total	3495	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		398

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #162
¿QUÉ TIPO DE LUBRICANTES USA?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Lubricante a base de agua	870	89,3
Saliva	159	16,4
Vaselina	80	8,2
Cremas para la piel o de mano	69	7,1
Gel vaginal	45	4,6
Aceite de bebé	33	3,4
Mantequilla	1	,2
Aceite de cocinar	5	,5
Otro	4	,4
Total	974	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		10
No aplica		2910
Total		2919

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #163
¿DISPONE EN ESTE MOMENTO DE LUBRICANTES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	571	58,7
No	401	41,3
Total	972	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		12
No aplica		2910
Total		2921

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #164
CUANDO LE BRINDAN CONDONES, ¿LE BRINDAN TAMBIÉN LUBRICANTES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	529	15,1
No	2968	84,9
Total	3497	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		396

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #165
ACCESO A LUBRICANTE
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	,00	96,43	34,4782	17,46636

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #166
ACCESO A LUBRICANTES

	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	1577	40,5
Medio bajo	1689	43,4
Medio alto	432	11,1
Muy alto	195	5,0
Total	3893	100,0

Personas fuera del análisis

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #167
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, típ.
Belice	131	46,8357	19,50472
Costa Rica	250	42,7310	17,83460
El Salvador	1263	27,3105	13,32964
Honduras	1328	31,0016	12,03069
Nicaragua	358	47,6645	20,49434
Panamá	562	43,8261	21,63505
Total	3893	34,4782	17,46636
F = 186,214 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #168
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	N	Media	Desv. tip.
Servicio de Salud	1595	36,7730	19,03303
Visita domiciliar	2226	32,3344	15,65107
t = 7,643 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #169
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	N	Media	Desv. tip.
Solo practica el sexo con hombres	1689	31,0533	15,14601
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	38,0953	20,26707
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	7	52,0718	17,25125
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	5	51,9197	23,11037
Solo practica el sexo con mujeres	23	40,6871	17,17257
Total	1743	31,4100	15,40973
F = 9,097 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #170
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	N	Media	Desv. tip.
Solo practica el sexo con hombres	543	43,4009	21,74543
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	67	41,9208	19,58326
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	108	38,7171	18,91851
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	82	38,1539	17,76660
Solo practica el sexo con mujeres	979	31,9594	14,91846
Total	1779	36,5211	18,55028
F = 38,417 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #171
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv. tip.
Menos de 1 mes	47	30,4974	13,08124
De 1 a 5 meses	159	33,1235	16,69836
De 6 a 11 meses	134	34,9463	17,14405
De 1 o 2 años	530	37,4315	19,49134
De 3 a 5 años	901	35,9267	17,93369
De 5 a 10 años	1231	32,2910	16,16787
Más de 10 años	871	34,4996	17,39622
Total	3873	34,4413	17,45503
F = 7,434 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #172
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv. tip.
Muy bueno	909	38,6578	18,68722
Bueno	1711	33,1614	17,52425
Estable	1111	33,5692	16,33352
Malo	131	29,7228	11,46984
Muy malo	12	33,9492	13,82498
Total	3873	34,4540	17,45700
F = 18,979 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #173
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN SI ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES

	N	Media	Desv. tip.
Sí	3477	33,9993	17,20308
No	412	38,5358	19,12657
Total	3889	34,4797	17,47007
F = 24,982 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #174
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv. tip.
Sí	1812	35,3381	17,92466
No	2077	33,7384	17,03945
t = 2,841 $\alpha = ,005$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #175
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N	Media	Desv. tip.
Muy bajo	64	32,0419	16,04376
Medio bajo	854	32,4695	15,75425
Medio alto	1397	32,9146	16,54942
Muy alto	1578	37,0480	18,83428
Total	3893	34,4782	17,46636
F = 19,575 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #176
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN ACCESO A CONDONES

	N	Media	Desv. tip.
Muy bajo	267	28,2372	10,71263
Medio bajo	2792	32,6532	15,62751
Medio alto	785	42,3646	21,80313
Muy alto	50	46,0534	23,84065
Total	3893	34,4782	17,46636
F = 87,576 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #177
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv. tip.
25 o menos	435	37,0189	19,29607
De 26 a 35	1174	36,9111	18,35818
De 36 a 45	1271	33,0662	16,96983
De 46 a 60	841	32,9180	16,17993
Más de 60	164	29,8979	12,51049
Total	3884	34,5052	17,47347
F = 14,753 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #178
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv. tip.
Femenino	1891	31,6776	15,50253
Masculino	1925	36,6007	18,41630
Mujer trans	44	45,0802	22,35617
Hombre trans	33	56,8914	20,87114
Total	3893	34,4782	17,46636
F = 51,241 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #179
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	N	Media	Desv. tip.
Sí	3406	35,1548	17,77508
No	461	29,4563	14,17325
t = 7,836 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



**Cuadro #180
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS**

	N	Media	Desv. tip.
No asistió a la escuela	27	39,6031	14,85851
Alfabetizada	72	27,1258	13,94050
Primaria incompleta	719	28,8586	14,37969
Primaria completa	694	32,6186	15,52821
Secundaria incompleta	701	36,0057	18,13510
Secundaria completa	738	37,7311	17,71977
Universitaria incompleta	286	43,2454	20,49539
Universitaria completa	151	46,6503	20,79161
Post grado universitario	12	53,3578	25,63264
Total	3399	35,1614	17,78097
F = 36,915 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #181
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN RELIGIÓN**

	N	Media	Desv. tip.
Católica	1519	37,2544	18,47576
Cristiana Evangélica	1343	32,3103	15,61985
Testigo de Jehová	60	36,9271	14,43940
Adventista	59	34,8799	17,42171
Mormón/a	25	30,1408	18,84892
Otra	52	40,6375	18,48526
Ninguna	817	32,3510	17,74259
Total	3874	34,4646	17,47440
F = 13,646 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #182
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip.
Al menos una vez por semana	1495	31,9355	16,21178
Una, dos o tres veces al mes	643	36,3208	16,53276
Menos de una vez por mes	494	37,9583	18,21691
Nunca	389	40,8413	19,45035
Total	3020	35,0000	17,37071
F = 37,480 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #183
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA
DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, tip.
Sí	720	36,0075	17,78832
No	3159	34,1043	17,36314
t = 2,643 $\alpha = ,008$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #184
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN ESTADO CIVIL

	N	Media	Desv, tip.
Soltero/a	1897	34,4982	17,90918
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	34,9357	17,58034
Separado/a o divorciado/a	147	33,2157	15,54747
Viudo/a	204	30,7832	11,72105
Total	3872	34,4378	17,43247
F = 3,679 $\alpha = ,012$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #185
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	N	Media	Desv, tip.
Solo trabaja	1612	36,0411	17,93867
Estudia y trabaja	116	47,3814	19,88969
Está desempleado	1026	33,6732	16,48540
Es pensionado o rentista	99	39,8977	19,38909
Solo estudia	103	38,4135	19,98580
Solo se dedica a tareas del hogar	850	29,8300	15,02061
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	30,2479	14,94654
Total	3871	34,4560	17,41709
F = 27,446 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #186
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	N	Media	Desv, tip.
Rentas	1	46,0862	105,04094
Directivo de la administración pública o de empresas privadas	11	51,7818	21,73584
Profesional	111	45,0228	21,99750
Técnico medio	277	39,5365	18,84567
Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	622	35,5814	18,17857
Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	109	30,4101	14,93590
Calificadas de industrias, construcción y operación	149	35,2589	15,70006
No calificadas	429	36,4019	17,66651
Total	1710	36,7936	18,32661
F = 7,863 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #187
ACCESO A LUBRICANTE
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	N	Media	Desv. tip.
No remunerado	35	34,9688	16,81389
Empleado del Gobierno o Institución	172	41,2862	18,78124
Empleado de empresa privada	589	39,7160	19,88121
Servicio doméstico	117	34,3851	16,19001
Cuenta propia	647	33,9306	16,67735
Patrón con menos de 10 empleados	112	35,6066	15,54991
Patrón con 10 o más empleados	18	43,1394	24,90112
Total	1690	36,9554	18,29083
F = 7,875 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #188
ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL ACCESO A LUBRICANTE

	N
Correlación múltiple	0,383
Porcentaje de variabilidad predicha (R ²)	14,7%
VARIABLES EN LA ECUACIÓN	
	Peso (β)
Acceso al condón	0,187
Nivel educativo	0,208
Identidad de género femenino	-0,372
Identidad de género masculino	-0,322
Sabe leer y escribir	0,060
Nivel de actividad	0,057
Adherencia	0,042
Conocimientos sobre VIH	0,056
Lugar de entrevista	-0,048
Frecuencia con que asiste al culto de su religión	0,039
Ha tenido problemas de salud en los últimos tres meses	-0,032
Edad	-0,032

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

I. PROCESO DE DIAGNÓSTICO

El tiempo que ha transcurrido desde que la persona entrevistada recibió su diagnóstico de VIH resulta muy variable a través de la muestra, sin embargo se observa una concentración de poco menos de la tercera parte que dice haberlo recibido hace de 5 a 10 años, otro grupo con un 23,3% de 3 a 5 años y un 22,5% hace más de 10 años (ver cuadro # 189).

También resulta bastante variable la razón que les llevó a realizarse la prueba. Un 38,8% dice habérselo hecho porque estaba enfermo/a, un 22,7% por decisión voluntaria, otro 15,9% porque su pareja fue diagnosticada con VIH y a un 15,8% se la solicitaron (ver cuadro # 190).

GRÁFICO # 13
¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Existe un 27,7% que afirma no haber recibido ningún tipo de consejería al realizarse la prueba que resultó en el diagnóstico de VIH, mientras que un 29,4% sí recibió orientación tanto antes como al obtener el resultado, un 16,3% antes de la prueba y un 26,6% al recibir el resultado (ver cuadro # 191 y gráfico # 13).

La ausencia de consejería es más frecuente en Costa Rica y menor en Belice (ver cuadro # 192). Esta desatención resulta mayor entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 193), los hombres que tienen sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver cuadro # 194), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 195), las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 196), las de mayor edad (ver cuadro # 197), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 198), las mormonas (ver cuadro # 199), las personas separadas o divorciadas (ver cuadro # 200), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 201), las y los profesionales (ver cuadro # 202) y las y los empleados públicos (ver cuadro # 203).

El lugar más común para realizarse la prueba de VIH es el centro de salud o el hospital público de su localidad (ver cuadro # 204).

La gran mayoría de las personas entrevistadas (96,3%) afirma mantenerse en control médico por razón de su diagnóstico (ver cuadro # 205). La periodicidad de dicho control resulta variable entre las personas entrevistadas, pero predominan aquellas que deben asistir cada tres semanas o de uno a tres meses (ver cuadro # 206).

También es muy variable el tipo de servicios que se reciben en cada cita de control, pero sobresale para la gran mayoría de las personas la consulta médica, el tratamiento antirretroviral y los exámenes especiales CD4 y carga viral (ver cuadro # 208).

Cuadro #189
¿HACE CUÁNTO TIEMPO RECIBIÓ USTED EL DIAGNÓSTICO DE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 mes	47	1,2
De 1 a 5 meses	159	4,1
De 6 a 11 meses	134	3,5
De 1 o 2 años	530	13,7
De 3 a 5 años	901	23,3
De 5 a 10 años	1231	31,8
Más de 10 años	871	22,5
Total	3873	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		20

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #190
¿RAZÓN POR LA QUE USTED DECIDIÓ HACERSE LA PRUEBA DE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Porque estaba enfermo	1504	38,8
Se la hizo voluntariamente	878	22,7
Pareja fue diagnosticada con VIH	616	15,9
Se la solicitaron	611	15,8
Al donar sangre	102	2,6
Otro	161	4,1
Total	3872	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		21

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #191
¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Si, la recibí antes de la prueba	622	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	1019	26,6
Si, antes y al recibir el resultado	1125	29,4
No recibí consejería	1058	27,7
Total	3824	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		69

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #192
¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Si, la recibí antes de la prueba	8,5	10,0	4,6	23,2	24,4	25,4	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	28,7	38,6	38,0	15,1	20,5	26,8	26,6
Si, antes y al recibir el resultado	51,9	15,7	26,9	33,2	34,3	24,0	29,4
No recibí consejería	10,9	35,7	30,6	28,5	20,8	23,8	27,7
$\chi^2 = 427,441 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #193
¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	otros	Total
Si, la recibí antes de la prueba	22,0	12,6	5,6	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	26,2	26,7	33,3	26,6
Si, antes y al recibir el resultado	25,6	31,4	51,4	29,4
No recibí consejería	26,2	29,3	9,7	27,7
$\chi^2 = 90,289 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #194
¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Si, la recibí antes de la prueba	18,9	25,8	9,4	4,9	11,9	14,1
Si, al recibir el resultado de la prueba	25,6	16,7	27,4	39,0	27,9	27,3
Si, antes y al recibir el resultado	25,6	21,2	34,0	29,3	30,1	28,6
No recibí consejería	29,9	36,4	29,2	26,8	30,0	30,0
$\chi^2 = 38,799 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #195
¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 o 2 años	De 3 a 5 años	De 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Si, la recibí antes de la prueba	13,6	14,0	14,4	18,0	21,0	16,1	11,7	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	20,5	29,9	31,1	31,5	25,8	28,6	20,3	26,6
Si, antes y al recibir el resultado	45,5	34,4	28,8	34,2	33,5	29,9	19,7	29,4
No recibí consejería	20,5	21,7	25,8	16,3	19,6	25,4	48,2	27,7
$\chi^2 = 268,870 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #196
¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Si, la recibí antes de la prueba	17,2	15,4	17,8	11,0		16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	22,7	28,9	27,0	22,8	18,2	26,7
Si, antes y al recibir el resultado	31,2	29,7	26,8	30,7	45,5	29,3
No recibí consejería	29,0	25,9	28,3	35,4	36,4	27,7
$\chi^2 = 26,357 \quad \alpha = ,010$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 197
¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	de 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Si, la recibí antes de la prueba	17,9	15,7	18,2	13,8	14,3	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	23,6	25,6	26,5	28,1	35,4	26,7
Si, antes y al recibir el resultado	39,9	35,0	26,5	24,3	11,2	29,5
No recibí consejería	18,6	23,7	28,8	33,8	39,1	27,6
$\chi^2 = 110,479 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #198
¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Si, la recibí antes de la prueba	18,5	32,4	15,0	19,8	15,2	14,0	14,1	18,5	18,2	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	37,0	14,1	31,8	24,0	25,1	25,6	24,0	18,5	36,4	25,9
Si, antes y al recibir el resultado	14,8	36,6	24,7	30,5	33,2	33,9	25,4	24,5	18,2	29,8
No recibí consejería	29,6	16,9	28,5	25,8	26,5	26,5	36,4	38,4	27,3	28,0
$\chi^2 = 79,449 \quad \alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #199
¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Si, la recibí antes de la prueba	18,8	13,7	20,0	8,6	8,0	9,6	17,0	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	27,1	26,7	21,8	19,0	16,0	23,1	26,9	26,6
Si, antes y al recibir el resultado	29,3	29,5	25,5	37,9	32,0	48,1	27,8	29,4
No recibí consejería	24,9	30,1	32,7	34,5	44,0	19,2	28,3	27,7
$\chi^2 = 40,245 \quad \alpha = ,002$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #200
¿RECIBÍ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Si, la recibí antes de la prueba	17,3	16,2	11,1	11,5	16,3
Si, al recibir el resultado de la prueba	27,4	26,6	20,1	23,0	26,6
Si, antes y al recibir el resultado	27,2	30,9	34,7	34,0	29,4
No recibí consejería	28,0	26,3	34,0	31,5	27,7
$\chi^2 = 21,476 \quad \alpha = ,011$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #201
¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	Total
Si, la recibí antes de la prueba	13,8	15,9	20,0	17,3	11,0	17,8	11,1	16,4
Si, al recibir el resultado de la prueba	28,4	23,0	23,4	22,4	26,0	28,1	20,6	26,5
Si, antes y al recibir el resultado	28,6	27,4	30,7	25,5	47,0	26,4	49,2	29,4
No recibí consejería	29,1	33,6	25,9	34,7	16,0	27,8	19,0	27,7
$\chi^2 = 62,707 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #202
¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Directivo de la administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No Calificadas	Total
Si, la recibí antes de la prueba		27,3	10,9	11,6	13,1	8,6	11,0	18,1	13,6
Si, al recibir el resultado de la prueba	100,0	45,5	18,2	23,3	29,1	40,0	23,4	30,2	28,0
Si, antes y al recibir el resultado			28,2	30,2	26,6	24,8	47,6	26,1	28,7
No recibí consejería		27,3	42,7	34,9	31,2	26,7	17,9	25,7	29,7
$\chi^2 = 71,477 \quad \alpha = ,000$									

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #203
¿RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta propia	Patrón con menos de 10 empleados	Patrón con 10 a más empleados	Total
Si, la recibí antes de la prueba	57,1	13,5	14,6	8,7	11,6	10,6	11,1	13,5
Si, al recibir el resultado de la prueba	14,3	26,9	25,2	30,4	30,8	28,8	38,9	28,0
Si, antes y al recibir el resultado	14,3	26,3	27,6	33,0	29,4	37,5	33,3	28,9
No recibí consejería	14,3	33,3	32,7	27,8	28,2	23,1	16,7	29,5
$\chi^2 = 76,664 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #204
¿DÓNDE SE HIZO LA PRUEBA DE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Centro de salud/ Hospital Público	2684	69,2
Clínica/Laboratorio privado	611	15,8
Seguro social	275	7,1
ONG	144	3,7
Cruz Roja	66	1,7
Banco de sangre	33	,9
Otro	65	1,7
Total	3877	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		16

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 205
**¿ESTÁ ASISTIENDO A CONTROL MÉDICO
POR SER UNA PERSONA CON VIH?**

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3740	96,3
No	146	3,7
Total	3885	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #206
**¿CADA CUÁNTO TIENE CONTROL MÉDICO
POR SU DIAGNÓSTICO?**

	Frecuencia	Porcentaje
Dos semanas o menos	95	2,6
De tres semanas a un mes	1371	36,9
Dos o tres meses	1280	34,5
Cuatro o cinco meses	459	12,4
Seis meses o más	505	13,6
Total	3710	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		30
No aplica		153
Total		183

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #207
¿REALMENTE CADA
CUÁNTO VA A ESE CONTROL MÉDICO?

	Frecuencia	Porcentaje
Dos semanas o menos	99	2,7
De tres semanas a un mes	1427	38,8
Dos o tres meses	1224	33,3
Cuatro o cinco meses	429	11,7
Seis meses o más	498	13,5
Total	3677	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		63
No aplica		153
Total		216

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


Cuadro #208
¿Qué SERVICIOS RECIBE CUANDO
ASISTE A CONTROL MÉDICO?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Consulta médica	3469	93,1
Tratamiento antirretroviral	2903	77,9
Exámenes especiales (cd4 y carga viral)	2484	66,7
Exámenes de laboratorio	1780	47,8
Servicio psicológico	854	22,9
Tratamiento por enfermedades oportunistas	735	19,7
Consejería y educación	537	14,4
Asesoría nutricional	301	8,1
Servicio odontológico	286	7,7
Servicio de salud sexual y reproductiva	146	3,9
Otro	106	2,9
Total	3724	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		15
No Aplica		153
Total		169

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



II. PREOCUPACIÓN POR SU SALUD



Un 78,9% de las personas afirma que desde que recibieron su diagnóstico acostumbran cuidar más de su salud (ver cuadro # 209 y gráfico # 14).

Esta tendencia hacia una mayor preocupación por la salud resulta más alta para Panamá y más baja para Belice (ver cuadro # 210). Del mismo modo, es más alta entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 211), las que tienen mejor perspectiva de futuro (ver cuadro # 212), las que tiene mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 213), mayor acceso a condones (ver cuadro # 214) y a lubricantes (ver cuadro # 215), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 216), las que recibieron consejería en el momento del examen de VIH (ver cuadro # 217), las que practican una mayor cantidad de acciones para cuidar su salud (ver cuadro # 218) y las que tienen más motivos para hacerlo (ver cuadro # 219), las que no han tenido problemas de salud en los últimos tres meses (ver cuadro # 220), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 221), las que están actualmente tomando medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 222), las que no han tenido efectos adversos por la TAR, las que mejor perciben los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 225), las que cuentan con alguien que las pueda acompañar al servicio de salud (ver cuadro # 226), las que menos han sufrido victimización (ver cuadro # 227), las que menos alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 228), las de mayor edad (ver cuadro # 229), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 230), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 231), las mormonas (ver cuadro # 232), las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 233), las que no han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 234), las personas pensionadas o que viven de las rentas (ver cuadro # 235) y las y los empleados públicos (ver cuadro # 236).

Las acciones que se realizan para cuidar la salud también resultan muy variables en la muestra, pero sobresalen el tomar los medicamentos, el utilizar el condón en todas las relaciones sexuales y el mejorar la alimentación (ver cuadro # 237).

Entre los principales motivos para cuidar más su salud sobresale el deseo de vivir, el amor propio y la autoestima y el amor a sus familiares (ver cuadro # 238).

Cuadro # 209
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?

	Frecuencia	Porcentaje
Menos	80	2,1
Igual	730	19,0
Más	3037	78,9
Total	3847	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		46

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 210
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Menos	2,4	6,1	2,1	1,5	1,4	2,0	2,1
Igual	44,0	18,4	18,2	17,4	28,0	13,1	19,0
Más	53,6	75,4	79,6	81,2	70,6	84,9	79,0
$\chi^2 = 108,894 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 211
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA
MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Menos	2,6	1,8		2,1
Igual	21,1	16,9	36,8	19,0
Más	76,3	81,3	63,2	78,9
$\chi^2 = 29,473 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 212
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Menos	3,9	1,6	1,1	2,1	2,1
Igual	46,1	29,6	20,2	14,9	19,0
Más	50,0	68,8	78,7	83,0	78,9
$\chi^2 = 209,576 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 213
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Menos	3,1	1,3	2,7	1,9	2,1
Igual	31,2	26,7	19,5	13,9	19,0
Más	65,6	72,0	77,8	84,2	78,9
$\chi^2 = 70,570 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 214
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN ACCESO A CONDONES

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Menos	1,2	2,4	1,4		2,1
Igual	24,7	19,8	14,6	12,0	19,0
Más	74,1	77,8	84,0	88,0	79,0
$\chi^2 = 23,940 \quad \alpha = ,001$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 215
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN ACCESO A LUBRICANTES

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Menos	1,4	2,8	2,1	2,1	2,1
Igual	20,8	18,0	18,2	14,0	19,0
Más	77,7	79,3	79,7	83,9	78,9
$\chi^2 = 14,283 \quad \alpha = ,027$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 216
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 o 2 años	De 3 a 5 años	De 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Menos		3,2	3,0	2,9	2,7	1,5	1,4	2,0
Igual	11,9	13,9	20,0	20,5	22,6	18,7	15,4	18,9
Más	88,1	82,9	77,0	76,6	74,7	79,9	83,2	79,1
$\chi^2 = 31,123 \quad \alpha = ,002$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 217
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN SI RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH

	Si, la recibí antes de la prueba	Si, al recibir el resultado de la prueba	Si, antes y al recibir el resultado	No recibí consejería	Total
Menos	2,3	2,8	1,9	1,5	2,1
Igual	22,9	17,6	17,6	19,1	18,9
Más	74,8	79,6	80,5	79,4	79,0
$\chi^2 = 13,096 \quad \alpha = ,042$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 218
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN PROPORCIÓN DE ACCIONES QUE REALIZA PARA CUIDAR SALUD

	Ninguna	De 1 a 5	De 6 a 10	De 11 a 20	Más de 20	Total
Menos	14,1	4,1	1,4	1,1	2,0	2,1
Igual	60,0	32,3	21,9	20,9	12,9	18,9
Más	25,9	63,6	76,6	78,1	85,1	78,9
$\chi^2 = 266,152 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 219
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN PROPORCIÓN MOTIVOS PARA CUIDAR SALUD

	Ninguno	De 6 a 10	De 11 a 20	Más de 20	Total
Menos	9,7				2,1
Igual	88,3				19,0
Más	2,1	100,0	100,0	100,0	79,0
$\chi^2 = 3747,810 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro# 220
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN SI HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

	Sí	No	Total
Menos	3,7	1,4	2,0
Igual	19,6	18,6	18,9
Más	76,7	80,0	79,1
$\chi^2 = 21,100 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 221
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Menos	1,2	1,6	1,8	13,5	18,2	2,0
Igual	9,0	21,1	22,9	27,8	27,3	19,0
Más	89,8	77,3	75,3	58,7	54,5	79,0
$\chi^2 = 187,966 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 222
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN SI ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES

	Sí	No	Total
Menos	1,7	5,2	2,1
Igual	17,5	31,8	19,0
Más	80,8	63,0	78,9
$\chi^2 = 73,939 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 223
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN SI HA TENIDO EFECTOS ADVERSOS POR LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL

	Sí	No	Total
Menos	1,5	1,8	1,7
Igual	20,8	16,6	17,5
Más	77,7	81,6	80,8
$\chi^2 = 7,102 \quad \alpha = ,029$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 225
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	Muy baja	Medio baja	Medio alta	Muy alta	Total
Menos	3,6	3,3	2,5	1,8	2,1
Igual	21,4	43,2	25,5	13,5	18,9
Más	75,0	53,4	72,0	84,8	78,9
$\chi^2 = 267,160 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 226
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN SI ALGUIEN QUE LE PUEDA ACOMPAÑAR
AL MÉDICO O A UN HOSPITAL

	Sí	No	Total
Menos	2,1	2,0	2,1
Igual	17,6	23,2	18,8
Más	80,2	74,8	79,1
$\chi^2 = 12,422 \quad \alpha = ,002$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 227
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN VICTIMIZACIÓN

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Menos	2,1	2,3	1,2	2,9	2,1
Igual	16,1	20,6	31,8	50,0	19,0
Más	81,8	77,2	67,0	47,1	78,9
$\chi^2 = 71,636 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 228
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Menos	1,7	2,6	7,1		2,1
Igual	15,8	24,8	43,5	100,0	19,0
Más	82,5	72,7	49,4		78,9
$\chi^2 = 141,480 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 229
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Menos	3,5	2,9	1,0	1,6	3,7	2,1
Igual	20,0	20,8	20,5	14,6	14,3	19,0
Más	76,5	76,3	78,5	83,9	82,0	78,9
$\chi^2 = 37,215 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 230
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS,
IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Menos	2,1	2,0	2,1
Igual	17,9	26,9	19,0
Más	80,0	71,0	78,9
$\chi^2 = 21,111 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 231
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Menos	14,3		1,4	2,3	2,3	2,3	1,1	3,3	8,3	2,1
Igual	7,1	31,4	20,8	16,4	18,7	18,6	15,1	7,3		17,9
Más	78,6	68,6	77,8	81,3	79,0	79,0	83,9	89,4	91,7	79,9
$\chi^2 = 58,485 \quad \alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 232
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Menos	2,1	2,3	1,7	1,7		2,0	2,0	2,1
Igual	18,2	15,5	16,9	22,0	20,0	19,6	25,0	18,8
Más	79,7	82,2	81,4	76,3	80,0	78,4	73,0	79,1
$\chi^2 = 31,108 \quad \alpha = ,002$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 233
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Menos	1,7	1,9	2,9	3,4	2,1
Igual	15,5	14,6	19,1	25,4	17,2
Más	82,8	83,5	78,0	71,2	80,7
$\chi^2 = 32,718 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 234
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Menos	3,4	1,8	2,1
Igual	22,0	18,2	18,9
Más	74,6	80,0	79,0
$\chi^2 = 13,443 \quad \alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 235
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	Total
Menos	2,4	1,7	2,4	1,0	2,0	0,8	8,1	2,1
Igual	18,2	14,7	21,6	14,1	21,6	18,3	16,1	18,9
Más	79,4	83,6	76,0	84,8	76,5	80,9	75,8	79,0
$\chi^2 = 28,730 \quad \alpha = ,004$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 236
¿DESPUÉS DE SU DIAGNÓSTICO CUIDA MENOS, IGUAL O MÁS SU SALUD?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a más empleados	Total
Menos	8,8	1,8	1,7	3,5	2,8	1,8	5,6	2,4
Igual	32,4	10,5	17,5	26,1	16,5	26,8	16,7	17,9
Más	58,8	87,7	80,8	70,4	80,7	71,4	77,8	79,7
$\chi^2 = 33,818$	$\alpha = ,001$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 237
ACCIONES QUE REALIZA PARA CUIDAR SU SALUD
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Toma los medicamentos que le han recetado	2422	63,8
Usa condón todas las veces que tiene relaciones sexuales	2308	60,8
Ha mejorado su alimentación	2070	54,6
No consume drogas	1781	46,9
Asiste al control de los servicios de salud cuando le corresponde	1780	46,9
No consume alcohol	1684	44,4
Hace ejercicio regularmente	796	21,0
Ha reducido el número de parejas sexuales	718	18,9
Practica la fidelidad mutua con su pareja	682	18,0
Practica pasatiempos	626	16,5
Asiste a las consejerías	569	15,0
Practica la abstinencia	566	14,9
Es miembro de un grupo de auto apoyo	543	14,3
No tiene relaciones sexuales con personas desconocidas	446	11,8
Usa condón con las personas que no conoce	407	10,7
Tiene redes de apoyo social	403	10,6
Usa condón solo con su(s) pareja(s) estables(s)	370	9,7
No tiene relaciones sexuales anales	357	9,4
No tiene relaciones sexuales orales	334	8,8
No tiene relaciones sexuales vaginales	202	5,3
Usa condón algunas veces	139	3,7
Otro	125	3,3
Total	3794	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		99

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+




Cuadro # 238
MOTIVOS PARA CUIDAR SU SALUD
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Quiero vivir	2120	70,1
Amor propio, autoestima	1940	64,2
Amor a sus hijos, familiares o pareja	1663	55,0
Las charlas recibidas de ONG	744	24,6
Información escrita que ha leído	555	18,4
Programa de visita domiciliar	500	16,5
Las conversaciones con mis amistades	486	16,1
Asistir a los grupos de auto apoyo	406	13,4
La muerte de una persona cercana	373	12,3
Sus creencias religiosas	343	11,3
Los mensajes de la televisión	136	4,5
Los mensajes de la radio	108	3,6
Otro	42	1,4
Total	3022	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		15
No aplica		856
Total		871

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

III. PROBLEMAS DE SALUD

GRÁFICO 15
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD
EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cerca de una cuarta parte de las personas entrevistadas afirma haber tenido algún tipo de problema de salud o infección en los últimos tres meses (ver cuadro # 239 y gráfico # 15).

El país con mayor cantidad de personas con problemas de salud es Honduras y el de menor proporción Belice (ver cuadro # 240). También resulta alta la cantidad de personas con problemas entre aquellas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 241), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 242), las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 243), las de mayor edad (ver cuadro # 244), las mormonas (ver cuadro # 245), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 246), separadas o divorciadas (ver cuadro # 247) y las que trabajan en servicios domésticos (ver cuadro # 248).

La mayoría de las personas entrevistadas asegura no haber tenido ningún tipo de problema de salud específico en los últimos tres meses, pero entre aquellas que sí mencionan alguno, sobresalen el decaimiento general y el dolor de cabeza persistente (ver cuadro # 249).

Ante el último problema de salud la mayoría consultó en el servicio de salud donde asiste para control (ver cuadro # 250) y un 53,8% buscó ayuda una semana o menos después de los primeros síntomas (ver cuadro # 251).

Entre las personas que consultaron, el 89,2% recibió receta para adquirir medicinas (ver cuadro # 252) y al 70,2% le suministraron todo lo que necesitaba en medicamentos (ver cuadro # 253). Entre el resto, un 53,7% consiguió todas las medicinas en otro lugar, mientras que un 34,6% solo consiguió algunas y un 11,7% no consiguió ninguna medicina (ver cuadro # 254).

Un 6,6% de las personas a las que les recetaron medicamentos por un problema de salud en los últimos tres meses reconoce no haber tomado la dosis que le indicaran (ver cuadro # 255).

Cuadro #239
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1064	27,6
No	2786	72,4
Total	3850	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		43

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 240
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	20,3	27,7	27,4	32,3	23,5	21,1	27,6
No	79,7	72,3	72,6	67,7	76,5	78,9	72,4
$\chi^2 = 32,731 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 241
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Sí	29,5	26,5	19,7	27,6
No	70,5	73,5	80,3	72,4
$\chi^2 = 6,339 \quad \alpha = ,042$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 242
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 o 2 años	De 3 a 5 años	De 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	48,8	38,5	22,6	22,1	24,7	28,1	31,6	27,7
No	51,2	61,5	77,4	77,9	75,3	71,9	68,4	72,3
$\chi^2 = 39,404 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #243
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	13,7	22,9	39,8	74,4	100,0	27,6
No	86,3	77,1	60,2	25,6		72,4
$\chi^2 = 360,954 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #244
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	26,0	27,4	25,4	31,8	30,9	27,7
No	74,0	72,6	74,6	68,2	69,1	72,3
$\chi^2 = 11,772 \quad \alpha = ,019$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #245
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Católica Evángelica	Testigo de Jehóva	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	24,4	31,7	25,4	28,1	44,0	37,3	26,4	27,7
No	75,6	68,3	74,6	71,9	56,0	62,7	73,6	72,3
$\chi^2 = 25,160 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #246
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS
ÚLTIMOS 3 MESES? SEGÚN SI HA CAMBIADO
DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	37,8	25,3	27,6
No	62,2	74,7	72,4
$\chi^2 = 45,159 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #247
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañado/a unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	26,7	27,0	37,2	33,3	27,6
No	73,3	73,0	62,8	66,7	72,4
$\chi^2 = 11,081 \quad \alpha = ,011$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #248
¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrón con menos de 10 empleados	Patrón con 10 a más empleados	Total
Sí	23,5	25,3	21,9	39,7	26,3	34,2	11,1	25,9
No	76,5	74,7	78,1	60,3	73,7	65,8	88,9	74,1
$\chi^2 = 22,532 \quad \alpha = ,001$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #249
PROBLEMAS DE SALUD EN ÚLTIMOS TRES MESES
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Decaimiento general	423	11,0
Dolor de cabeza persistente	409	10,6
Fiebre por más de 15 días	276	7,2
Diarrea por más de 3 días	274	7,1
Tos por más de 15 días	197	5,1
Enfermedades de la piel	165	4,3
Abscesos en la piel	86	2,2
Ganglios inflamados	111	2,9
Infecciones de transmisión sexual	74	1,9
Candidiasis oral	52	1,4
Neumonía	49	1,3
Tuberculosis	47	1,2
Convulsiones	22	,6
Otra	276	7,2
Ninguno	2624	68,3
Total	3843	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		50

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #250
¿QUÉ HIZO LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO PROBLEMAS DE SALUD?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Consultó en el servicio de salud donde asiste a control	884	73,2
Consultó a otro médico particular	138	11,4
Se auto medicó	186	15,4
Otro	35	2,9
No hizo nada	73	6,0
Total	1208	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		12
No aplica		2673
Total		2685

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #251
¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS BUSCÓ AYUDA?

	Frecuencia	Porcentaje
Una semana o menos	605	53,8
Más de una semana, pero menos de un mes	246	21,9
Un mes o más	180	16,0
No buscó ayuda	93	8,3
Total	1124	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		43
No aplica		2726
Total		2769

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #252
¿RECIBIÓ RECETA PARA MEDICINAS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	919	89,2
No	111	10,8
Total	1029	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		2
No aplica		2862
Total		2864

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #253
¿LE SUMINISTRÓ EL CENTRO DONDE CONSULTÓ LA(S) MEDICINA(S)?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí, le suministraron todo lo que necesitaba	641	70,2
Le suministraron algunas pero no todas	191	21,0
No le suministraron ninguna medicina	81	8,9
Total	913	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		5
No aplica		2974
Total		2980

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 254
¿CONSIGUIÓ LA MEDICINA RECETADA EN OTRO LUGAR?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí, consiguió todo lo que necesitaba	142	53,7
Consiguió algunas pero no todas	91	34,6
No consiguió la(s) medicina(s)	31	11,7
Total	264	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		9
No aplica		3621
Total		3629

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #255
¿TOMÓ O SE APLICÓ LA DOSIS COMPLETA QUE LE RECETARON?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	840	93,4
No	59	6,6
Total	899	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		19
No aplica		2974
Total		2994

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


Cuadro #256
¿POR QUÉ TOMÓ LA DOSIS COMPLETA?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Los síntomas desaparecieron	13	22,6
Se sentía mejor	19	32,8
La medicina le cayó mal	4	7,5
No estaba segura/o cómo se tomaba o aplicaba	3	6,1
No tenía dinero para el medicamento	37	65,4
Se le olvidó	6	11,3
Total	57	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		2
No aplica		3834
Total		3836

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

IV. PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD

GRÁFICO # 16
PERCEPCIÓN DE ESTADO DE SALUD ACTUAL



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Tiende a privar en la muestra de personas entrevistadas una percepción relativamente positiva de su estado de salud: un 23,5% lo considera muy bueno, frente a un 0,3% que lo considera muy malo, y un 44,2% que lo califica de bueno frente a solo 3,4% como malo (ver cuadro # 257 y gráfico # 16).

La percepción es más positiva en Belice y menos en Panamá (ver cuadro # 258). Existe también una mejor percepción de su salud entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 259), las que tienen mejor perspectiva de futuro (ver cuadro # 260), las que tiene mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 261), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 262), las que mejor perciben los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 263), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 264), las de menor edad (ver cuadro # 265), las personas trans (ver cuadro # 266), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 267), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 268), las mormonas (ver cuadro # 269), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 270), las solteras o las que viven con su pareja (ver cuadro # 271), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 272), las profesionales (ver cuadro # 273) o las que laboran sin remuneración (ver cuadro # 274).

Cuadro # 257
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?

	Frecuencia	Porcentaje
Muy bueno	909	23,5
Bueno	1711	44,2
Estable	1111	28,7
Malo	131	3,4
Muy malo	12	,3
Total	3873	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		20

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 258
**¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Muy bueno	30,0	25,7	14,2	31,8	24,1	21,5	23,5
Bueno	49,2	43,0	55,5	35,1	43,7	40,0	44,2
Estable	19,2	30,1	25,4	28,5	30,3	36,9	28,7
Malo	1,5	1,2	4,5	4,3	1,7	1,3	3,4
Muy malo			0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
$\chi^2 = 200,746$ $\alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #259
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Muy bueno	18,8	26,2	39,7	23,4
Bueno	43,9	44,4	42,5	44,2
Estable	32,8	26,2	16,4	28,7
Malo	3,9	3,2	1,4	3,4
Muy malo	0,6	0,1		0,3
$\chi^2 = 59,073 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #260
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Muy bueno	7,4	9,7	17,7	27,3	23,4
Bueno	45,0	49,8	50,4	42,6	44,2
Estable	41,1	31,1	28,2	27,2	28,7
Malo	6,1	7,8	3,7	2,6	3,4
Muy malo	0,3	1,6		0,2	0,3
$\chi^2 = 147,559 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #261
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Muy bueno	12,9	17,9	20,8	29,2	23,5
Bueno	48,4	46,3	46,8	40,6	44,2
Estable	29,0	31,4	28,4	27,5	28,7
Malo	9,7	4,0	3,6	2,6	3,4
Muy malo		0,5	0,4	0,1	0,3
$\chi^2 = 65,649 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #262
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 o 2 años	De 3 a 5 años	De 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Muy bueno	10,9	18,5	17,9	21,6	22,3	23,9	27,8	23,5
Bueno	47,8	31,8	41,8	46,9	47,4	43,7	41,6	44,0
Estable	34,8	43,9	37,3	28,8	25,2	28,9	28,0	28,8
Malo	6,5	5,7	3,0	2,3	4,6	3,1	2,6	3,4
Muy malo				0,4	0,4	0,5		0,3
$\chi^2 = 62,410 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #263
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Muy bueno	24,1	16,2	16,6	26,1	23,5
Bueno	31,0	43,5	43,3	44,6	44,2
Estable	41,4	33,9	35,7	26,2	28,7
Malo	3,4	5,7	4,2	2,9	3,4
Muy malo		0,6	0,2	0,3	0,3
$\chi^2 = 66,317 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #264
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE
SALUD ACTUAL ES? SEGÚN SI
ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Si	No	Total
Muy bueno	24,4	22,6	23,4
Bueno	46,0	42,6	44,2
Estable	26,5	30,6	28,7
Malo	3,0	3,7	3,4
Muy malo	0,1	0,5	0,3
$\chi^2 = 15,712 \quad \alpha = ,003$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #265
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Muy bueno	25,9	23,8	23,9	21,1	23,6	23,5
Bueno	38,7	45,5	43,8	46,2	41,0	44,2
Estable	28,7	27,4	29,2	29,3	30,4	28,7
Malo	6,0	3,0	2,6	3,2	5,0	3,3
Muy malo	0,7	0,2	0,5	0,1		0,3
$\chi^2 = 27,445 \quad \alpha = ,037$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #266
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Muy bueno	20,4	26,1	34,1	30,3	23,4
Bueno	47,7	41,0	34,1	39,4	44,2
Estable	27,1	30,3	27,3	27,3	28,7
Malo	4,4	2,4	4,5	3,0	3,4
Muy malo	0,4	0,3			0,3
$\chi^2 = 42,753 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #267
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Muy bueno	25,1	11,4	23,5
Bueno	42,7	54,8	44,2
Estable	28,9	27,6	28,7
Malo	3,0	6,1	3,4
Muy malo	0,4		0,3
$\chi^2 = 59,182 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #268
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Muy bueno	40,7	13,9	18,4	25,6	23,2	27,3	32,2	40,0	63,6	25,1
Bueno	29,6	48,6	49,8	42,8	42,3	40,4	36,4	34,0	36,4	42,7
Estable	18,5	34,7	26,2	28,3	31,0	30,8	29,4	24,0		28,9
Malo	3,7	2,8	4,9	2,9	3,3	1,5	1,7	2,0		3,0
Muy malo	7,4		0,7	0,4	0,1		0,3			0,4

$\chi^2 = 135,553$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #269
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Muy bueno	25,6	23,4	20,3	28,3	26,9	25,5	19,4	23,5
Bueno	43,9	43,6	42,4	31,7	38,5	37,3	46,8	44,1
Estable	27,8	28,4	37,3	35,0	30,8	35,3	29,4	28,7
Malo	2,5	3,9		5,0	3,8	2,0	4,4	3,4
Muy malo	0,2	0,7						0,3

$\chi^2 = 36,924$ $\alpha = ,045$

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #270
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Muy bueno	24,6	23,1	23,4
Bueno	37,2	45,8	44,2
Estable	33,0	27,7	28,7
Malo	4,6	3,1	3,4
Muy malo	0,6	0,3	0,3

$\chi^2 = 21,795$ $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #271
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Muy bueno	23,6	23,6	18,4	25,0	23,5
Bueno	42,7	47,0	32,7	43,6	44,2
Estable	29,8	26,3	42,9	26,5	28,6
Malo	3,5	2,9	6,1	4,9	3,4
Muy malo	0,5	0,2			0,3
$\chi^2 = 34,342 \quad \alpha = ,001$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #272
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	Total
Muy bueno	26,4	37,1	20,9	23,7	27,2	18,1	29,7	23,5
Bueno	43,5	37,1	39,2	43,3	35,9	53,7	37,5	44,1
Estable	27,8	25,0	33,9	28,9	33,0	24,5	23,4	28,7
Malo	2,2	0,9	5,0	4,1	3,9	3,7	9,4	3,4
Muy malo	0,1		1,0					0,3
$\chi^2 = 117,916 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #273
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Directivo de la administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	Calificadas de industrias construcción y operación	No calificadas	Total
Muy bueno		30,0	50,0	30,8	25,7	25,9	22,3	23,8	27,3
Bueno		60,0	37,3	35,1	44,0	46,3	49,3	44,8	43,0
Estable		10,0	11,8	33,3	27,8	25,9	25,7	28,2	27,3
Malo			0,9	0,7	2,2	1,9	2,7	3,0	2,1
Muy malo					0,3			0,2	0,2
$\chi^2 = 55,823 \quad \alpha = ,001$									

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #274
¿USTED DIRÍA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL ES?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Muy bueno	44,1	40,1	30,6	19,5	21,8	20,9	27,8	27,0
Bueno	44,1	39,5	42,2	41,5	44,2	44,5	50,0	42,9
Estable	11,8	19,8	25,2	34,7	31,2	30,9	22,2	27,7
Malo		0,6	1,9	4,2	2,5	3,6		2,2
Muy malo			0,2		0,3			0,2
$\chi^2 = 51,481 \quad \alpha = ,001$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

V. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS

Un 24,7% de las personas entrevistadas afirma haber tenido que pagar por servicios de salud dentro del sector público (ver cuadro # 275), principalmente por exámenes de laboratorio, medicamentos ARV y por consulta a especialista (ver cuadro # 276).

Por otra parte, un 17,7% se ha visto obligado a pagar servicios de salud privados (ver cuadro # 277), en lo que respecta sobre todo a exámenes de laboratorio y consulta general (ver cuadro # 278).

Cuadro #275
¿PAGO POR SERVICIOS DE SALUD DENTRO DEL SERVICIO PÚBLICO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	957	24,7
No	2921	75,3
Total	3877	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		16

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #276
¿CUÁLES SERVICIOS HA TENIDO QUE PAGAR?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Exámenes de laboratorio	748	79,3
Medicamentos ARV	451	47,8
Consulta general	344	36,5
Medicamentos IO	150	15,9
Consulta de especialista	138	14,6
Otro	25	2,6
Total	944	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		13
No aplica		2936
Total		2949

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 277
¿Y HA TENIDO QUE PAGAR SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	683	17,7
No	3179	82,3
Total	3861	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		32

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+




Cuadro #278
¿CUÁLES SERVICIOS PRIVADOS HA TENIDO QUE PAGAR?
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Exámenes de laboratorio	376	56,2
Consulta general	258	38,5
Consulta de especialista	136	20,3
Medicamentos IO	64	9,6
Medicamentos ARV	12	1,7
Otro	74	11,0
Total	669	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		14
No aplica		3210
Total		3224

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

GRÁFICO # 17
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
 SEGÚN TIEMPO DE HABER RECIBIDO DIAGNÓSTICO DE VIH



Existe un 10,6% de las personas entrevistadas que afirmó no estar tomando medicamentos antirretrovirales en el momento de la entrevista (ver cuadro # 279).

La proporción de personas en tratamiento es superior para Honduras mientras que el nivel más bajo corresponde a Belice (ver cuadro # 280). La cantidad de personas en tratamiento es superior también entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 281), entre las personas con mejor perspectiva de futuro (ver cuadro # 282), las mujeres que tienen sexo solo con hombres (ver cuadro # 283) y los hombres que tienen sexo solo con mujeres (ver cuadro # 284), las que tienen mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 285), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 286), las que recibieron consejería antes del examen de VIH (ver cuadro # 287), las que realizan una mayor proporción de acciones para cuidar su salud (ver cuadro # 288) y las que tienen mayor cantidad de motivos para hacerlo (ver cuadro # 289), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 290), las que mejor perciben los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 291), las que menos alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 292), las que se han realizado el examen de CD4 en los últimos 12 meses (ver cuadro # 293) y tienen un recuento más bajo (ver cuadro # 294), así como las que se han realizado el examen de carga viral (ver cuadro # 295), conoce su resultado (ver cuadro # 296) y el mismo fue indetectable (ver cuadro # 297), las que menos han sufrido victimización (ver cuadro # 298), las personas cuya familia sabe que tienen VIH (ver cuadro # 299), las que tienen alguien que pueda acompañarlas al servicio de salud (ver cuadro # 300), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 301), las de mayor edad (ver cuadro # 302), las personas con identidad de género femenino (ver cuadro # 303), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 304), las mormonas (ver cuadro # 305), las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 306), las viudas (ver cuadro # 307) y las pensionadas o que viven de las rentas (ver cuadro # 308).

El 87,9% de las personas recibe sus medicamentos antirretrovirales en forma completa y gratuita (ver cuadro # 309).

El tiempo que lleva tomando medicamentos antirretrovirales resulta muy variable en la muestra, pero existe una concentración en personas con 3 años o más de tomarlos (ver cuadro # 310).

El médico especialista es la persona que más frecuentemente le brinda atención en su control antirretroviral, aunque también se mencionan bastante las enfermeras (ver cuadro # 311).

La variedad de medicamentos antirretrovirales mencionados es enorme, pero sobresalen de manera especial Efavirenz con un 63% de mención y Zidovudina + Lamivudina con un 52% (ver cuadro # 312).

Un 21,2% de las personas que están tomando medicamentos antirretrovirales afirma haber tenido efectos adversos (ver cuadro # 313). La mayoría de estas personas consultó al respecto a su médico en el servicio de salud (ver cuadro # 314) y la consulta redundó en el mantenimiento del esquema de tratamiento para el 82,8% de estas personas (ver cuadro # 315).



Cuadro # 279
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3477	89,4
No	412	10,6
Total	3889	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 280
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	72,3	91,2	90,0	94,3	78,5	86,8	89,4
No	27,7	8,8	10,0	5,7	21,5	13,2	10,6
$\chi^2 = 124,100 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 281
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Sí	88,3	90,7	77,5	89,4
No	11,7	9,3	22,5	10,6
$\chi = 16,595 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 282
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
sí	83,4	81,8	91,1	90,5	89,4
No	16,6	18,2	8,9	9,5	10,6
$\chi^2 = 32,449 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 283
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	92,5	73,7	85,7	83,3	86,4	92,2
No	7,5	26,3	14,3	16,7	13,6	7,8
$\chi^2 = 11,420$ $\alpha = ,022$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 284
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	84,3	89,6	83,3	73,2	90,9	87,6
No	15,7	10,4	16,7	26,8	9,1	12,4
$\chi^2 = 32,789$ $\alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 285
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	78,1	84,2	89,4	92,7	89,4
No	21,9	15,8	10,6	7,3	10,6
$\chi^2 = 50,900 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 286
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 10 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	31,9	70,9	67,9	82,4	88,8	94,6	97,0	89,5
No	68,1	29,1	32,1	17,6	11,2	5,4	3,0	10,5
$\chi^2 = 405,459 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 287
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI RECIBIÓ CONSEJERÍA CUANDO SE REALIZÓ LA PRUEBA DE VIH

	Si, recibí antes de la prueba	Si, al recibir el resultado de la preba	Si, antes y al recibir el resultado	No recibí consejería	Total
Sí	91,5	90,7	85,2	91,2	89,3
No	8,5	9,3	14,8	8,8	10,7
$\chi^2 = 29,321 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 288
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PROPORCIÓN DE ACCIONES QUE REALIZA PARA CUIDAR SALUD

	Ninguna	De 1 a 5	De 6 a 10	De 11 a 20	Mas de 20	Total
Sí	70,4	84,7	84,8	90,3	92,2	89,4
No	29,6	15,3	15,2	9,7	7,8	10,6
$\chi^2 = 73,746 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 289
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PROPORCIÓN MOTIVOS PARA CUIDAR SALUD

	Ninguna	De 6 a 10	De 11 a 20	Mas de 20	Total
Sí	81,7	91,5	89,8	92,4	89,4
No	18,3	8,5	10,2	7,6	10,6
$\chi^2 = 73,036 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 290
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	92,0	90,4	87,4	78,6	72,7	89,4
No	8,0	9,6	12,6	21,4	27,3	10,6
$\chi^2 = 32,025 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 291
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	1,00	2,00	3,00	4,00	Total
Sí	96,6	77,0	86,8	92,0	89,4
No	3,4	23,0	13,2	8,0	10,6
$\chi^2 = 104,976 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro# 292
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Si	91,9	84,7	69,7	100,0	89,4
No	8,1	15,3	30,3		10,6
$\chi^2 = 110,966 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 293
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI SE HA REALIZADO EL EXAMEN
DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

	Sí	No	Total
Sí	92,3	74,9	89,5
No	7,7	25,1	10,5
$\chi^2 = 164,370 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 294
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN CUÁNTO FUE RECUENTO DE CD4

	Menos de 100	De 101 a 300	De 301 a 500	De 501 a 750	De 750 a 1000	Más de 1000	Total
Sí	95,5	97,8	95,5	92,9	83,6	85,1	92,5
No	4,5	2,2	4,5	7,1	16,4	14,9	7,5
$\chi^2 = 61,060 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 295
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL

	Sí	No	Total
Sí	92,4	79,3	89,5
No	7,6	20,7	10,5
$\chi^2 = 119,837 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 296
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI CONOCE LOS RESULTADOS DE
SU ÚLTIMO EXAMEN DE CARGA VIRAL

	Sí	No	Total
Sí	93,5	91,3	92,4
No	6,5	8,7	7,6
$\chi^2 = 5,135 \quad \alpha = ,023$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 297
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN CUÁL FUE EL RECUENTO DE CARGA VIRAL

	Indetectable	Menos de 10000	Más de 10000	Total
Sí	96,9	83,5	83,3	93,5
No	3,1	16,5	16,7	6,5
$\chi^2 = 78,191 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 298
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN VICTIMIZACIÓN

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	91,1	88,8	80,2	80,6	89,4
No	8,9	11,2	19,8	19,4	10,6
$\chi^2 = 39,917 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 299
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI SU FAMILIA SABE QUE USTE
D ES UNA PERSONA CON VIH

	Sí	No	Total
Sí	92,0	78,7	89,4
No	8,0	21,3	10,6
$\chi^2 = 110,587 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 300
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI ALGUIEN QUE LE PUEDA ACOMPAÑAR
AL MÉDICO O A UN HOSPITAL

	Sí	No	Total
Sí	90,1	87,0	89,4
No	9,9	13,0	10,6
$\chi^2 = 6,099 \quad \alpha = ,014$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 301
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	90,5	88,4	89,4
No	9,5	11,6	10,6
$\chi^2 = 4,388 \quad \alpha = ,036$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 302
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	75,6	84,1	94,7	94,9	94,5	89,4
No	24,4	15,9	5,3	5,1	5,5	10,6
$\chi^2 = 190,902 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 303
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	91,8	87,5	81,8	72,7	89,4
No	8,2	12,5	18,2	27,3	10,6
$\chi^2 = 31,585 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 304
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No Asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	92,6	93,1	94,0	92,8	88,0	84,4	84,0	92,1	91,7	89,5
No	7,4	6,9	6,0	7,2	12,0	15,6	16,0	7,9	8,3	10,5
$\chi^2 = 56,969 \quad \alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 305
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	89,5	92,2	84,7	89,8	96,0	92,3	84,6	89,4
No	10,5	7,8	15,3	10,2	4,0	7,7	15,4	10,6
$\chi^2 = 34,126 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 306
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	93,2	91,4	87,2	84,8	90,8
No	6,8	8,6	12,8	15,2	9,2
$\chi^2 = 35,241 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 307
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	87,5	90,6	91,8	97,1	89,5
No	12,5	9,4	8,2	2,9	10,5
$\chi^2 = 23,154 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 308
¿ACTUALMENTE ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	Total
Sí	89,4	80,2	87,7	96,9	77,7	93,4	89,1	89,5
No	10,6	19,8	12,3	3,1	22,3	6,6	10,9	10,5
$\chi^2 = 48,962 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 309
¿CÓMO LE PROPORCIONAN SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?

	Frecuencia	Porcentaje
Completa y gratuita	2533	73,8
Solo completa	602	17,5
Solo gratuita	171	5,0
Ni completa ni gratuita	128	3,7
Total	3434	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		42
No aplica		416
Total		459

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 310
¿TIEMPO EMPEZÓ A TOMAR MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?

	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 mes	63	1,8
De 1 a 5 meses	186	5,4
De 6 a 11 meses	180	5,2
De 1 o 2 años	540	15,6
De 3 a 5 años	797	23,1
De 5 a 10 años	1150	33,3
Más de 10 años	539	15,6
Total	3455	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		22
No aplica		416
Total		438

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 311
¿CUÁLES PERSONAS LE BRINDAN ATENCIÓN EN SU
CONTROL ANTIRRETROVIRAL?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Médico especialista	1938	56,0
Enfermera	1833	53,0
Médico General	1602	46,3
Consejera	560	16,2
Otro	339	9,8
Total	3461	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		16
No aplica		416
Total		432

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 312
¿CUÁLES ANTIRRETROVIRALES ESTÁ TOMANDO ACTUALMENTE?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Efavirenz (sustiva, aviranz y efavir)	1937	63,0
Zidovudina + lamivudina (combivir / duovir)	1599	52,0
Lamivudina (epivir, lamivir ó 3tc)	459	14,9
Emtricitabina/tenofovir/efavirenz (atripla ó viraday)	408	13,3
Lopinavir/ritonavir (kaletra, kameltrex ó aluvia)	340	11,1
Emtricitabina/tenofovir (truvada)	220	7,1
Tenofovir (tenovir, tenvir)	178	5,8
Zidovudina (retrovir, zidovir ó azt)	261	8,5
Lamivudina / estavudina / nevirapina (triomune 40)	143	4,7
Nevirapina (viramune, nevimune o nevipan)	107	3,5
Abacavir (ziagen, virol y abavir)	76	2,5
Abacavir + lamivudina (kivexa)	38	1,2
Abacavir+ lamivudina+ zidovudina (trizivir y triviro)	82	2,7
Didodasina (videx y didex)	66	2,2
Lopinavir	51	1,6
Ritonavir (norvir)	45	1,5
Raltegravir	29	,9
Darunavir (prezista)	24	,8
Emtricitabina (emtriva)	23	,8
Maraviroc	21	,7
Tipranavir	14	,5
Elvitegravir	15	,5
Indinavir (crixivan)	14	,4
Saquinavir (invirase)	9	,3
Enfuvirtide (fuzeon)	8	,3
Estavudina	9	,3
Atazanavir (reyataz)	6	,2
Delavirdina	6	,2
Etravirina	1	,0
Fosamprenavir	0	,0
Total	3074	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		403
No aplica		416
Total		819

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 313
¿HA TENIDO EFECTOS ADVERSOS POR LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	730	21,2
No	2717	78,8
Total	3447	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		30
No aplica		416
Total		446

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 314
¿QUÉ HIZO CUANDO SE PRESENTARON EFECTOS?

	Frecuencia	Porcentaje
Consultó a su médico en el servicio de salud	484	67,5
Consultó a otro médico particular	43	6,0
Acudió a la ONG	6	,9
Acudió a un amigo o pariente	8	1,1
Acudió al educador o consejero del servicio de salud	15	2,1
Otros	11	1,5
Suspendió la terapia sin consultar con nadie	19	2,6
No hizo nada	130	18,2
Total	716	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		14
No aplica		3163
Total		3177

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


Cuadro # 315
¿QUÉ CONSECUENCIAS TUVO LA CONSULTA?

	Frecuencia	Porcentaje
Le cambiaron el esquema de tratamiento antirretroviral	93	17,2
Le mantuvieron el esquema de tratamiento antirretroviral	449	82,8
Total	542	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		25
No aplica		3326
Total		3351

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

GRÁFICO # 18
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA
LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Existe un 17,7% de las personas entrevistadas que afirma haber suspendido por decisión propia la terapia antirretroviral en los doce últimos meses (ver cuadro # 316 y gráfico # 18).


La adherencia al tratamiento antirretroviral resulta superior en Costa Rica, mientras que el nivel más bajo corresponde a Belice (ver cuadro # 317). Del mismo modo, la adherencia es superior entre las personas con 24 años o más (ver cuadro # 318).

La tendencia a suspender la terapia es un poco más marcada entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 319), las personas con peor perspectiva de futuro (ver cuadro # 320), las que tiene peores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 321), las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 322) y los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 323), las que más han sufrido victimización (ver cuadro # 324), las que menos alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 325), las de menor edad (ver cuadro # 326), las que no saben leer y escribir (ver cuadro # 327), las que no profesan ninguna religión (ver cuadro # 328), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 329), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 330) y las que laboran sin remuneración (ver cuadro # 331).

El análisis de regresión para determinar el modelo explicativo de la adherencia muestra un modelo de predicción con un 82,2% de clasificación correcta. El modelo identifica 12 variables predictoras en orden de importancia: lugar de entrevista, el tiempo desde que recibió su diagnóstico de VIH, si recibió consejería al momento del examen de VIH, si no ha tenido problemas de salud en los últimos tres meses, la percepción de los medicamentos antirretrovirales, el consumo de alcohol y otras drogas, la edad, el nivel educativo, la frecuencia con que asiste al culto de su iglesia, si ha cambiado de residencia desde el diagnóstico, el nivel de uso del condón y la perspectiva de futuro (ver cuadro # 332).

Las principales razones para suspender el tratamiento se relacionan con los efectos secundarios asociados, el fallar a las citas médicas y el cansancio (ver cuadro # 333).

GRÁFICO # 19
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Por otra parte, existe un 19% de las personas entrevistadas que afirma haber olvidado retirar sus medicamentos del centro de salud (ver cuadro # 334 y gráfico # 19).

Este olvido resulta más alto para Belice y más bajo para Costa Rica (ver cuadro # 335). También se concentra más entre las personas entrevistadas en los servicios de salud o entre otros lugares visitados en Belice (ver cuadro # 336), las que poseen peor perspectiva de futuro (ver cuadro # 337), los hombres que tienen sexo tanto con hombres como con mujeres (ver cuadro # 338), las que tiene peores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 339), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 340), las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 341) y de los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 342), las que más han sufrido victimización (ver cuadro # 343), las que más alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 344), las de menor edad (ver cuadro # 345), las que tienen menor nivel educativo (ver cuadro # 346), las mormonas (ver cuadro # 347), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 348), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 349), las separadas y divorciadas (ver cuadro # 350) y las que trabajan sin remuneración (ver cuadro # 351).

GRÁFICO # 20
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS
MEDICAMENTOS RETROVIRALES?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Por otra parte, a un 9,7% de las personas le han dejado de suministrar sus medicamentos en el centro de salud (ver cuadro # 351 y gráfico # 20).

El desabastecimiento es más marcado en Panamá y menos en Honduras (ver cuadro # 353).

La falencia es más frecuente entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 354), las personas con peor perspectiva de futuro (ver cuadro # 355), los hombres que tienen sexo tanto con hombres como con mujeres (ver cuadro # 356), las que peor perciben los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 357), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 358), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 359), las adventistas (ver cuadro # 360), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 361), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 362) y las pensionadas o que viven de las rentas (ver cuadro # 363).

Cuadro # 316
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	612	17,7
No	2856	82,3
Total	3468	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		9
No aplica		416
Total		425

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 317
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL? SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	26,1	11,1	16,7	19,4	25,4	12,4	17,6
No	73,9	88,9	83,3	80,6	74,6	87,6	82,4
$\chi^2 = 35,411$ $\alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 318
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN GRUPOS DE
EDAD CON 24 AÑOS COMO SEPARADOR

	Menores de 24 años	24 años o más	Total
Sí	23,6	17,3	17,7
No	76,4	82,7	82,3
$\chi^2 = 5,394 \quad \alpha = ,020$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 319
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Sí	22,3	14,1	30,2	17,6
No	77,7	85,9	69,8	82,4
$\chi^2 = 44,686 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 320
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	24,2	22,3	19,4	16,3	17,6
No	75,8	77,7	80,6	83,7	82,4
$\chi^2 = 14,832 \quad \alpha = ,002$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 321
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	14,0	22,4	17,1	15,9	17,6
No	86,0	77,6	82,9	84,1	82,4
$\chi^2 = 14,791 \quad \alpha = ,002$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 322
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	11,4	17,7	21,0	37,5	25,0	17,7
No	88,6	82,3	79,0	62,5	75,0	82,3
$\chi^2 = 58,522 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 323
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	1,00	2,00	3,00	4,00	Total
Sí	17,9	26,0	19,8	16,0	17,6
No	82,1	74,0	80,2	84,0	82,4
$\chi^2 = 24,256 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 324
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN VICTIMIZACIÓN

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	15,5	19,5	28,6	17,9	17,6
No	84,5	80,5	71,4	82,1	82,4
$\chi^2 = 30,848 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 325
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	15,0	24,5	35,5	50,0	17,6
No	85,0	75,5	64,5	50,0	82,4
$\chi^2 = 62,884 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 326
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	22,2	21,0	17,9	12,6	10,4	17,7
No	77,8	79,0	82,1	87,4	89,6	82,3
$\chi^2 = 32,026 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 327
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	17,0	23,0	17,7
No	83,0	77,0	82,3
$\chi^2 = 8,994 \quad \alpha = ,003$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 328
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	14,4	17,9	20,0	13,2	12,0	22,9	23,4	17,6
No	85,6	82,1	80,0	86,8	88,0	77,1	76,6	82,4
$\chi^2 = 27,792 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 329
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	14,8	17,9	13,5	21,3	16,0
No	85,2	82,1	86,5	78,7	84,0
$\chi^2 = 12,160 \quad \alpha = ,007$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 330
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	26,2	15,7	17,7
No	73,8	84,3	82,3
$\chi^2 = 39,929 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 331
¿HA SUSPENDIDO POR DECISIÓN PROPIA LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	44,8	12,3	15,5	19,4	15,3	16,8	29,4	16,2
No	55,2	87,7	84,5	80,6	84,7	83,2	70,6	83,8
$\chi^2 = 22,704 \quad \alpha = ,001$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 332
ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA LA ADHERENCIA

Porcentaje de clasificación correcta	82,3%
VARIABLES EN LA ECUACIÓN	Peso (β)
Lugar de entrevistas	0,357
Tiempo desde que recibió diagnóstico de VIH	0,112
Recibió consejería al momento del examen de VIH	0,096
Ha tenido problemas de salud en los últimos tres meses	-0,644
Percepción de los medicamentos antirretrovirales	0,008
Consumo de alcohol y/o drogas	-0,020
Edad	0,295
Nivel educativo	0,107
Frecuencia con que asiste al culto de su iglesia	-0,088
Ha cambiado su residencia desde el diagnóstico	-0,568
Uso del condón	0,010
Perspectiva de futuro	0,004

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 333
¿POR QUÉ HA DEJADO DE TOMAR SU MEDICAMENTO?
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Causan efectos secundarios	189	31,7
He faltado a mis citas médicas	129	21,8
Por cansancio	128	21,5
Es difícil recordar	119	20,1
Es difícil / complicado tomarlo	67	11,3
Por el costo	30	5,1
Por recomendación de mi iglesia	10	1,7
Otro	118	19,9
Total	594	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		18
No aplica		3281
Total		3299

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 334
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	657	19,0
No	2803	81,0
Total	3460	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		17
No aplica		416
Total		433

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 335
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	55,9	8,6	13,4	19,5	30,1	21,7	18,9
No	44,1	91,4	86,6	80,5	69,9	78,3	81,1
$\chi^2 = 146,540 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 336
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Sí	24,6	14,1	57,4	19,0
No	75,4	85,9	42,6	81,0
$\chi^2 = 111,838 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 337
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	20,8	25,7	16,6	18,7	19,0
No	79,2	74,3	83,4	81,3	81,0
$\chi^2 = 8,422 \quad \alpha = ,038$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 338
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	21,4	16,7	29,5	17,2	16,6	18,7
No	78,6	83,3	70,5	82,8	83,4	81,3
$\chi^2 = 11,847 \quad \alpha = ,019$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 339
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	28,6	22,7	18,7	17,1	19,0
No	71,4	77,3	81,3	82,9	81,0
$\chi^2 = 12,787 \quad \alpha = ,005$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 340
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 0 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	13,3	7,1	17,6	17,7	21,2	19,6	18,2	18,9
No	86,7	92,9	82,4	82,3	78,8	80,4	81,8	81,1
$\chi^2 = 14,181 \quad \alpha = ,028$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 341
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	14,4	18,8	22,4	27,5	22,2	19,0
No	85,6	81,2	77,6	72,5	77,8	81,0
$\chi^2 = 23,716 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 342
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	1,00	2,00	3,00	4,00	Total
Sí	26,9	24,7	26,2	16,8	19,0
No	73,1	75,3	73,8	83,2	81,0
$\chi^2 = 33,247 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 343
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN VICTIMIZACIÓN

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	14,4	24,1	37,3	25,0	19,0
No	85,6	75,9	62,7	75,0	81,0
$\chi^2 = 104,213 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 344
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	15,5	28,3	42,1	50,0	19,0
No	84,5	71,7	57,9	50,0	81,0
$\chi^2 = 104,015$ $\alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 345
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Si	21,6	20,1	20,4	16,1	11,1	19,0
No	78,4	79,9	79,6	83,9	88,9	81,0
$\chi^2 = 14,151$ $\alpha = ,007$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 346
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Si	20,0	26,9	14,9	17,1	24,6	15,9	21,2	23,7	9,1	18,8
No	80,0	73,1	85,1	82,9	75,4	84,1	78,8	76,3	90,9	81,2
$\chi^2 = 31,440$ $\alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 347
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Si	16,3	16,3	20,0	22,6	29,2	29,2	26,9	18,8
No	83,7	83,7	80,0	77,4	70,8	70,8	73,1	81,2
$\chi^2 = 45,873$ $\alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 348
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	14,2	17,9	17,9	23,7	16,7
No	85,8	82,1	82,1	76,3	83,3
$\chi^2 = 18,890 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 349
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	24,5	17,6	18,8
No	75,5	82,4	81,2
$\chi^2 = 16,415 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 350
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	18,9	19,2	22,9	11,2	18,8
No	81,1	80,8	77,1	88,8	81,2
$\chi^2 = 9,184 \quad \alpha = ,027$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 351
¿HA OLVIDADO RETIRAR SUS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	41,4	18,2	22,3	21,6	14,6	18,0	29,4	19,0
No	58,6	81,8	77,7	78,4	85,4	82,0	70,6	81,0
$\chi^2 = 21,981 \quad \alpha = ,001$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 352
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	335	9,7
No	3115	90,3
Total	3450	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		27
No aplica		416
Total		443

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 353
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	6,6	7,1	5,7	3,2	22,3	30,5	9,7
No	93,4	92,9	94,3	96,8	77,7	69,5	90,3
$\chi^2 = 369,061 \quad \alpha = ,000$							

Cuadro # 354
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Si	14,7	6,3	7,7	9,7
No	85,3	93,7	92,3	90,3
$\chi^2 = 65,592 \quad \alpha = ,000$				

Cuadro # 355
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	13,5	13,3	7,9	9,4	9,7
No	86,5	86,7	92,1	90,6	90,3
$\chi^2 = 9,231 \quad \alpha = ,026$					



Cuadro # 356
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	12,3	8,3	20,5	10,0	9,5	10,9
No	87,7	91,7	79,5	90,0	90,5	89,1
$\chi^2 = 11,436 \quad \alpha = ,022$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 357
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	14,3	20,0	10,8	8,0	9,7
No	85,7	80,0	89,2	92,0	90,3
$\chi^2 = 55,688 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 358
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	10,3	5,6	9,7
No	89,7	94,4	90,3
$\chi^2 = 8,766 \quad \alpha = ,003$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 359
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	8,0	6,0	5,2	7,3	14,1	12,3	16,1	14,6	9,1	10,3
NO	92,0	94,0	94,8	92,7	85,9	87,7	83,9	85,4	90,9	89,7
$\chi^2 = 50,131 \quad \alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 360
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	12,7	6,5	7,8	23,1	9,1	16,7	8,3	9,7
No	87,3	93,5	92,2	76,9	90,9	83,3	91,7	90,3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 361
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	7,1	11,5	12,7	16,7	10,1
No	92,9	88,5	87,3	83,3	89,9
$\chi^2 = 33,146 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 362
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS
MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE
RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	13,4	8,9	9,7
No	86,6	91,1	90,3
$\chi^2 = 12,006 \quad \alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 363
¿LE HAN DEJADO DE SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Si	9,9	14,1	10,5	14,7	14,3	6,4	10,5	9,6
No	90,1	85,9	89,5	85,3	85,7	93,6	89,5	90,4
$\chi^2 = 17,036 \quad \alpha = ,009$								


Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES

El 80,1% de las personas entrevistadas considera que si se toma los medicamentos antirretrovirales la persona se enfermará menos (ver cuadro # 364). Un 75,3% opina que quien toma los medicamentos vivirá más tiempo que si no los tomara (ver cuadro # 365).

Un 50,9% de las personas opina que existirán menos posibilidades de transmitir el VIH si se toma el medicamento, mientras que un 32,8% cree que las mismas se mantendrán igual (ver cuadro # 366).

GRÁFICO # 21
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO



Si se combinan las tres preguntas anteriores en un indicador sobre percepción de los medicamentos antirretrovirales se obtiene un promedio positivo con un valor de 82,5 y una variabilidad relativamente baja, con una desviación estándar de 18,8 (ver cuadro # 367). Efectivamente, un 72,3% de las personas muestran un puntaje muy alto en este indicador (ver cuadro # 368).

La percepción muestra el nivel más alto para Honduras y el más bajo para Costa Rica (ver cuadro # 369). Del mismo modo, los promedios más altos corresponden a las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 370), las personas con mejor perspectiva de futuro (ver cuadro # 371), las que tienen mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 372), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 373), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 374), entre las que están actualmente tomando antirretrovirales (ver cuadro # 375), las que menos han sufrido victimización (ver cuadro # 376), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 377), las de mayor edad (ver cuadro # 378), las personas con identidad de género femenino (ver cuadro # 379), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 380), las cristianas evangélicas (ver cuadro # 381), las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 382), las que viven con su pareja (ver cuadro # 383) y las que estudian y trabajan (ver cuadro # 384).

Cuadro #364
¿SE ENFERMA MENOS, IGUAL O MÁS QUE SI NO TOMARA LOS ARTV?

	Frecuencia	Porcentaje
Se enferma menos	3099	80,1
Se enferma igual	463	12,0
Se enferma más	158	4,1
No sabe	149	3,9
Total	3870	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		23

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #365
¿VIVE MENOS, IGUAL O MÁS TIEMPO QUE SI NO LOS TOMARA?

	Frecuencia	Porcentaje
Vive menos	138	3,6
Vive igual	652	16,8
Vive más	2919	75,3
No sabe	169	4,4
Total	3877	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		16

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #366
¿TIENE MENOS, IGUAL O MÁS PROBABILIDAD DE TRANSMITIR EL VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Menos probabilidad	1961	50,9
Igual probabilidad	1265	32,8
Más probabilidad	97	2,5
No sabe	533	13,8
Total	3856	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		37

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #367
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	,00	100,00	82,4793	18,81638

Cuadro #368
PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	Frecuencia	Porcentaje
Muy baja	29	,7
Media baja	494	12,7
Media alta	556	14,3
Muy alta	2814	72,3
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #369
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGUN
PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
Belice	131	74,0501	18,52497
Costa Rica	250	71,3742	26,65685
El Salvador	1263	83,9277	16,82844
Honduras	1328	84,8550	17,85762
Nicaragua	358	81,0476	18,99638
Panamá	562	81,4394	18,63893
Total	3893	82,4793	18,81638
F = 30,296 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #370
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	N	Media	Desv, tip,
Servicio de Salud	1595	80,0345	19,61974
Visita domiciliar	2226	84,3762	18,00822
t = -6,978 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #371
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	316	72,0036	20,35229
Media baja	259	77,8374	19,20135
Media alta	462	82,1935	17,27932
Muy alta	2857	84,1052	18,40273
Total	3893	82,4793	18,81638
F = 46,642 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #372
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGÚN
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	64	78,9264	17,97061
Medio bajo	854	77,2990	19,66851
Medio alto	1397	82,7841	17,91249
Muy alto	1578	85,1577	18,58200
Total	3893	82,4793	18,81638
F = 33,968 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #373
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO
DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Menos de 1 mes	47	69,4813	18,59015
De 1 a 5 meses	159	79,0782	19,77218
De 6 a 11 meses	134	76,8767	20,06539
De 1 o 2 años	530	79,3939	19,60825
De 3 a 5 años	901	81,1072	19,90024
De 5 a 10 años	1231	83,9104	18,11300
Más de 10 años	871	86,1559	16,51794
Total	3873	82,5293	18,78888
F = 16,926 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #374
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGÚN
PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv, tip,
Muy bueno	909	86,2814	17,89204
Bueno	1711	82,5730	18,30658
Estable	1111	80,0630	19,50663
Malo	131	77,1994	20,32855
Muy malo	12	77,1111	17,02993
Total	3873	82,5244	18,78461
F = 17,013 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #375
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGÚN SI ACTUALMENTE
ESTÁ TOMANDO ANTIRRETROVIRALES

	N	Media	Desv, tip,
Sí	3477	83,3463	18,47744
No	412	75,2817	20,03354
Total	3889	82,4923	18,81011
F = 68,864 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #376
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGÚN VICTIMIZACIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	2406	84,6828	17,79386
Media baja	1122	80,4033	19,06612
Media alta	329	74,8233	21,81827
Muy alta	36	69,9480	17,99795
Total	3893	82,4793	18,81638
F = 40,226 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #377
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGUN
SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, tip,
Sí	1812	83,9207	18,33898
No	2077	81,2628	19,08802
t = 4,424 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #378
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES SEGÚN
EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
25 o menos	435	79,2770	18,93824
De 26 a 35	1174	82,4863	19,02127
De 36 a 45	1271	83,0550	17,95896
De 46 a 60	841	83,0395	19,65753
Más de 60	164	83,8519	18,53662
Total	3884	82,4906	18,82014
F = 3,858 $\alpha = ,004$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #379
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv, tip,
Femenino	1891	84,4546	17,75557
Masculino	1925	80,6796	19,61731
Mujer trans	44	82,8729	15,80859
Hombre trans	33	73,7772	21,52152
Total	3893	82,4793	18,81638

F = 15,361 $\alpha = ,000$

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #380
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	N	Media	Desv, tip,
No asistió a la escuela	27	82,3898	22,99684
Alfabetizada	72	82,7360	16,07713
Primaria incompleta	719	83,2897	17,85775
Primaria completa	694	85,3950	17,98572
Secundaria incompleta	701	80,1505	19,03723
Secundaria completa	738	81,5237	19,75759
Universitaria incompleta	286	81,7510	20,18625
Universitaria completa	151	82,7327	19,11925
Post grado universitario	12	89,4129	18,73893
Total	3399	82,5363	18,89154
F = 4,079 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #381
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN RELIGIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Católica	1519	81,9366	19,49895
Cristiana Evangélica	1343	84,9575	17,52685
Testigo de Jehová	60	80,8255	17,17938
Adventista	59	75,5918	21,16833
Mormón/a	25	81,7945	14,86663
Otra	52	84,2925	17,36668
Ninguna	817	80,2407	19,11429
Total	3874	82,5429	18,78844
F = 7,587 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #382
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip,
Al menos una vez por semana	1495	84,6048	17,88467
Una, dos o tres veces al mes	643	84,3599	18,10925
Menos de una vez por mes	494	81,3024	19,62108
Nunca	389	78,1121	20,19370
Total	3020	83,1770	18,66466
F = 15,188 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #383
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN ESTADO CIVIL

	N	Media	Desv, tip,
Soltero/a	1897	81,4645	19,35609
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	83,9754	18,36260
Separado/a o divorciado/a	147	79,1222	17,74489
Viudo/a	204	82,8508	17,15838
Total	3872	82,5016	18,81712
F = 6,875 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


Cuadro #384
PERCEPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	N	Media	Desv, tip,
Solo trabaja	1612	82,3928	18,37860
Estudia y trabaja	116	84,2431	17,50134
Está desempleado	1026	82,0834	19,37538
Es pensionado o rentista	99	78,1045	22,42266
Solo estudia	103	78,2052	18,65738
Solo se dedica a tareas del hogar	850	84,2020	18,15591
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	82,8588	21,48073
Total	3871	82,5504	18,78121
F = 3,236 $\alpha = ,004$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

EXÁMENES DE LABORATORIO

GRÁFICO # 22
¿SE HA REALIZADO
EL EXAMEN DE CD4?




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 84,3% de las personas entrevistadas se ha realizado el examen de CD4 en los últimos 12 meses (ver cuadro # 385 y gráfico # 22).

La proporción de personas que se han realizado este examen resulta superior para Costa Rica, mientras que muestra el nivel más bajo en Nicaragua (ver cuadro # 386). También es superior la proporción de gente que se ha practicado el examen entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 387), las que tienen mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 388), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 389), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 390), las que mejor perciben los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 391), las que menos alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 392), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 393), las de mayor edad (ver cuadro # 394), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 396), las mormonas (ver cuadro # 397), las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 398) y , las que estudian y trabajan (ver cuadro # 399).

Sin embargo, un 41,7% de las personas afirma no conocer los resultados del último examen de CD4 que se realizara (ver cuadro # 400). Entre aquellas personas que si lo recuerdan la variabilidad del recuento es importante, pero sobresalen aquellas personas con valores entre 501 y 750 (ver cuadro # 401).

GRÁFICO # 23
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN
DE CARGA VIRAL?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

En lo que respecta al examen de carga viral, también esalta la proporción de personas que se lo ha realizado en los últimos doce meses (ver cuadro # 402 y gráfico # 23).

Este examen se ha realizado con mayor frecuencia en El Salvador, mientras que Belice muestra el nivel más bajo (ver cuadro # 403).

La proporción de personas que se han hecho el examen resulta mayor entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 404), las mujeres que tienen sexo que solo tienen sexo con hombres (ver cuadro # 405) y los hombres que tienen sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver cuadro # 406), las personas que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 407), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 408), las que muestran el nivel más bajo de percepción del medicamento antirretroviral (ver cuadro # 409), las que menos alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 410), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 411), las de mayor edad (ver cuadro # 412), las cristianas evangélicas (ver cuadro # 413), las que asisten con mayor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 414) y las pensionadas o que viven de las rentas (ver cuadro # 415).

Un 52,5% de las personas afirma desconocer los resultados de dicho examen (ver cuadro # 416). Entre las que sí están informadas, en la mayoría de los casos (75,1%) el resultado mostró que la carga era indetectable (ver cuadro # 417).

Cuadro #385
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3250	84,3
No	606	15,7
Total	3857	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		36

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #386
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	86,8	92,7	90,8	82,5	71,7	77,7	84,3
No	13,2	7,3	9,2	17,5	28,3	22,3	15,7
$\chi^2 = 117,431 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #387
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Si	81,5	86,0	92,9	84,3
No	18,5	14,0	7,1	15,7
$\chi^2 = 17,774 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #388
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	84,4	79,1	85,4	86,1	84,3
No	15,6	20,9	14,6	13,9	15,7
$\chi^2 = 22,301 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #389
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 10 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	48,9	71,6	82,6	81,2	81,2	86,7	90,2	84,3
No	51,1	28,4	17,4	18,8	18,8	13,3	9,8	15,7
$\chi^2 = 99,863 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #390
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	89,0	85,2	80,9	71,9	72,7	84,3
No	11,0	14,8	19,1	28,1	27,3	15,7
$\chi^2 = 41,572 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #391
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	85,7	73,3	84,5	86,1	84,3
No	14,3	26,7	15,5	13,9	15,7
$\chi^2 = 50,871 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #392
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	86,1	80,4	73,8		84,3
No	13,9	19,6	26,2	100,0	15,7
$\chi^2 = 41,050 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #393
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	85,4	83,3	84,3
No	14,6	16,7	15,7
$\chi^2 = 3,303 \quad \alpha = ,049$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #394
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	78,1	82,2	85,7	87,3	90,6	84,3
No	21,9	17,8	14,3	12,7	9,4	15,7
$\chi^2 = 28,716 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #395
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	84,8	81,1	84,4
No	15,2	18,9	15,6
$\chi^2 = 4,247 \quad \alpha = ,039$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #396
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	88,9	73,6	85,0	82,1	83,7	86,5	87,8	92,1	91,7	84,8
No	11,1	26,4	15,0	17,9	16,3	13,5	12,2	7,9	8,3	15,2
$\chi^2 = 22,051 \quad \alpha = ,005$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #397
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	85,8	86,5	76,7	83,1	92,0	78,4	78,8	84,3
No	14,2	13,5	23,3	16,9	8,0	21,6	21,2	15,7
$\chi^2 = 31,562 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #398
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	87,6	87,3	79,6	83,9	85,8
No	12,4	12,7	20,4	16,1	14,2
$\chi^2 = 21,836 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #399
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CD4 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Sí	85,4	88,0	80,7	82,8	83,2	86,6	79,7	84,3
No	14,6	12,0	19,3	17,2	16,8	13,4	20,3	15,7
$\chi^2 = 17,488 \quad \alpha = ,008$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #400
¿CONOCE LOS RESULTADOS DE SU ÚLTIMO EXAMEN DE CD4?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1884	58,3
No	1345	41,7
Total	3229	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		22
No aplica		643
Total		664

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #401
¿CUÁNTO FUE RECUENTO DE CD4?

	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 100	89	4,8
De 101 a 300	270	14,5
De 301 a 500	492	26,4
De 501 a 750	605	32,5
De 750 a 1000	305	16,4
Más de 1000	101	5,4
Total	1862	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		22
No aplica		2009
Total		2031

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #402
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2994	78,1
No	841	21,9
Total	3835	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		58

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #403
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	32,3	93,4	90,2	70,1	71,6	77,9	78,1
No	67,7	6,6	9,8	29,9	28,4	22,1	21,9
$\chi^2 = 352,113 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #404
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Sí	78,9	79,0	28,6	78,1
No	21,1	21,0	71,4	21,9
$\chi^2 = 102,045 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #405
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	79,1	68,4	71,4	33,3	68,2	78,6
No	20,9	31,6	28,6	66,7	31,8	21,4
$\chi^2 = 10,348 \quad \alpha = ,035$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #406
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	81,6	75,8	78,6	82,7	75,2	77,8
No	18,4	24,2	21,4	17,3	24,8	22,2
$\chi^2 = 9,588 \quad \alpha = ,048$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #407
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 a 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	39,5	66,5	76,5	74,6	77,1	80,6	82,1	78,1
No	60,5	33,5	23,5	25,4	22,9	19,4	17,9	21,9
$\chi^2 = 66,780 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #408
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	81,7	78,5	75,5	69,3	75,0	78,1
No	18,3	21,5	24,5	30,7	25,0	21,9
$\chi^2 = 17,360 \quad \alpha = ,002$						

Cuadro #409
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	89,3	69,5	77,0	79,7	78,1
No	10,7	30,5	23,0	20,3	21,9
$\chi^2 = 26,867 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #410
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	80,7	72,7	58,3		78,0
No	19,3	27,3	41,7	100,0	22,0
$\chi^2 = 70,785 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #411
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Total
Sí	79,6	76,6	78,0
No	20,4	23,4	22,0
$\chi^2 = 5,008 \quad \alpha = ,025$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #412
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	72,7	75,3	78,9	82,0	86,5	78,1
No	27,3	24,7	21,1	18,0	13,5	21,9
$\chi^2 = 17,360 \quad \alpha = ,002$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 413
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	79,2	80,8	74,6	62,1	69,2	63,5	74,4	78,1
No	20,8	19,2	25,4	37,9	30,8	36,5	25,6	21,9
$\chi^2 = 29,857 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #414
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	80,7	80,5	76,7	74,8	79,2
No	19,3	19,5	23,3	25,2	20,8
$\chi^2 = 9,031 \quad \alpha = ,029$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #415
¿SE HA REALIZADO EL EXAMEN DE CARGA VIRAL?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Sí	79,5	80,2	71,0	85,9	76,5	82,7	78,1	78,0
No	20,5	19,8	29,0	14,1	23,5	17,3	21,9	22,0
$\chi^2 = 45,589 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #416
¿CONOCE LOS RESULTADOS DE SU ÚLTIMO EXAMEN DE CARGA VIRAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1407	47,5
No	1556	52,5
Total	2962	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		32
No aplica		899
Total		931

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #417
¿CUÁL FUE EL RECUENTO DE CARGA VIRAL?


	Frecuencia	Porcentaje
Indetectable	1056	75,1
Menos de 10000	242	17,2
Más de 10000	109	7,7
Total	1407	100,0
Personas fuera del análisis		
No Aplica		2486

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

GRÁFICO # 24
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA
PREVENIR LA TUBERCULOSIS?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 58,4% de las personas entrevistadas afirma que no ha recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis (ver cuadro # 418 y gráfico # 24).

Esta situación es más marcada en Costa Rica, mientras que resulta mejor para Nicaragua (ver cuadro # 419).

Del mismo modo, el tratamiento resulta menos frecuente entre los hombres que tienen sexo solo con hombres (ver cuadro # 420), las personas que tiene mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 421), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 422), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 423), las que peor perciben los medicamentos antirretrovirales (ver cuadro # 424), las de menor edad (ver cuadro # 425), las personas con identidad de género masculino (ver cuadro # 426), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 427), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 428), las adventistas (ver cuadro # 429), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 430), las que no han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 431), las viudas (ver cuadro # 432), las pensionadas o que viven de las rentas (ver cuadro # 433), entre los patronos con menos de 10 empleados (ver cuadro # 435) y entre las que no han tenido con anterioridad tuberculosis (ver cuadro # 436).

Un 12,6% de las personas entrevistadas ha tenido tuberculosis (ver cuadro # 437), de las cuales, el 95,6% ha recibido tratamiento para curarla (ver cuadro # 438).

Cuadro #418
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1593	41,6
No	2232	58,4
Total	3825	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		68

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #419
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	33,6	10,7	69,5	27,1	62,7	16,3	41,6
No	66,4	89,3	30,5	72,9	37,3	83,7	58,4
$\chi^2 = 821,646 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #420
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	27,4	35,4	37,1	47,5	43,3	38,0
No	72,6	64,6	62,9	52,5	56,7	62,0
$\chi^2 = 40,259 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 421
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	56,7	40,2	48,2	36,0	41,6
No	43,3	59,8	51,8	64,0	58,4
$\chi^2 = 52,160 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 422
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 0 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	20,5	22,9	33,6	34,6	42,6	47,9	41,7	41,6
No	79,5	77,1	66,4	65,4	57,4	52,1	58,3	58,4
$\chi^2 = 68,133 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 423
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Si	36,3	45,9	40,1	32,5	75,0	41,7
No	63,6	54,1	59,9	67,5	25,0	58,3
$\chi^2 = 36,911 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 424
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN PERCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO ANTIRRETROVIRAL

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	27,6	34,3	38,0	43,8	41,6
No	72,4	65,7	62,0	56,2	58,3
$\chi^2 = 27,812 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #425
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	32,2	43,5	42,9	41,0	45,8	41,6
No	67,8	56,5	57,1	59,0	54,2	58,4
$\chi^2 = 43,625 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #426
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	44,6	38,3	57,1	45,2	41,6
No	55,4	61,7	42,9	54,8	58,3
$\chi^2 = 110,463 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #427
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	40,3	51,1	41,6
No	59,7	48,9	58,4
$\chi^2 = 18,850 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #428
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	48,1	47,2	54,9	40,9	35,7	34,1	30,2	36,5	27,3	40,3
No	51,9	52,8	45,1	59,1	64,3	65,9	69,8	63,5	72,7	59,6
$\chi^2 = 219,548 \quad \alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #429
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	37,5	43,7	30,5	26,3	30,8	52,9	46,9	41,5
No	62,5	56,3	69,5	73,7	69,2	47,1	53,1	58,4
$\chi^2 = 35,965$ $\alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #430
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	46,6	39,3	28,5	29,8	39,9
No	53,4	60,7	71,5	70,2	60,1
$\chi^2 = 69,962$ $\alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #431
**¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA
 PREVENIR LA TUBERCULOSIS?**
**SEGUN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE
 RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO**

	Sí	No	Total
Sí	44,0	41,0	41,6
No	56,0	59,0	58,4
$\chi^2 = 6,509$ $\alpha = ,039$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #432
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	43,4	40,5	40,3	36,0	41,7
No	56,6	59,5	59,7	64,0	58,3
$\chi^2 = 32,426$ $\alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #433
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Si	43,7	27,0	36,0	22,7	34,0	49,8	39,1	41,6
No	56,3	37,0	64,0	77,3	66,0	50,2	60,9	58,4
$\chi^2 = 97,700 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #434
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Directivo de la administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No Calificadas	Total
Si		9,1	43,1	33,8	45,5	59,6	40,1	42,1	42,8
No	100,0	90,9	56,9	66,2	54,5	40,4	59,9	57,9	57,2
$\chi^2 = 32,634 \quad \alpha = ,003$									

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 435
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	38,2	41,9	34,9	40,2	51,7	34,2	41,2	42,4
No	61,8	58,2	65,1	59,8	48,3	65,8	58,8	57,5
$\chi^2 = 47,823 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #436
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA
PREVENIR LA TUBERCULOSIS?
SEGÚN ¿SE HA ENFERMADO DE TUBERCULOSIS?

	Sí	No	Total
Sí	60,7	38,8	41,6
No	39,3	61,1	58,4
No sabe		0,0	0,0
$\chi^2 = 82,835 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #437
¿SE HA ENFERMADO DE TUBERCULOSIS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	488	12,6
No	3376	87,4
Total	3864	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		29

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #438
¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA CURAR LA TUBERCULOSIS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	460	95,6
No	21	4,4
Total	481	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		7
No aplica		3405
Total		3412

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

VICTIMIZACIÓN

Un 18,5% de las personas entrevistadas ha sufrido maltrato en los servicios de salud por ser una persona con VIH (ver cuadro # 439) y un 29,9% considera necesario ocultar que es una persona con VIH cuando recibe servicios médicos (ver cuadro # 440).


Por otra parte, al 17,8% le han obligado a realizarse el examen de VIH por razones de trabajo (ver cuadro # 441).

La mayoría (80,7%) afirma que en su familia saben que es una persona con VIH y en el 87 % de los casos le apoyaron al enterarse (ver cuadro # 442) y el 79,7% dice contar con alguien que le pueda acompañar al médico o a un hospital (ver cuadro # 445).

Un 51,9% de las personas afirma que necesita ocultar que es una persona con VIH cuando busca trabajo (ver cuadro # 444).

El 75,2% de las personas dice que denunciaría un acto de violación a sus derechos (ver cuadro # 446). Entre aquellas personas que no lo harían, la principal razón de su actitud consiste en la sensación de que no cambiaría nada con hacerlo o que al hacerlo revelaría su condición (ver cuadro # 447).

GRÁFICO # 25
NIVELES DE VICTIMIZACIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Si se combinan las diferentes preguntas de esta sección en un indicador sobre victimización, se obtiene un promedio relativamente bajo de 24,7 en una escala de 0 a 100. Sin embargo, la desviación estándar (19,5) es bastante alta, por lo que parecieran existir diferencias importantes en el nivel de victimización entre las personas entrevistadas (ver cuadro # 448).

La mayoría de las personas reportan un nivel muy bajo de victimización, pero existe un 8,5% que señala niveles moderadamente altos y un 0,9% muy altos (ver cuadro # 449 y gráfico # 25).

El nivel de victimización muestra el nivel más alto en Belice y el más bajo en El Salvador (ver cuadro # 450).

La victimización resulta superior entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 451), los hombres que tienen sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver cuadro # 452), las personas que tiene conocimientos sobre VIH medio bajos (ver cuadro # 453), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 454), las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 455), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 456), las de menor edad (ver cuadro # 457), las mujeres trans (ver cuadro # 458), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 459), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 460), las mormonas (ver cuadro # 461), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 462), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 463), las separadas o divorciadas (ver cuadro # 464), las mormonas, las que estudian y trabajan (ver cuadro # 465) y las que trabajan en servicio doméstico (ver cuadro # 466).

Cuadro # 439
¿VÍCTIMA DE MALTRATO EN SERVICIOS DE SALUD POR SER PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	716	18,5
No	3153	81,5
Total	3869	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		24

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #440
¿CONSIDERA NECESARIO OCULTAR QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1140	29,9
No	2671	70,0
No sabe	3	,1
Total	3814	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		79

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #441
POR TRABAJO, ¿LE HAN OBLIGADO A REALIZARSE EXAMEN DE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	676	17,8
No	3114	82,2
Total	3790	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		103

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #442
¿SU FAMILIA SABE QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3110	80,7
No	743	19,3
Total	3852	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		41

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 443
¿QUÉ HIZO SU FAMILIA CUANDO SE ENTERÓ DE SU DIAGNÓSTICO?

	Frecuencia	Porcentaje
Me apoyaron	2670	87,0
Me rechazaron	238	7,7
Me abandonaron	43	1,4
Me expulsaron del hogar	43	1,4
Otros	76	2,5
Total	3070	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		40
No aplica		783
Total		823

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #444
¿NECESIDAD DE OCULTAR QUE ES PERSONA CON VIH AL BUSCAR TRABAJO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1953	51,9
No	1810	48,1
Total	3763	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		130

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #445
¿ALGUIEN QUE LE PUEDA ACOMPAÑAR AL MÉDICO O A UN HOSPITAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3053	79,7
No	779	20,3
Total	3831	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		62

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 446
¿DENUNCIARÍA USTED UN ACTO DE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2902	75,2
No	538	13,9
No sabe	417	10,8
Total	3857	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		36

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #447
¿POR QUÉ RAZÓN NO DENUNCIARÍA?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
No cambiaría nada con hacerlo	266	50,7
Se darían cuenta que soy una persona con vih	181	34,6
Para proteger a mi familia	87	16,6
No sabe cómo hacerlo	88	16,7
No tiene tiempo	68	12,9
Total	525	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		13
No aplica		3355
Total		3368

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #448
VICTIMIZACIÓN
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, tít,
3893	,00	93,75	24,7277	19,54322

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #449
VICTIMIZACIÓN

	Frecuencia	Porcentaje
Muy baja	2406	61,8
Media baja	1122	28,8
Media alta	329	8,5
Muy alta	36	,9
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 450
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
Belice	131	39,4187	20,66407
Costa Rica	250	29,5694	20,00350
El Salvador	1263	18,7277	16,31889
Honduras	1328	25,7400	20,35355
Nicaragua	358	31,4062	20,95953
Panamá	562	25,9677	18,42161
Total	3893	24,7277	19,54322
F = 54,800 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #451
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	N	Media	Desv, tip,
Servicio de Salud	1595	25,4548	19,65404
Visita domiciliar	2226	23,6526	19,17334
t = 2,835 $\alpha = ,005$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #452
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	N	Media	Desv, tip,
Solo practica el sexo con hombres	543	27,2241	19,02851
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	67	33,2739	19,75077
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	108	31,5182	20,67550
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	82	27,2969	19,57834
Solo practica el sexo con mujeres	979	24,9347	19,68677
Total	1779	26,4561	19,64763
F = 5,586 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 453
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	64	22,5364	21,42237
Medio bajo	854	27,3677	20,57020
Medio alto	1397	23,9202	19,60519
Muy alto	1578	24,1016	18,71422
Total	3893	24,7277	19,54322
F = 6,830 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #454
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE
QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Menos de 1 mes	47	27,7444	19,51946
De 1 a 5 meses	159	22,7792	17,57397
De 6 a 11 meses	134	27,6062	19,13788
De 1 o 2 años	530	26,8681	20,43736
De 3 a 5 años	901	26,6121	20,02824
De 5 a 10 años	1231	23,1514	19,54214
Más de 10 años	871	23,1612	18,40078
Total	3873	24,6616	19,51252
F = 5,709 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 455
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv, tip,
Muy bueno	909	23,4946	19,05267
Bueno	1711	23,9053	18,98771
Estable	1111	26,7153	20,59404
Malo	131	27,5519	19,88507
Muy malo	12	24,3241	18,83548
Total	3873	24,7393	19,54927
F = 5,237 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #456
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, tip,
Sí	1812	23,7617	18,40698
No	2077	25,5859	20,45589
t = -2,927 α = ,003			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 457
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
25 o menos	435	24,2976	18,19510
De 26 a 35	1174	27,0339	19,59266
De 36 a 45	1271	25,2017	20,17448
De 46 a 60	841	22,2908	19,18836
Más de 60	164	18,4911	16,72061
Total	3884	24,7415	19,54517
F = 11,891 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #458
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv, tip,
Femenino	1891	22,6910	18,99809
Masculino	1925	26,4134	19,76832
Mujer trans	44	34,1910	19,84394
Hombre trans	33	30,4772	23,15680
Total	3893	24,7277	19,54322
F = 16,204 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 459
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	N	Media	Desv, tip,
Si	3406	25,1168	19,56916
No	461	22,1356	19,32199
t = 3,073 α = ,002			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #460
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS**

	N	Media	Desv, tip,
No asistió a la escuela	27	17,5779	20,66483
Alfabetizada	72	21,7846	21,16925
Primaria incompleta	719	22,7985	19,90518
Primaria completa	694	24,3885	19,60351
Secundaria incompleta	701	27,4482	19,47926
Secundaria completa	738	25,6061	19,17593
Universitaria incompleta	286	26,6962	19,05434
Universitaria completa	151	26,6793	18,79518
Post grado universitario	12	18,1455	18,02613
Total	3399	25,1134	19,57607
F = 4,008 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #461
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN RELIGIÓN**

	N	Media	Desv, tip,
Católica	1519	24,7296	18,65785
Cristiana Evangélica	1343	22,5441	18,62316
Testigo de Jehová	60	30,8788	19,64461
Adventista	59	27,2181	17,67445
Mormón/a	25	34,4239	23,51726
Otra	52	26,2364	16,99035
Ninguna	817	26,9200	21,94007
Total	3874	24,6500	19,48663
F = 6,830 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 462
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip,
Al menos una vez por semana	1495	21,3286	17,89005
Una, dos o tres veces al mes	643	24,5681	18,70970
Menos de una vez por mes	494	26,6636	19,45845
Nunca	389	29,8752	19,28350
Total	3020	23,9905	18,74924
F = 27,035 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 463
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, tip,
Sí	720	29,9477	21,08097
No	3159	23,4721	18,96450
t = 7,576 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 464
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN ESTADO CIVIL

	N	Media	Desv, tip,
Soltero/a	1897	25,8093	19,76041
Casado/a, acompañado/a o union libre	1624	23,2143	18,46916
Separado/a o divorciado/a	147	32,2338	23,38012
Viudo/a	204	20,1259	20,07866
Total	3872	24,6659	19,51420
F = 16,393 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #465
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD**

	N	Media	Desv, tip,
Solo trabaja	1612	25,4414	19,64609
Estudia y trabaja	116	28,2535	19,33946
Está desempleado	1026	26,0188	19,83530
Es pensionado o rentista	99	25,1789	19,66820
Solo estudia	103	23,7728	18,33362
Solo se dedica a tareas del hogar	850	20,8486	18,42680
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	28,0324	20,96916
Total	3871	24,6616	19,51742
F = 7,767 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #466
VICTIMIZACIÓN
SEGÚN RELACIÓN LABORAL**

	N	Media	Desv, tip,
No remunerado	35	22,7107	20,66647
Empleado del Gobierno o Institución	172	24,2033	18,49071
Empleado de empresa privada	589	25,8987	19,20345
Servicio doméstico	117	33,8238	20,21923
Cuenta propia	647	23,9831	19,64546
Patrono con menos de 10 empleados	112	27,6767	20,61226
Patrono con 10 o más empleados	18	25,3794	19,71242
Total	1690	25,5909	19,63458
F = 4,731 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

El consumo de alcohol resulta moderado entre las personas entrevistadas, pues un 75,8% dice no haber tomado durante el último mes (ver cuadro # 467).


Entre aquellas personas que sí lo hicieron, la cantidad ingerida es muy variable, pero la mayor proporción tomó durante el mes de 1 a 10 botellas de cerveza o copas de licor (ver cuadro # 468).

En lo que respecta al consumo de drogas ilícitas, la proporción de personas que las han usado es muy pequeña, siendo que el 92,7% dice nunca haberlo hecho. Entre aquellas que sí consumen, la mayor proporción ha fumado marihuana o ha inhalado cocaína (ver cuadro # 469) y la mayor proporción consume de una a cinco veces al mes (ver cuadro # 470).

Tres personas reportan haberse inyectado heroína y nueve cocaína, y tres de ellas reconocen haber compartido el equipo de inyección con otras personas, mientras que otras dos no saben si lo hicieron o no y el resto no responde (ver cuadro # 471).

La combinación de preguntas de esta sección muestra un indicador de consumo de alcohol y drogas con un promedio bajo de 16,9 en una escala de 0 a 100, pero con una variabilidad relativamente alta (12,7) (ver cuadro # 473).

GRÁFICO # 26
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

El 74,3% de las personas reportan un consumo muy bajo, un 21,1% medio bajo, un 4,5% medio alto, y menos de 0,1% muy alto (ver cuadro #473).

El consumo más alto se presenta en Belice, mientras que el más bajo corresponde a El Salvador (ver cuadro #474).

El consumo resulta superior entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro #475), entre las personas con peor perspectiva de futuro (ver cuadro # 476), las mujeres que tienen sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver cuadro # 477), los hombres que tienen sexo tanto con hombres como con mujeres (ver cuadro # 478), las que tiene peores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 479), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 480), las que más han sufrido victimización (ver cuadro # 481), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 482), las de menor edad (ver cuadro # 483), las mujeres trans (ver cuadro # 484), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 485), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 486), las que no profesan ninguna religión (ver cuadro # 487), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 488), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 489), las solteras (ver cuadro # 490), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 491) y las que trabajan sin remuneración (ver cuadro # 492).

Cuadro # 467
¿USTED HA TOMADO ALCOHOL O LICOR DURANTE EL ÚLTIMO MES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	935	24,2
No	2933	75,8
Total	3868	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		25

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 468
COPAS O CERVEZAS CONSUMIDAS EN UN MES

	Frecuencia	Porcentaje
De 1 a 5	344	42,0
De 6 a 10	246	30,0
De 11 a 20	140	17,1
Más de 20	89	10,9
Total	819	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		108
No toma		1912
Sistema		1054
Total		3074

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #469
¿CUÁLES DROGAS HA CONSUMIDO?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Fumado marihuana	202	5,3
Inhalado cocaína	102	2,7
Inhalado piedra o crack	12	,3
Inyectado cocaína	9	,2
Inyectado heroína	3	,1
Inhalado thiner o resistol	6	,2
Consumido éxtasis	6	,2
Tomado anfetaminas	5	,1
Tomado diazepam	15	,4
Otra	14	,4
Ninguna	3551	92,7
Total	3830	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		63

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #470
CANTIDAD DE VECES QUE CONSUME DROGA EN UN MES

	Frecuencia	Porcentaje
No contesta	78	27,9
De 1 a 5	81	29,1
De 6 a 10	45	16,1
De 11 a 20	26	9,2
Más de 20	50	17,7
Total	280	100,0
Personas fuera del análisis		
No usa droga		3613

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 471
¿OTRA PERSONA UTILIZÓ EL MISMO EQUIPO DE INYECCIÓN QUE USTED USÓ?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	3	38,4
No	3	38,2
No sabe	2	23,4
Total	8	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		4
No aplica		3881
Total		3885

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 472
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	10,00	89,60	16,9075	12,67841

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #473
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	2894	74,3
Medio bajo	823	21,1
Medio alto	174	4,5
Muy alto	2	,0
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #474
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
Belice	131	26,6663	16,36507
Costa Rica	250	20,8419	14,93056
El Salvador	1263	14,4953	10,21840
Honduras	1328	16,5355	12,79154
Nicaragua	358	19,0497	14,03379
Panamá	562	17,8068	12,65266
Total	3893	16,9075	12,67841
F = 33,734 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #475
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	N	Media	Desv, tip,
Servicio de Salud	1595	18,4188	13,77169
Visita domiciliar	2226	15,5424	11,45290
t = 6,820 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #476
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	316	19,3487	15,17434
Media baja	259	18,1490	13,57683
Media alta	462	17,0443	12,67823
Muy alta	2857	16,5028	12,25336
Total	3893	16,9075	12,67841
F = 5,743 $\alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 477
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	N	Media	Desv, tip,
Solo practica el sexo con hombres	1689	13,6743	9,22899
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	28,5989	21,47281
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	7	22,7532	17,46788
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	5	14,3676	9,39410
Solo practica el sexo con mujeres	23	24,1699	18,72323
Total	1743	14,0141	9,85269
F = 19,154 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #478
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	N	Media	Desv, tip,
Solo practica el sexo con hombres	543	21,1276	14,53765
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	67	22,7155	14,48082
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	108	23,1093	15,33673
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	82	22,8304	16,05700
Solo practica el sexo con mujeres	979	18,1075	13,79400
Total	1779	19,7234	14,36232
F = 7,696 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #479
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	64	17,6551	14,04438
Medio bajo	854	18,3852	14,31283
Medio alto	1397	16,4543	12,35961
Muy alto	1578	16,4784	11,88342
Total	3893	16,9075	12,67841
F = 5,157 $\alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #480
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Menos de 1 mes	47	20,1389	15,70714
De 1 a 5 meses	159	14,7338	10,83341
De 6 a 11 meses	134	16,8100	12,61174
De 1 o 2 años	530	17,4169	12,82272
De 3 a 5 años	901	18,4759	13,91442
De 5 a 10 años	1231	16,3762	12,41185
Más de 10 años	871	15,8217	11,44909
Total	3873	16,8753	12,66161
F = 5,198 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #481
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN VICTIMIZACIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	2406	15,6100	11,52953
Media baja	1122	17,9785	13,34242
Media alta	329	22,3381	15,68553
Muy alta	36	20,5586	16,97772
Total	3893	16,9075	12,67841
F = 33,005 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #482
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, tip,
Si	1812	16,2896	11,67735
No	2077	17,4566	13,47800
t = -2,893 $\alpha = ,004$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 483
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
25 o menos	435	17,2143	12,98732
De 26 a 35	1174	19,0060	14,43012
De 36 a 45	1271	16,4669	11,95093
De 46 a 60	841	15,6194	11,45203
Más de 60	164	11,3279	5,18011
Total	3884	16,9181	12,68920
F = 18,895 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 484
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv, tip,
Femenino	1891	13,9020	9,69472
Masculino	1925	19,4729	14,20120
Mujer trans	44	27,5102	18,15500
Hombre trans	33	25,3350	16,51445
Total	3893	16,9075	12,67841
F = 81,616 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 485
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	N	Media	Desv, tip,
Sí	3406	17,2612	12,90729
No	461	14,1171	10,43549
t = 5,886 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 486
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	N	Media	Desv, tip,
No asistió a la escuela	27	12,0877	6,46719
Alfabetizada	72	14,5456	11,55730
Primaria incompleta	719	16,0285	12,79145
Primaria completa	694	16,5919	12,78471
Secundaria incompleta	701	18,2373	13,80599
Secundaria completa	738	17,7473	12,72984
Universitaria incompleta	286	18,9362	12,76108
Universitaria completa	151	18,3248	11,55772
Post grado universitario	12	16,2965	10,00587
Total	3399	17,2574	12,90695
F = 3,382 $\alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 487
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN RELIGIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Católica	1519	17,3136	12,82937
Cristiana Evangélica	1343	14,4189	10,28393
Testigo de Jehová	60	15,8101	13,64490
Adventista	59	16,9514	13,00634
Mormón/a	25	18,0315	12,01548
Otra	52	18,2581	11,82896
Ninguna	817	20,0039	14,86302
Total	3874	16,8665	12,65114
F = 17,723 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 488
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip,
Al menos una vez por semana	1495	13,6982	9,62656
Una, dos o tres veces al mes	643	14,8252	10,59287
Menos de una vez por mes	494	18,7409	12,78558
Nunca	389	23,2514	15,87017
Total	3020	15,9923	11,81732
F = 85,241 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 489
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE
RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, tip,
Sí	720	17,7739	13,19650
No	3159	16,6929	12,53656
t = 2,002 $\alpha = ,046$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 490
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN ESTADO CIVIL

	N	Media	Desv, tip,
Soltero/a	1897	18,4713	14,01259
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	15,5803	11,21773
Separado/a o divorciado/a	147	16,0504	10,92259
Viudo/a	204	12,4986	7,84263
Total	3872	16,8530	12,63577
F = 24,561 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #491
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	N	Media	Desv, tip,
Solo trabaja	1612	18,5258	13,87041
Estudia y trabaja	116	20,0613	12,81012
Está desempleado	1026	17,1104	12,79228
Es pensionado o rentista	99	13,9359	8,98138
Solo estudia	103	18,0605	13,11843
Solo se dedica a tareas del hogar	850	13,0052	8,40430
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	19,5120	16,55421
Total	3871	16,8700	12,64850
F = 21,291 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


Cuadro #492
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	N	Media	Desv, tip,
No remunerado	35	30,1579	17,18033
Empleado del Gobierno o Institución	172	17,3626	11,76785
Empleado de empresa privada	589	18,9800	13,09165
Servicio doméstico	117	15,0801	10,80101
Cuenta propia	647	18,2905	14,40419
Patrono con menos de 10 empleados	112	20,1241	15,69842
Patrono con 10 o más empleados	18	20,5913	15,06131
Total	1690	18,6014	13,76463
F = 6,100 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

RELACIONES SEXUALES CON UNA PAREJA ESTABLE

GRÁFICO # 27
¿TIENE ACTUALMENTE PAREJA ESTABLE
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Poco menos de la mitad de las personas entrevistadas reporta tener en el momento de la entrevista una pareja estable (ver cuadro # 493).

El país con mayor proporción de personas con pareja es Honduras y el de menor Belice (ver cuadro # 494).

La proporción de personas con una pareja estable aumenta entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 495), las mujeres que tienen sexo solo con mujeres (ver cuadro # 496) y los hombres que también solo tienen sexo con mujeres (ver cuadro # 497), las personas que tiene mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 498), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 499), las de menor edad (ver cuadro # 500), las personas con identidad de género femenino (ver cuadro # 501), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 502), las que tienen menor nivel educativo (ver cuadro # 503), las que asisten con menor frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 505) y las que solo se dedican a las labores del hogar (ver cuadro # 506).

En el 50,2% de las personas con una pareja estable, esta última es también una Persona con VIH (ver cuadro # 507), pero existe un 11,8% que afirma que su pareja no sabe que es una Personas con VIH (ver cuadro # 508).

La última vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja estable el 83,1% de las personas entrevistadas asegura haber utilizado el condón (ver cuadro # 509) y el 38,2% dice haber sido ella misma la que propuso su utilización (ver cuadro # 510).

Las personas que no utilizaron el condón en su última relación con su pareja estable justifican su actuación sobre todo porque su pareja no quiso usarlo o porque a ellas mismas no les gusta utilizarlo (ver cuadro # 511).

En términos generales, el 67,2% de las personas afirma utilizar el condón de manera sistemática con su pareja estable (ver cuadro # 512).

Por el contrario, el uso del lubricante tiende a ser mucho menos frecuente: solamente un 23% asegura haberlo utilizado en su última relación sexual con su pareja estable(ver cuadro # 513) y solo 24,1% dice acostumbrar el uso del lubricante en sus relaciones sexuales (ver cuadro # 514). El uso sistemático del lubricante es de un 56,5% (ver cuadro # 515).

Cuadro # 493
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1812	46,6
No	2077	53,4
Total	3889	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 494
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	33,6	45,6	44,1	48,0	54,2	47,6	46,6
No	66,4	54,4	55,9	52,0	45,8	52,4	53,4
$\chi^2 = 21,753$ $\alpha = ,001$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 495
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Sí	45,2	47,9	35,6	46,6
No	54,8	52,1	64,4	53,4
$\chi^2 = 6,331$ $\alpha = ,042$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 496
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	37,3	32,8	32,4	35,4	52,4	45,1
No	62,7	67,2	67,6	64,6	47,6	54,9
$\chi^2 = 48,739$ $\alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 497
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	21,6	50,0	100,0	30,2
No	78,4	50,0		69,8
$\chi^2 = 10,902$ $\alpha = ,004$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 498
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	28,1	40,0	46,4	51,1	46,6
No	71,9	60,0	53,6	48,9	53,4
$\chi^2 = 36,238$ $\alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 499
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Sí	48,7	48,7	43,1	41,2	16,7	46,7
No	51,3	51,3	56,9	58,8	83,3	53,3
$\chi^2 = 15,712$ $\alpha = ,003$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 500
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	47,6	51,0	51,7	37,4	21,3	46,7
No	52,4	49,0	48,3	62,6	78,7	53,3
$\chi^2 = 93,039 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 501
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	49,4	44,2	31,8	45,5	46,6
No	50,6	55,8	68,2	54,5	53,4
$\chi^2 = 14,436 \quad \alpha = ,002$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 502
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	47,8	37,3	46,5
No	52,2	62,7	53,5
$\chi^2 = 18,065 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 503
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Menos	74,1	32,4	45,1	49,7	50,8	47,8	47,9	41,1	41,7	47,8
Igual	25,9	67,6	54,9	50,3	49,2	52,2	52,1	58,9	58,3	52,2
$\chi^2 = 22,733 \quad \alpha = ,004$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #504
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Si	45,1	50,0	43,3	49,2	23,1	52,9	44,1	46,6
No	54,9	50,0	56,7	50,8	76,9	47,1	55,9	53,4
$\chi^2 = 16,888 \quad \alpha = ,010$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 505
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	menos de una vez por mes	Nunca	Total
Si	46,6	49,0	52,7	40,7	47,4
No	53,4	51,0	47,3	59,3	52,6
$\chi^2 = 13,565 \quad \alpha = ,004$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 506
¿ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Si	49,3	52,6	37,1	30,3	37,9	56,8	26,6	46,6
No	50,7	47,4	62,9	69,7	62,1	43,2	73,4	53,4
$\chi^2 = 103,495 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #507
¿SU PAREJA ESTABLE ES UNA PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	889	50,2
No	881	49,8
Total	1770	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		42
No aplica		2081
Total		2123

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 508
¿SU PAREJA ESTABLE SABE QUE USTED ES UNA PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1590	88,2
No	212	11,8
Total	1802	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		11
No aplica		2081
Total		2091

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 509
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES ¿USARON CONDÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1486	83,1
No	302	16,9
Total	1788	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		24
No aplica		2081
Total		2105

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 510
¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN COMPAREJA ESTABLE?

	Frecuencia	Porcentaje
Yo misma/o	564	38,2
Mi pareja	97	6,6
Decisión conjunta	814	55,2
Total	1475	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		11
No aplica		2407
Total		2418

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 511
¿POR QUÉ NO USÓ EL CONDÓN CON SU PAREJA ESTABLE?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Mi pareja no quiso usarlo	132	45,1
No me gusta usarlo	107	36,6
Confío en mi pareja	46	15,7
No tenía un condón en ese momento	30	10,3
Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	14	4,7
Los condones son muy caros	4	1,4
Los condones no funcionan	3	,9
Otra	22	7,6
Total	292	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		10
No aplica		3591
Total		3601

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #512
¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ CONDONES CON SU PAREJA SEXUAL ESTABLE?

	Frecuencia	Porcentaje
Todas las veces	1195	67,2
La gran mayoría de las veces	218	12,3
A menudo	73	4,1
Pocas veces	124	7,0
Casi nunca	78	4,4
Nunca	90	5,0
Total	1777	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		36
No aplica		2081
Total		2116

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #513
LA ÚLTIMA VEZ, ¿USARON LUBRICANTE TODO EL TIEMPO DE LA PENETRACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	400	23,0
No	1339	77,0
Total	1739	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		74
No aplica		2081
Total		2154

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #514
¿ACOSTUMBRAN, UTILIZAR EN SUS RELACIONES SEXUALES LUBRICANTE?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	422	24,1
No	1328	75,9
Total	1750	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		62
No aplica		2081
Total		2143

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+


Cuadro # 515
¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ LUBRICANTE CON SU PAREJA ESTABLE?

	Frecuencia	Porcentaje
Todas las veces	230	56,5
La gran mayoría de las veces	81	20,0
A menudo	42	10,4
Pocas veces	49	12,1
Casi nunca	2	,5
Nunca	2	,5
Total	408	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		14
No aplica		3471
Total		3485

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

PAREJAS OCASIONALES

GRÁFICO # 28
RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 31,6% de las personas entrevistadas acepta haber tenido relaciones sexuales con una pareja ocasional en el último año (ver cuadro # 516).

La frecuencia de este tipo de relaciones es superior en Belice y Costa Rica y muestra el valor más bajo en El Salvador (ver cuadro # 517). Del mismo modo, la frecuencia es superior entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 518), las mujeres (ver cuadro # 519) y los hombres (ver cuadro # 520) que tienen sexo tanto con hombres como con mujeres, las personas que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 521), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 522), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 523), las de menor edad (ver cuadro # 524), las mujeres trans (ver cuadro # 525), las que saben leer y escribir (ver cuadro # 526), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 527), las que no profesan ninguna religión (ver cuadro # 528), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 529), las solteras (ver cuadro # 530), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 531), las personas profesionales (ver cuadro # 532) y las que trabajan sin remuneración (ver cuadro # 533).


El 83,9% de las personas que han tenido relaciones ocasionales afirma haber utilizado el condón con su última pareja (ver cuadro # 534) y en el 76,1% de los casos fue la misma persona entrevistada la que propuso su uso (ver cuadro # 535).

Entre las personas que no utilizaron el condón en su última relación ocasional, la justificación de su accionar se basa sobre todo en que no les gusta utilizarlo o que su pareja no quiere usarlo (ver cuadro # 536).

El condón se usa de manera sistemática en el 64,4% de los casos (ver cuadro # 537).

Por otra parte, un 32,4% reporta haber utilizado el lubricante en su última relación ocasional (ver cuadro # 538).

GRÁFICO # 29
LA ÚLTIMA PAREJA
OCASIONAL ¿TIENE VIH?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

En el 41,3% de los casos de relaciones con parejas ocasionales, la persona entrevistada no sabe si su compañero o compañera es una persona con VIH (ver cuadro # 539 y gráfico # 29).

La proporción de personas que ignoran es superior en Costa Rica y Belice y alcanza el valor más bajo en Honduras (ver cuadro # 540).

También, el desconocimiento sobre si su pareja es una persona con VIH es superior entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 541), los hombres que tienen sexo con hombres (ver cuadro # 542), las que tienen menores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 543), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 544), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 545), las de menor edad (ver cuadro # 546), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 547), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 549), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 550) y las personas que son patronos con más de 10 empleados (ver cuadro # 551).

Por otra parte, solo el 21,1% de las personas afirma decirle a sus parejas ocasionales que son personas VIH (ver cuadro # 552). Esta costumbre de callar su estado es superior en Panamá e inferior en El Salvador (ver cuadro # 553). También se observa una mayor proporción de personas que no le dicen a su pareja entre las que tienen peores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 554), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 555), las de menor edad (ver cuadro # 556), las personas trans (ver cuadro # 557), las que no tienen educación formal (ver cuadro # 558), las que asisten con menos frecuencia al culto de su iglesia (ver cuadro # 560) y las pensionadas o que viven de las rentas (ver cuadro # 561).

El lugar más frecuente para tener relaciones ocasionales es el motel (ver cuadro # 562).

La última relación ocasional fue en el 29,5% de los casos con una persona desconocida (ver cuadro # 563).

Cuadro # 516
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1230	31,6
No	2657	68,4
Total	3888	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 517
**¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	40,9	40,6	27,6	29,1	35,9	38,3	31,7
No	59,1	59,4	72,4	70,9	64,1	61,7	68,3
$\chi^2 = 42,537$ $\alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 518
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
Si	35,1	28,8	43,1	31,6
No	64,9	71,2	56,9	68,4
$\chi^2 = 21,353 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 519
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	17,1	36,8	75,0	66,7	39,1	18,1
No	82,9	63,2	25,0	33,3	60,9	81,9
$\chi^2 = 39,458 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 520
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Si	55,5	64,7	63,6	58,5	35,5	45,5
No	44,5	35,3	36,4	41,5	64,5	54,5
$\chi^2 = 91,253 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 521
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	de 1 a 5 años	De 6 a 11 meses	De 1 0 2 años	De 3 a 5 años	De 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	38,3	37,1	35,1	33,6	35,1	29,5	28,0	31,7
No	61,7	62,9	64,9	66,4	64,9	70,5	72,0	68,3
$\chi^2 = 17,671 \quad \alpha = ,007$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 522
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Menos	32,8	29,6	34,6	27,9	15,4	31,7
Igual	67,2	70,4	65,4	72,1	84,6	68,3
$\chi^2 = 10,750 \quad \alpha = ,030$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 523
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	17,7	43,9	31,7
No	82,3	56,1	68,3
$\chi^2 = 306,524 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 524
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	37,3	38,5	28,2	26,8	20,1	31,7
No	62,7	61,5	71,8	73,2	79,9	68,3
$\chi^2 = 57,522 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 525
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	17,6	44,1	68,2	57,6	31,6
No	82,4	55,9	31,8	42,4	68,4
$\chi^2 = 346,966$ $\alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 526
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS
OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	32,8	24,3	31,8
No	67,2	75,7	68,2
$\chi^2 = 13,275$ $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 527
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí	7,4	26,4	24,7	28,2	32,5	39,3	44,8	43,7	54,5	32,7
No	92,6	73,6	75,3	71,8	67,5	60,7	55,2	56,3	45,5	67,3
$\chi^2 = 80,432$ $\alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 528
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Mormón/a	Otra	Total
Sí	33,7	21,3	23,7	30,5	36,0	30,8	45,5	31,6
No	66,3	78,7	76,3	69,5	64,0	69,2	54,5	68,4
$\chi^2 = 143,431$ $\alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 529
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	menos de una vez por mes	Nunca	Total
Si	18,4	28,5	37,7	49,4	27,7
No	81,6	71,5	62,3	50,6	72,3
$\chi^2 = 181,066 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 530
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	47,3	16,0	31,3	11,8	31,7
No	52,7	84,0	68,7	88,2	68,3
$\chi^2 = 435,606 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 531
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Si	37,4	53,4	34,2	30,0	50,5	12,6	28,6	31,6
No	62,6	46,6	65,8	70,0	49,5	87,4	71,4	68,4
$\chi^2 = 211,894 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 532
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Directivo de la administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No calificadas	Total
Sí		45,5	49,1	43,7	39,7	33,0	32,9	32,6	38,2
No	100,0	54,5	50,9	56,3	60,3	67,0	67,1	67,4	61,8
$\chi^2 = 19,170 \quad \alpha = ,008$									

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 533
¿HA TENIDO RELACIONES CON PAREJAS OCASIONALES EN ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	65,7	41,9	40,6	16,2	36,8	46,0	50,0	38,6
No	34,3	58,1	59,4	83,8	63,2	54,0	50,0	61,4
$\chi^2 = 41,809 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 534
¿USÓ CONDÓN CON ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1026	83,9
No	197	16,1
Total	1223	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		7
No aplica		2663
Total		2670

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 535
¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN CON PAREJA OCASIONAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Yo misma/o	776	76,1
Mi pareja	60	5,9
Decisión conjunta	183	18,0
Total	1020	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		6
No aplica		2867
Total		2873

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 536
POR QUÉ NO USÓ EL CONDÓN CON PAREJA OCASIONAL?
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
No me gusta usarlo	60	31,5
Mi pareja no quiso usarlo	57	30,0
No tenía un condón en ese momento	48	25,3
Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	32	16,9
Confío en mi pareja	22	11,6
Los condones no funcionan	2	,8
Los condones son muy caros	1	,5
Otra	8	4,5
Total	190	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		6
No aplica		3696
Total		3703

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 537
¿CON QUÉ FRECUENCIA USA CONDÓN CON PAREJAS OCASIONALES?

	Frecuencia	Porcentaje
Todas las veces	786	64,4
La gran mayoría de las veces	186	15,2
A menudo	58	4,8
Pocas veces	89	7,3
Casi nunca	55	4,5
Nunca	47	3,8
Total	1220	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		10
No aplica		2663
Total		2673

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 538
ÚLTIMA VEZ, ¿USÓ LUBRICANTE TODO EL TIEMPO DE LA PENETRACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	388	32,4
No	811	67,6
Total	1199	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		32
No aplica		2663
Total		2694

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro# 539
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	169	13,8
No	550	44,9
Total	506	41,3
	1225	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		6
No aplica		2663
Total		2668

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 540
**¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA**

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	3,8	17,2	20,9	12,7	7,0	8,9	13,7
No	37,7	24,2	38,6	57,7	53,5	38,5	44,9
No sabe	58,5	58,6	40,6	29,6	39,5	52,6	41,3
$\chi^2 = 87,140 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 541
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
SI	17,0	11,6	3,2	13,8
No	39,6	50,3	29,0	44,9
No sabe	43,4	38,1	67,7	41,3
$\chi^2 = 25,698 \quad \alpha = ,000$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 542
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	11,0	9,1	25,0	27,1	13,0	13,9
No	40,3	56,8	42,6	41,7	44,2	43,2
No sabe	48,7	34,1	32,4	31,2	42,8	42,9
$\chi^2 = 23,755 \quad \alpha = ,003$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 543
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
SI	13,3	10,2	15,3	14,6	13,8
No	26,7	31,9	44,4	53,5	44,9
No sabe	60,0	57,9	40,3	31,9	41,3
$\chi^2 = 54,226 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 544
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 10 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	5,6	15,3	19,1	8,0	12,4	11,9	22,1	13,8
No	50,0	27,1	25,5	38,6	50,2	47,2	47,1	45,0
No sabe	44,4	57,6	55,3	53,4	37,5	40,9	30,7	41,2
$\chi^2 = 405,459 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 545
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	14,2	13,7	13,8
No	50,3	43,1	44,9
No sabe	35,4	43,3	41,3
$\chi^2 = 6,295 \quad \alpha = ,043$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 546
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	10,5	13,6	14,0	12,5	40,6	13,8
No	40,7	47,6	45,1	45,5	21,9	44,9
No sabe	48,8	38,9	40,9	42,0	37,5	41,3
$\chi^2 = 26,381 \quad \alpha = ,001$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 547
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí		36,8	17,6	16,0	16,1	9,3	7,8	10,6		13,5
No	50,0	15,8	43,8	50,0	41,1	44,3	52,3	54,5	33,3	45,6
No sabe	50,0	47,4	38,6	34,0	42,9	46,4	39,8	34,8	66,7	40,9
$\chi^2 = 35,154 \quad \alpha = ,004$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 548
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evéngelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	10,4	20,8	20,0	11,1		12,5	13,3	13,8
No	43,1	52,8	40,0	44,4	55,6	25,0	42,7	45,0
No sabe	46,6	26,4	40,0	44,4	44,4	62,5	44,0	41,2
$\chi^2 = 43,917 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 549
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	14,7	18,2	10,7	11,1	13,7
No	56,8	45,3	44,4	32,6	46,0
No sabe	28,6	36,5	44,9	56,3	40,3
$\chi^2 = 42,556 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 550
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA
DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	8,7	14,9	13,7
No	47,3	44,3	44,9
No sabe	44,0	40,7	41,4
$\chi^2 = 6,348 \quad \alpha = ,042$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 551
¿ÚLTIMA PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	12,5	2,8	14,3	10,5	18,6	7,8	22,2	14,0
No	75,0	55,6	40,3	36,8	42,8	45,1	22,2	44,2
No sabe	12,5	41,7	45,4	52,6	38,6	47,1	55,6	41,8
$\chi^2 = 29,044 \quad \alpha = ,004$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 552
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	253	21,1
No	949	78,9
Total	1202	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		28
No aplica		2663
Total		2691

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 553
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	19,2	12,5	27,5	23,6	19,7	10,7	21,0
No	80,8	87,5	72,5	76,4	80,3	89,3	79,0
$\chi^2 = 27,821 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 554
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Sí	12,5	14,0	21,7	24,8	21,1
No	87,5	86,0	78,3	75,2	78,9
$\chi^2 = 12,904 \quad \alpha = ,005$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 555
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	de 1 a 5 años	De 6 a 11 meses	De 10 a 2 años	De 3 a 5 años	De 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	13,3	23,5	13,6	11,4	16,3	21,8	34,0	21,0
No	86,7	76,5	86,4	88,6	83,7	78,2	66,0	79,0
$\chi^2 = 40,830 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 556
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	16,2	18,6	24,4	20,3	46,9	21,1
No	83,8	81,4	75,6	79,7	53,1	78,9
$\chi^2 = 19,085 \quad \alpha = ,001$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 557
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	29,4	18,4	10,3	10,5	21,1
No	70,6	81,6	89,7	89,5	78,9
$\chi^2 = 20,320 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 558
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Sí		52,6	23,1	20,7	22,8	17,9	14,4	21,9	16,7	20,6
No	100,0	47,4	76,9	79,3	77,2	82,1	85,6	78,1	83,3	79,4
$\chi^2 = 18,007 \quad \alpha = ,021$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 559
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	18,1	31,2	28,6	22,2	33,3	6,2	17,2	21,1
No	81,9	68,8	71,4	77,8	66,7	93,8	82,8	78,9
$\chi^2 = 26,766 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 560
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	31,2	23,0	16,7	16,5	22,9
No	68,8	77,0	83,3	83,5	77,1
$\chi^2 = 19,102 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 561
¿LE DICE A LAS PAREJAS OCASIONALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Sí	22,8	13,3	19,0	10,3	14,6	30,2	11,8	21,1
No	77,2	86,7	81,0	89,7	85,4	69,8	88,2	78,9
$\chi^2 = 13,590 \quad \alpha = ,035$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 562
¿DÓNDE ACOSTUMBRA TENER ENCUENTROS SEXUALES OCASIONALES?
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Moteles	610	51,7
Casas de citas	163	13,9
Bares	148	12,6
Parques	114	9,7
Cuartos oscuros	92	7,8
Saunas	52	4,4
Baños públicos	43	3,6
Cines	28	2,3
Centros comerciales	24	2,0
Salas de masaje	21	1,8
Otra	394	33,4
Total	1179	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		51
No aplica		2663
Total		2714

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 563
LA ÚLTIMA RELACIÓN ¿FUE CON UNA PERSONA CONOCIDA O DESCONOCIDA?


	Frecuencia	Porcentaje
Conocida	826	70,5
Desconocida	346	29,5
Total	1172	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		58
No aplica		2663
Total		2721

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



RELACIONES CON TRABAJADORES/AS SEXUALES

GRÁFICO # 30
¿HA TENIDO RELACIONES
CON TRABAJADORES O T
RABAJADORAS SEXUALES?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

El 94,6% de las personas entrevistadas asegura no haber tenido en el último año relaciones sexuales con trabajadores o trabajadoras sexuales (ver cuadro # 564 y gráfico # 30).

La proporción de personas que han tenido relaciones con trabajadores/as sexuales es superior para Belice e inferior para El Salvador (ver cuadro # 565).

La frecuencia de relaciones es superior entre los hombres que tienen sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver cuadro # 567), las personas que tienen conocimientos medio bajos sobre VIH (ver cuadro # 568), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 569), las de edades medias (ver cuadro # 570), los hombres trans (ver cuadro # 571), las personas mormonas (ver cuadro # 572), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 573), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 574), las separadas o divorciadas (ver cuadro # 575), las que solo trabajan (ver cuadro # 576), las que ocupan puestos de dirección (ver cuadro # 577) y las que son patronos (ver cuadro # 578).

El servicio más frecuentemente comprado es el sexo vaginal con un 64,5% de mención (ver cuadro # 579).

En la última relación pagada, el 84,6% de las personas afirma haber utilizado el condón (ver cuadro # 580).

El uso sistemático en relaciones sexuales comerciales es de un 64,1% (ver cuadro # 582).

En la última relación pagada, un 31,1% dice haber utilizado lubricante durante toda la penetración (ver cuadro # 583).

Solo el 3,2% de las personas que tienen relaciones sexuales pagadas le dice a la trabajadora o al trabajador que son personas con VIH (ver cuadro # 584) y 60% dice no saber si la persona a la que pagó tiene VIH o no (ver cuadro # 585).

Cuadro #564
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	210	5,4
No	3676	94,6
Total	3886	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		7

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #565
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	13,7	4,0	3,6	5,3	9,8	5,7	5,4
No	86,3	96,0	96,4	94,7	90,2	94,3	94,6
$\chi^2 = 40,734$ $\alpha = ,000$							

Cuadro #566
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
SI	5,3	5,3	12,3	5,4
No	94,7	94,7	87,7	94,6
$\chi^2 = 6,979$ $\alpha = ,031$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #567
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	0,5		12,5	16,7	4,3	0,7
No	99,5	100,0	87,5	83,3	95,7	99,3
$\chi^2 = 43,984 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #568
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
SI	3,1	8,7	5,0	4,1	5,4
No	96,9	91,3	95,0	95,9	94,6
$\chi^2 = 24,568 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #569
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	3,0	7,5	5,4
No	97,0	92,5	94,6
$\chi^2 = 38,450 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #570
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	3,0	6,0	5,3	6,6	2,5	5,4
No	97,0	94,0	94,7	93,4	97,5	94,6
$\chi^2 = 10,615 \quad \alpha = ,031$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #571
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	0,6	10,0	4,5	14,7	5,4
No	99,4	90,0	95,5	85,3	94,6
$\chi^2 = 171,300 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #572
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otra	Ninguna	Total
Sí	6,1	2,1		3,4	8,3	9,6	9,6	5,4
No	93,9	97,9	100,0	96,6	91,7	90,4	90,4	94,6
$\chi^2 = 64,353 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 573
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
SI	2,8	3,1	5,7	10,1	4,3
No	97,2	96,9	94,3	89,9	95,7
$\chi^2 = 43,895 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 574
¿HA TENIDO RELACIONES CON
TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE
RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	8,4	4,7	5,3
No	91,6	95,3	94,7
$\chi^2 = 15,804 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #575
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	7,3	2,9	11,0	1,5	5,3
No	92,7	97,1	89,0	98,5	94,7
$\chi^2 = 49,945 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #576
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Si	7,6	5,2	5,3	7,1	2,9	1,2	6,3	5,3
No	92,4	94,8	94,7	92,9	97,1	98,8	93,7	94,7
$\chi^2 = 46,928 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #577
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Directivo de la administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No calificadas	Total
Sí		16,7	9,0	5,4	5,2	13,8	9,4	8,9	7,4
No	100,0	83,3	91,0	94,6	94,8	86,2	90,6	91,1	92,6
$\chi^2 = 16,914 \quad \alpha = ,018$									

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #578
¿HA TENIDO RELACIONES CON TRABAJADORAS/ES SEXUALES ÚLTIMO AÑO?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Si	8,8	4,7	7,2	2,5	8,2	14,2	11,1	7,5
No	91,2	95,3	92,8	97,5	91,8	85,8	88,9	92,5
$\chi^2 = 14,352 \quad \alpha = ,026$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #579
¿QUÉ SERVICIOS SEXUALES HA COMPRADO?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Sexo vaginal	133	64,5
Sexo oral	92	44,7
Sexo anal	87	42,3
Masturbación	26	12,6
Otro	3	1,7
Total	206	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		4
No aplica		3683
Total		3687

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 580
LA ÚLTIMA VEZ QUE PAGÓ, ¿UTILIZARON CONDÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	174	84,6
No	32	15,4
Total	205	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		4
No aplica		3683
Total		3688

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #581
¿PORQUÉ NO USÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Mi pareja no quiso usarlo	7	26,0
No me gusta usarlo	10	38,9
Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	4	16,6
No tenía un condón en ese momento	4	16,2
Los condones no funcionan	1	1,9
Otra	2	8,1
Total	27	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		5
No aplica		3861
Total		3866

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 582
¿CON QUÉ FRECUENCIA USA CONDÓN CUANDO PAGA?

	Frecuencia	Porcentaje
Todas las veces	134	64,1
La gran mayoría de las veces	35	16,6
A menudo	13	6,2
Pocas veces	16	7,8
Casi nunca	1	,5
Nunca	10	4,8
Total	210	100,0
Personas fuera del análisis		
No aplica		3683

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 583
ÚLTIMA VEZ QUE PAGÓ ¿UTILIZARON LUBRICANTE DURANTE PENETRACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	65	31,1
No	143	68,9
Total	208	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		2
No aplica		3683
Total		3685

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 584
¿USTED DICE A TRABAJADORES/AS SEXUALES QUE ES UNA PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	6	3,2
No	194	96,8
Total	200	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		9
No aplica		3683
Total		3693

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 585
¿SABE USTED SI ALGUNA DE LAS PERSONAS A LAS QUE PAGÓ TENÍA VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	8	4,1
No	73	35,9
No sabe	122	60,0
Total	203	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		6
No aplica		3683
Total		3690

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL

El 47,8% de las personas asegura haber tenido su última relación sexual con una pareja estable, ya sea que viva o no con ella y otro 27,4% la tuvo con una pareja ocasional (ver cuadro # 586).


En el 74,4% de los casos se utilizó condón en la última relación sexual (ver cuadro # 587). Esta proporción es de 72,8% entre las personas menores de 24 años y de 74,5% entre las mayores (ver cuadro # 588).

Poco más de la mitad de las personas asegura haber propuesto a su pareja el uso del condón (ver cuadro # 589).

Mientras que entre las personas que no utilizaron el preservativo, un 33% dice no haberlo hecho porque la pareja no quiso usarlo, un 26,1% porque confía en su pareja, un 23,1% porque no les gusta y un 15,4% porque no lo tenía en el momento de necesitarlo (ver cuadro # 590).

El lubricante, por su parte, solo se utilizó en el 21,5% de los casos (ver cuadro # 591).

GRÁFICO # 31
SU ÚLTIMA PAREJA SEXUAL,
¿ES UNA PERSONA CON VIH?




Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 36,6% afirma que su última pareja es una persona con VIH, 41,6% dice que no lo es y un 21,9% no sabe (ver cuadro # 592).

Este desconocimiento es más alto en Belice y más bajo en Honduras.

Por otra parte, el desconocimiento es superior entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 594), las mujeres (ver cuadro # 595) y los hombres (ver cuadro # 596) que tienen sexo solo con hombres, las personas que tienen peores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 597), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 598), las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 599), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 600), las de menor edad (ver cuadro # 601), las mujeres trans (ver cuadro # 602), las que no saben leer ni escribir (ver cuadro # 603), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 604), las personas testigos de Jehová (ver cuadro # 605), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 606), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 607), las separadas o divorciadas (ver cuadro # 608), las que solo estudian (ver cuadro # 609) y las que son patronos con más de 10 empleados (ver cuadro # 610).

GRÁFICO # 32
¿LE DIJO A SU ÚLTIMA PAREJA SEXUAL QUE
USTED ES UNA PERSONA CON VIH?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Por otra parte, un 41,8% acepta no haberle dicho a su última pareja sexual que es una persona con VIH (ver cuadro # 611 y gráfico # 32). Esta situación es más frecuente en Belice y menos en Honduras (ver cuadro # 612). Del mismo modo, es más frecuente entre las mujeres que tienen sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver cuadro # 613) y los hombres que tienen sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres (ver cuadro # 614), las personas que tiene peores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 615), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 616), las que peor perciben su estado de salud (ver cuadro # 617), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 619), las mujeres trans (ver cuadro # 620), las que tienen menor nivel educativo (ver cuadro # 621), las que no profesan ninguna religión (ver cuadro # 622), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 623), las solteras (ver cuadro # 624), las inactivas (ver cuadro # 625) y las que son patronos con más de 10 empleados (ver cuadro # 626).

En el último mes antes de la entrevista un 31,5% de las personas entrevistadas acepta haber tenido relaciones sexuales sin utilizar el condón (ver cuadro # 627). Del mismo modo, un 19,4% ha tenido relaciones anales sin protección (ver cuadro # 628), un 10,4% afirma que un hombre eyaculó en su boca sin usar condón (ver cuadro # 629) y solo un 17,8% utilizó lubricante en todas sus relaciones sexuales en el último mes (ver cuadro # 630).

Cuadro # 586
¿CON QUÉ TIPO DE PAREJA TUVO LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Pareja estable, vive con ella	1760	47,8
Pareja estable, no vive con ella	684	18,6
Cliente	53	1,4
Pareja ocasional	1009	27,4
Pareja comercial	96	2,6
Desconocido/a	83	2,3
Total	3685	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		208

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 587
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES ¿UTILIZARON CONDÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2769	74,4
No	953	25,6
Total	3722	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		171

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 588
**LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES ¿UTILIZARON CONDÓN?
SEGÚN GRUPOS DE EDAD CON 24 AÑOS COMO SEPARADOR**

	Menores de 24 años	24 años o más	Total
Sí	72,9	74,5	74,4
No	27,1	25,5	25,6
$\chi^2 = ,318 \quad \alpha = ,573$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 589
¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN EN ÚLTIMA RELACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Yo misma/o	1408	51,3
Mi pareja	201	7,3
Decisión conjunta	1134	41,3
Total	2743	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		26
No aplica		1124
Total		1150

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 590
¿POR QUÉ NO USÓ EL CONDÓN EN SU ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
Mi pareja no quiso usarlo	308	33,0
Confío en mi pareja	243	26,1
No me gusta usarlo	215	23,1
No tenía un condón en ese momento	143	15,4
Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	62	6,6
Los condones son muy caros	9	1,0
Los condones no funcionan	9	1,0
Otra	108	11,6
Total	932	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		21
No aplica		2940
Total		2961

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 591
EN ÚLTIMA RELACIÓN, ¿USÓ LUBRICANTE DURANTE LA PENETRACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	779	21,5
No	2841	78,4
No sabe	4	,1
Total	3624	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		269

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 592
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1359	36,6
No	1544	41,6
No sabe	812	21,9
Total	3715	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		178

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 593
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	29,2	34,9	33,9	44,1	33,5	30,1	36,6
No	35,8	33,6	38,7	44,2	47,4	42,6	41,6
No sabe	35,0	31,4	27,4	11,7	19,0	27,3	21,9
$\chi^2 = 146,197 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 594
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
SI	34,3	38,3	31,8	36,6
No	41,7	41,8	31,8	41,6
No sabe	24,0	19,9	36,4	21,9
$\chi^2 = 18,909 \quad \alpha = ,001$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro# 595
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	22,6	17,6	18,1	30,4	37,1	30,5
No	43,9	51,5	44,8	50,6	42,9	44,0
No sabe	33,5	30,9	37,1	19,0	20,0	25,5
$\chi^2 = 67,197 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 596
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Sí	5,6		75,0	12,2
No	44,4	100,0	25,0	43,9
No sabe	50,0			43,9
$\chi^2 = 17,906 \quad \alpha = ,001$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 597
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
SI	30,6	30,3	36,9	39,9	36,6
No	24,2	38,2	40,6	44,9	41,6
No sabe	45,2	31,4	22,5	15,2	21,9
$\chi^2 = 105,420 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 598
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 a 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	21,3	27,9	27,3	34,9	35,2	38,0	41,0	36,6
No	31,9	40,3	37,5	37,4	43,2	42,3	43,1	41,6
No sabe	46,8	31,8	35,2	27,7	21,6	19,7	15,9	21,8
$\chi^2 = 74,539 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 599
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Menos	38,4	37,2	35,1	25,2	55,6	36,5
Igual	43,9	42,9	38,1	41,5	22,2	41,7
No sabe	17,7	19,9	26,8	33,3	22,2	21,8
$\chi^2 = 41,161 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 600
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	47,5	26,2	36,5
No	46,0	37,5	41,6
No sabe	6,5	36,2	21,9
$\chi^2 = 506,789 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 601
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	27,8	33,5	41,2	36,7	46,3	36,6
No	44,6	45,5	39,7	39,2	32,9	41,6
No sabe	27,6	21,0	19,1	24,1	20,8	21,8
$\chi^2 = 44,909 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 602
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	44,8	29,6	11,4	14,7	36,6
No	38,0	44,5	45,5	61,8	41,6
No sabe	17,1	25,9	43,2	23,5	21,9
$\chi^2 = 123,810 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 603
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO
RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	Sí	No	Total
Sí	36,3	39,1	36,6
No	42,6	33,6	41,5
No sabe	21,1	27,2	21,8
$\chi^2 = 14,890 \quad \alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 604
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
Menos	39,3	52,4	43,1	42,7	35,4	30,9	23,4	26,0	18,2	36,4
Igual	42,9	22,2	35,1	42,9	41,6	45,8	54,3	51,4	36,4	42,5
No sabe	17,9	25,4	21,7	14,4	23,0	23,3	22,3	22,6	45,5	21,1
$\chi^2 = 94,258 \quad \alpha = ,000$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 605
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	otra	Ninguna	Total
Sí	37,1	41,9	43,1	21,4	30,8	32,0	28,2	36,6
No	39,2	42,5	29,3	58,9	50,0	36,0	44,6	41,6
No sabe	23,7	15,6	27,6	19,6	19,2	32,0	27,2	21,8
$\chi^2 = 79,189 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 606
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Sí	45,0	34,5	33,7	30,3	39,0
No	38,5	47,1	41,6	37,3	40,7
No sabe	16,5	18,4	24,7	32,4	20,3
$\chi^2 = 78,503 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 607
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	32,8	37,5	36,6
No	45,2	40,7	41,5
No sabe	22,0	21,8	21,9
$\chi^2 = 6,218 \quad \alpha = ,045$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 608
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	22,8	50,2	27,0	62,0	36,7
No	42,7	43,2	36,9	17,5	41,5
No sabe	34,5	6,7	36,2	20,5	21,8
$\chi^2 = 546,498 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 609
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Si	33,9	29,2	35,6	31,9	17,2	48,2	23,3	36,7
No	44,0	48,7	40,4	44,0	54,8	34,6	50,0	41,5
$\chi^2 = 78,481 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 610
¿LA ÚLTIMA PAREJA CON LA QUE TUVO RELACIONES TIENE EL VIH?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	11,8	28,1	33,6	37,3	37,0	22,2	26,7	33,3
No	79,4	53,3	44,7	36,4	41,0	51,9	33,3	44,7
No sabe	8,8	18,6	21,7	26,4	22,0	25,9	40,0	22,0
$\chi^2 = 38,042 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 611
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2096	58,2
No	1507	41,8
Total	3603	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		290

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #612
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	42,2	49,3	60,0	62,2	53,4	54,9	58,2
No	57,8	50,7	40,0	37,8	46,6	45,1	41,8
$\chi^2 = 33,667 \quad \alpha = ,000$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 613
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Si	71,4	41,2	28,6	20,0	54,5	70,5
No	28,6	58,8	71,4	80,0	45,5	29,5
$\chi^2 = 22,317 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 614
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Si	37,8	35,9	35,3	46,2	58,0	49,2
No	62,2	64,1	64,7	53,8	42,0	50,8
$\chi^2 = 68,422 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 615
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	Muy baja	Media baja	Media alta	Muy alta	Total
Si	36,1	48,8	58,8	63,4	58,2
No	63,9	51,2	41,2	36,6	41,8
$\chi^2 = 56,726 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 616
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 10 a 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí	45,5	51,4	47,5	52,2	55,5	60,4	64,8	58,1
No	54,5	48,6	52,5	47,8	44,5	39,6	35,2	41,9
$\chi^2 = 37,442 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 617
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	Muy bueno	Bueno	Estable	Malo	Muy malo	Total
Si	56,9	61,7	53,8	57,1	50,0	58,2
No	43,1	38,3	46,2	42,9	50,0	41,8
$\chi^2 = 17,172 \quad \alpha = ,028$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 618
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	81,4	35,1	58,2
No	18,6	64,9	41,8
$\chi^2 = 791,300 \quad \alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 619
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	51,4	57,5	63,2	56,8	48,5	58,2
No	48,6	42,5	36,8	43,2	51,5	41,8
$\chi^2 = 25,488 \quad \alpha = ,001$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 620
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	69,6	48,5	29,5	36,4	58,2
No	30,4	51,5	70,5	63,6	41,8
$\chi^2 = 183,240 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 621
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	No asistió a la escuela	Alfabetizada	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria incompleta	Universitaria completa	Post grado universitario	Total
si	74,1	66,7	62,0	61,6	58,9	56,0	51,3	46,9	50,0	58,5
No	25,9	33,3	38,0	38,4	41,1	44,0	48,7	53,1	50,0	41,5
$\chi^2 = 26,313 \quad \alpha = ,001$										

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 622
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evangélica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Mormón/a	Otra	Total
Sí	56,1	67,2	58,5	54,2	65,2	49,0	47,9	58,1
No	43,9	32,8	41,5	45,8	34,8	51,0	52,1	41,9
$\chi^2 = 80,526 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 623
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
Si	67,7	59,3	55,1	47,9	61,2
No	32,3	40,7	44,9	52,1	38,8
$\chi^2 = 58,812 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 624
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	35,3	83,3	47,0	58,9	58,2
No	64,7	16,7	53,0	41,1	41,8
$\chi^2 = 788,429$ $\alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 625
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Si	57,3	48,2	53,2	45,2	39,1	72,7	35,6	58,2
No	42,7	51,8	46,8	54,8	60,9	27,3	64,4	41,8
$\chi^2 = 112,748$ $\alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 626
¿LE DIJO A ÚLTIMA PAREJA QUE ES UNA PERSONA CON VIH?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	41,2	55,8	58,1	72,4	56,4	43,4	33,3	56,6
No	58,8	44,2	41,9	27,6	43,6	56,6	66,7	43,4
$\chi^2 = 25,332$ $\alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 627
¿EN ÚLTIMO MES HA TENIDO RELACIONES SIN USAR UN CONDÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1081	31,5
No	2350	68,5
Total	3431	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		462

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 628
¿EN ÚLTIMO MES HA TENIDO RELACIONES ANALES SIN CONDÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	655	19,4
No	2725	80,6
Total	3380	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		513

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 629
¿EN ÚLTIMO MES ALGÚN HOMBRE EYACULÓ EN SU BOCA SIN CONDÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	345	10,4
No	2975	89,6
Total	3321	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		572

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 630
¿USÓ LUBRICANTE EN TODAS SUS RELACIONES SEXUALES?


	Frecuencia	Porcentaje
Sí	594	17,8
No	2741	82,2
Total	3335	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		558

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



TRABAJO SEXUAL

GRÁFICO # 33
¿HA DESARROLLADO TRABAJO
SEXUAL EN ÚLTIMOS 12 MESES?



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Un 4% de las personas entrevistadas reconoce haber desarrollado trabajo sexual en los últimos 12 meses (ver cuadro # 631).

El trabajo sexual es más frecuente en Belice y menos en El Salvador (ver cuadro # 632). También, se observa una mayor frecuencia de trabajo sexual entre las personas entrevistadas en los centros de salud (ver cuadro # 633), las mujeres que tienen sexo tanto con hombres como con mujeres (ver cuadro # 634), los hombres que tienen sexo mujeres y ocasionalmente con hombres (ver cuadro # 635), las que tienen menos tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 636), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 637), las de menor edad (ver cuadro # 638), las mujeres trans (ver cuadro # 639), las personas testigos de Jehová o las que no profesan ninguna religión (ver cuadro # 640), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 641), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 642), las solteras (ver cuadro # 643), las que solo estudian (ver cuadro # 644), las que trabajan en actividades de apoyo administrativo o atención al público (ver cuadro # 645) y las que trabajan sin remuneración (ver cuadro # 646).

La edad de la primera relación sexual comercial se da en tres de cada cuatro personas entre los 15 y los 17 años (ver cuadro # 647).

Solo un 5,1% de las personas que han desarrollado trabajo sexual en los últimos doce meses reconoce haberle dicho a sus clientes que es una persona con VIH (ver cuadro # 648). Esta negativa a comunicar su condición es más frecuente en Costa Rica y menos en El Salvador (ver cuadro # 649).

Por otra parte, un 26,8% dice haber hecho trabajo sexual en otras ciudades diferentes a la en que vive (ver cuadro # 652) y un 13,8% ha trabajado fuera de su país (ver cuadro # 653).

El lugar principal para desarrollar el trabajo sexual es la carretera o en calles y parques (ver cuadro # 654).

En la última relación de trabajo sexual el 82,7% afirma haber utilizado el condón (ver cuadro # 656) y en el 71,5% de los casos fue la persona entrevistada quien sugirió su uso (ver cuadro # 657).

Un 75,2% afirma haber utilizado el condón durante toda la penetración del último trabajo sexual (ver cuadro # 659) y el lubricante se utilizó en el 35,2% de los casos (ver cuadro # 660). En términos generales, el condón se utiliza de manera sistemática solo por el 2,5% de las personas (ver cuadro # 661). El condón se deja de utilizar con mayor frecuencia cuando el cliente paga más cuando se practica sexo oral (ver cuadro # 663).

Cuadro # 631
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	155	4,0
No	3725	96,0
Total	3879	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		14

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 632
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	6,9	6,5	2,5	4,6	5,3	3,2	4,0
No	93,1	93,5	97,5	95,4	94,7	96,8	96,0
$\chi^2 = 18,540 \quad \alpha = ,002$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 633
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	Servicio de Salud	Visita domiciliar	Otros	Total
SI	4,9	3,3	6,9	4,0
No	95,1	96,7	93,1	96,0
$\chi^2 = 7,694 \quad \alpha = ,021$				

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 634
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Si	3,1	26,3	50,0		4,5	3,6
No	96,9	73,7	50,0	100,0	95,5	96,4
$\chi^2 = 80,145 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 635
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	Solo practica el sexo con hombres	Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	Solo practica el sexo con mujeres	Total
Si	5,7	3,0	6,6	11,2	0,7	3,2
No	94,3	97,0	93,4	88,8	99,3	96,8
$\chi^2 = 51,992 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 636
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	Menos de 1 mes	De 1 a 5 meses	De 6 a 11 meses	De 1 0 2 años	De 3 a 5 años	de 5 a 10 años	Más de 10 años	Total
Sí		1,3	6,0	3,8	7,0	3,4	2,2	4,0
No	100,0	98,7	94,0	96,2	93,0	96,6	97,8	96,0
$\chi^2 = 36,836 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 637
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	Sí	No	Total
Sí	3,3	4,6	4,0
No	96,7	95,4	96,0
$\chi^2 = 4,791 \quad \alpha = ,029$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 638
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	25 o menos	De 26 a 35	De 36 a 45	De 46 a 60	Más de 60	Total
Sí	5,8	6,5	3,3	1,3	0,6	4,0
No	94,2	93,5	96,7	98,7	99,4	96,0
$\chi^2 = 44,321 \quad \alpha = ,000$						

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 639
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	Femenino	Masculino	Mujer trans	Hombre trans	Total
Sí	3,4	3,0	52,3	27,3	4,0
No	96,6	97,0	47,7	72,7	96,0
$\chi^2 = 322,379 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 640
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN RELIGIÓN

	Católica	Cristiana Evángelica	Testigo de Jehová	Adventista	Mormón/a	Otro	Ninguna	Total
Sí	3,4	1,9	8,5			2,0	8,3	3,9
No	96,6	98,1	91,5	100,0	100,0	98,0	91,7	96,1
$\chi^2 = 64,030 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 641
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL CULTO DE SU IGLESIA

	Al menos una vez por semana	Una, dos o tres veces al mes	Menos de una vez por mes	Nunca	Total
SI	1,8	1,2	3,4	8,0	2,7
No	98,2	98,8	96,6	92,0	97,3
$\chi^2 = 52,098 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 642
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE
RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	Sí	No	Total
Sí	6,0	3,5	3,9
No	94,0	96,5	96,1
$\chi^2 = 9,931 \quad \alpha = ,002$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 643
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN ESTADO CIVIL

	Soltero/a	Casado/a acompañada/a o unión libre	Separado/a o divorciado/a	Viudo/a	Total
Sí	5,6	2,8	1,4		3,9
No	94,4	97,2	98,6	100,0	96,1
$\chi^2 = 29,594 \quad \alpha = ,000$					

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 644
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	Solo trabaja	Estudia y trabaja	Está desempleado	Es pensionado o rentista	Solo estudia	Solo se dedica a tareas del hogar	No estudia ni trabaja y no realiza tareas domesticas	Total
Sí	4,7	5,2	3,4	2,0	10,7	2,5	1,6	3,9
No	95,3	94,8	96,6	98,0	89,3	97,5	98,4	96,1
$\chi^2 = 22,737 \quad \alpha = ,001$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 645
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Directivo de la administración pública o de empresas privadas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agricolas, agropecuarias forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No calificadas	Total
Sí			1,8	1,4	9,8	3,6	0,7	1,9	4,7
No	100,0	100,0	98,2	98,6	90,2	96,4	99,3	98,1	95,3
$\chi^2 = 58,869 \quad \alpha = ,000$									

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 646
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿HA DESARROLLADO TRABAJO SEXUAL?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí	32,4	1,7	1,5	2,5	7,6	1,8	11,1	4,7
No	67,6	98,3	98,5	97,5	92,4	98,2	88,9	95,3
$\chi^2 = 91,745 \quad \alpha = ,000$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 647
EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMERCIAL

	Frecuencia	Porcentaje
De 11 a 14	3	1,8
De 15 a 17	106	76,0
De 18 a 25	31	22,2
Total	140	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		15
No aplica		3738
Total		3753

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 648
¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	7	5,1
No	139	94,9
Total	147	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		8
No aplica		3738
Total		3746

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 649
¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH?
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	Belice	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá	Total
Sí	12,5		13,8	3,4	5,0	6,7	6,1
No	87,5	100,0	86,2	96,6	95,0	93,3	93,9
$\chi^2 = 5,396$ $\alpha = ,369$							

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 650
¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH?
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	Rentas	Profesional	Técnico medio	Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	Calificadas agrícolas, agropecuarias forestales y pesqueras	Calificadas de industrias, construcción y operación	No calificadas	Total
Sí		33,3			25,0			2,5
No		66,7	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0	97,5
$\chi^2 = 21,880$ $\alpha = ,001$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 651
¿LE DICE USTED A SUS CLIENTES QUE TIENE VIH?
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	No remunerado	Empleado del Gobierno o institución	Empleado de empresa privada	Servicio doméstico	Cuenta Propia	Patrono con menos de 10 empleados	Patrono con 10 a mas empleados	Total
Sí					2,0		50,0	2,6
No	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	100,0	50,0	97,4
$\chi^2 = 18,777$ $\alpha = ,005$								

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 652
EL ÚLTIMO AÑO ¿HA HECHO TRABAJO SEXUAL EN OTRAS CIUDADES?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	41	26,8
No	112	73,2
Total	153	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		1
No aplica		3738
Total		3740

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 653
EL ÚLTIMO AÑO ¿HA HECHO TRABAJO SEXUAL EN OTRO PAÍS?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	21	13,8
No	131	86,2
Total	152	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		3
No aplica		3738
Total		3741

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 654
LUGAR PRINCIPAL DE TRABAJO SEXUAL

	Frecuencia	Porcentaje
Carretera / Calle / parque	46	33,0
Motel/hotel/hospedaje	27	19,9
Bar o night club	20	14,5
Teléfono o Internet	20	14,4
Burdel / negocio	8	6,0
Casa de citas	4	2,8
Sala de masaje	1	,5
Otro	12	8,9
Total	138	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		16
No aplica		3738
Total		3755

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 655
CANTIDAD DE CLIENTES POR SEMANA

	Frecuencia	Porcentaje
De 1 a 5	79	61,2
De 6 a 10	22	17,3
De 11 a 20	16	12,6
Más de 20	12	9,0
Total	129	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		26
No aplica		3738
Total		3764

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 656
LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES CON UN CLIENTE, ¿USARON CONDÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	126	82,7
No	26	17,3
Total	153	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		2
No aplica		3738
Total		3740

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 657
¿QUIÉN PROPUSO EL USO DE CONDÓN EN ÚLTIMO TRABAJO SEXUAL?

	Frecuencia	Porcentaje
Yo misma/o	84	71,5
Mi pareja	10	8,8
Decisión conjunta	23	19,7
Total	118	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		9
No aplica		3767
Total		3775

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 658
¿POR QUÉ NO USARON EL CONDÓN USTED Y SU CLIENTE ESA ÚLTIMA VEZ?
(respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
El cliente me pago más	9	38,4
Creo que está sano	1	5,7
El no quiso usar	13	53,6
No me gusta usarlo	7	28,9
Yo estaba bajo efectos de alcohol o drogas	4	15,8
Total	25	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		2
No aplica		3867
Total		3868

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 659
EN ÚLTIMO TRABAJO SEXUAL ¿USARON CONDÓN EN TODA LA PENETRACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	110	75,2
No	36	24,8
Total	146	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		8
No aplica		3738
Total		3747

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 660
EN ÚLTIMO TRABAJO ¿USARON LUBRICANTE EN TODA LA PENETRACIÓN?

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	52	35,2
No	95	64,8
Total	146	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		8
No aplica		3738
Total		3747

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 661
¿CON QUE FRECUENCIA USA EL CONDÓN EN RELACIONES CON CLIENTES?

	Frecuencia	Porcentaje
Todas las veces	96	2,5
La gran mayoría de las veces	21	,5
A menudo	12	,3
Pocas veces	10	,3
Nunca	0	,0
No aplica	3738	96,4
Total	3878	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		6
Casi nunca		10
Total		15

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 662
¿CON QUE FRECUENCIA USA LUBRICANTE EN RELACIONES CON CLIENTES?

	Frecuencia	Porcentaje
Todas las veces	31	21,6
La gran mayoría de las veces	18	12,1
A menudo	11	7,4
Pocas veces	17	11,5
Casi nunca	16	10,7
Nunca	53	36,6
Total	145	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		10
No aplica		3738
Total		3748

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 663
¿CUÁNDO DEJA DE USAR EL CONDÓN?
 (respuesta múltiple)

	Frecuencia	Porcentaje
El cliente paga más	36	35,2
Hace sexo oral	33	32,4
Consume drogas o alcohol	22	21,3
Es un cliente fijo	17	17,0
El cliente insiste mucho	15	14,9
Revisa al cliente y se ve sano	10	9,8
Otra	25	24,6
Total	102	100,0
Personas fuera del análisis		
No contesta		52
No aplica		3738
Total		3791


Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

USO DEL CONDÓN

Para evaluar el uso del condón se combinaron todas las preguntas correspondientes de las diferentes secciones en un solo indicador que varía de 0 a 100. Los resultados muestran un nivel moderado, con un promedio de 62,0 y una desviación de apenas 11,4, por lo que los puntajes tienden a ser bastante homogéneos para la mayoría de las personas de la muestra (ver cuadro # 664).

Un 21,5% presenta un nivel medio bajo, un 72,3% medio alto y 6% muestra un nivel muy alto (ver cuadro # 665 y gráfico # 34).

GRÁFICO # 34
NIVEL DE USO DEL CONDÓN



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Nicaragua muestra el mayor nivel de uso del condón y Belice el más bajo (ver cuadro # 666).

El uso del condón es superior entre las personas entrevistadas en el Programa de Visitas Domiciliarias (ver cuadro # 667), las que tienen la peor perspectiva de futuro (ver cuadro # 668), las que tiene peores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 668), menor acceso a condones (ver cuadro # 670) y a lubricantes (ver cuadro # 671), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 672), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 673), las que menos alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 674), las que tienen una pareja estable (ver cuadro # 675), las de menor edad (ver cuadro # 676), las mujeres trans (ver cuadro # 677), las personas que saben leer y escribir (ver cuadro # 678), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 679), las que asisten varias veces al mes al culto de su iglesia (ver cuadro # 680), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 681), las que viven con su pareja (ver cuadro # 682), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 683) y los patronos con más de 10 empleados (ver cuadro # 684).

El análisis de regresión para el uso del condón muestra un modelo predictivo con una correlación múltiple de 0,378, para un 14,3% de variabilidad explicada. El modelo incorpora doce variables independientes: si tiene pareja estable, conocimientos sobre VIH, identidad de género femenino, tiempo de haber recibido, su diagnóstico de VIH, nivel de actividad, nivel educativo, percepción de su estado de salud, edad, actualmente está tomando medicamentos antirretrovirales, percepción de los medicamentos antirretrovirales, identidad de género masculino y si sabe leer y escribir (ver cuadro # 685).

Cuadro #664
USO DEL CONDÓN
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	22,06	100,00	62,0346	11,41394

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 665
USO DE CONDÓN

	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	6	,1
Medio bajo	839	21,5
Medio alto	2814	72,3
Muy alto	234	6,0
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 666
USO DEL CONDÓN
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
Belice	131	60,4784	11,37019
Costa Rica	250	61,1682	12,30847
El Salvador	1263	61,7572	10,91072
Honduras	1328	61,3939	11,97559
Nicaragua	358	63,8477	10,38718
Panamá	562	63,7658	11,11460
Total	3893	62,0346	11,41394
F = 6,199 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #667
USO DEL CONDÓN
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	N	Media	Desv, tip,
Servicio de Salud	1595	61,4953	12,02787
Visita domiciliar	2226	62,4961	10,92401
t = -2,634 $\alpha = ,008$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #668
USO DEL CONDÓN
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	316	58,9022	11,56672
Media baja	259	60,0519	11,77656
Media alta	462	61,3296	10,93843
Muy alta	2857	62,6748	11,36007
Total	3893	62,0346	11,41394
F = 14,265 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #669
USO DEL CONDÓN
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	64	57,9253	10,58167
Medio bajo	854	59,0411	12,00875
Medio alto	1397	62,0023	11,36526
Muy alto	1578	63,8500	10,76387
Total	3893	62,0346	11,41394
F = 36,636 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #670
USO DEL CONDÓN
SEGÚN ACCESO A CONDONES

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	267	57,1424	11,02648
Medio bajo	2792	61,6758	11,31770
Medio alto	785	64,6101	11,28369
Muy alto	50	67,8334	8,88155
Total	3893	62,0346	11,41394
F = 35,784 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #671
USO DEL CONDÓN
SEGÚN ACCESO A LUBRICANTES

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	1577	61,5948	11,59571
Medio bajo	1689	61,4146	11,37213
Medio alto	432	64,2885	11,03057
Muy alto	195	65,9733	9,68934
Total	3893	62,0346	11,41394
F = 15,974 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #672
USO DEL CONDÓN
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE
RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Menos de 1 mes	47	51,0427	11,67397
De 1 a 5 meses	159	57,6517	11,97642
De 6 a 11 meses	134	58,5349	12,24837
De 1 o 2 años	530	61,8139	11,37307
De 3 a 5 años	901	62,2408	12,09794
De 5 a 10 años	1231	62,6976	10,89906
Más de 10 años	871	62,9091	10,65720
Total	3873	62,0257	11,42692
F = 15,166 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #673
USO DEL CONDÓN
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SUESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv, tip,
Muy bueno	909	63,8660	10,75556
Bueno	1711	62,2557	11,28850
Estable	1111	61,0324	11,84136
Malo	131	56,6194	11,11725
Muy malo	12	51,1053	5,89463
Total	3873	62,0573	11,41385
F = 18,621 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #674
USO DEL CONDÓN
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	2894	61,8369	10,85914
Medio bajo	823	63,4470	11,99847
Medio alto	174	58,6848	15,82772
Muy alto	2	57,8431	27,68707
Total	3893	62,0346	11,41394
F = 9,623 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #675
USO DEL CONDÓN
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, tip,
Sí	1812	65,1093	11,50118
No	2077	59,3647	10,64726
t = 16,168 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #676
USO DEL CONDÓN
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
25 o menos	435	60,8263	12,00767
De 26 a 35	1174	62,9012	11,56512
De 36 a 45	1271	62,9575	11,28675
De 46 a 60	841	61,0012	10,99639
Más de 60	164	57,7448	10,07635
Total	3884	62,0589	11,41271
F = 12,639 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #677
USO DEL CONDÓN
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv, tip,
Femenino	1891	60,5448	11,09122
Masculino	1925	63,3429	11,42824
Mujer trans	44	66,9663	13,40077
Hombre trans	33	64,5209	14,52800
Total	3893	62,0346	11,41394
F = 22,808 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #678
USO DEL CONDÓN
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	N	Media	Desv, tip,
Sí	3406	62,5671	11,35852
No	461	58,2697	11,09761
t = 7,642 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #679
USO DEL CONDÓN
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	N	Media	Desv, tip,
No asistió a la escuela	27	64,3114	8,61887
Alfabetizada	72	61,7695	9,84846
Primaria incompleta	719	61,7396	11,79780
Primaria completa	694	61,3861	11,54889
Secundaria incompleta	701	62,5661	11,62862
Secundaria completa	738	63,5930	11,07500
Universitaria incompleta	286	63,4377	10,43696
Universitaria completa	151	64,7930	10,58130
Post grado universitario	12	67,8452	8,19266
Total	3399	62,5610	11,35804
F = 3,563 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #680
USO DEL CONDÓN
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE
AL CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip,
Al menos una vez por semana	1495	61,4369	10,61662
Una, dos o tres veces al mes	643	63,5396	9,90022
Menos de una vez por mes	494	62,7141	11,18735
Nunca	389	62,2899	12,61229
Total	3020	62,2031	10,87084
F = 6,116 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #681
USO DEL CONDÓN
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR DE RESIDENCIA
DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, tip,
Sí	720	63,1840	11,66901
No	3159	61,7711	11,32473
t = 3,005 $\alpha = ,003$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #682
USO DEL CONDÓN
SEGÚN ESTADO CIVIL**

	N	Media	Desv, tip,
Soltero/a	1897	60,6656	11,15921
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	64,4647	11,64241
Separado/a o divorciado/a	147	61,0141	10,26105
Viudo/a	204	55,9729	7,89514
Total	3872	62,0255	11,42100
F = 55,329 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #683
USO DEL CONDÓN
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD**

	N	Media	Desv, tip,
Solo trabaja	1612	63,7100	11,35201
Estudia y trabaja	116	64,4391	10,48828
Está desempleado	1026	60,5502	11,59496
Es pensionado o rentista	99	61,2550	10,82159
Solo estudia	103	63,7824	11,84437
Solo se dedica a tareas del hogar	850	60,5240	10,86397
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	57,9476	11,94833
Total	3871	62,0383	11,41188
F = 14,157 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

**Cuadro #684
USO DEL CONDÓN
SEGÚN RELACIÓN LABORAL**

	N	Media	Desv, tip,
No remunerado	35	53,5819	20,27885
Empleado del Gobierno o Institución	172	64,7108	10,72494
Empleado de empresa privada	589	64,5756	10,84940
Servicio doméstico	117	60,7198	10,72350
Cuenta propia	647	63,9576	11,14050
Patrono con menos de 10 empleados	112	62,3094	10,84129
Patrono con 10 o más empleados	18	67,1042	9,58393
Total	1690	63,7358	11,32250
F = 7,542 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #685
ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL USO DEL CONDÓN

	N
Correlación múltiple	0,378
Porcentaje de variabilidad predicha (R ²)	14,3%
VARIABLES EN LA ECUACIÓN	
Tiene pareja estable	0,228
Conocimientos sobre VIH	0,119
Identidad de género femenino	-0,251
Tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH	0,109
Nivel de actividad	0,076
Nivel educativo	0,049
Percepción de su estado de salud	0,064
Edad	-0,044
Actualmente está tomando medicamentos antirretrovirales	0,040
Percepción de los medicamentos antirretrovirales	0,036
Identidad de género masculino	-0,119
Sabe leer y escribir	0,035


Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

USO DE LUBRICANTE

Al igual que para el uso del condón, también se combinaron las preguntas de todas las secciones acerca del uso del lubricante en un solo indicador que varía de 0 a 100. Los resultados muestran un nivel muy bajo, con un promedio de 39,9 y una desviación de 17,1 (ver cuadro # 686).

Un 27,5% de las personas tienen un indicador muy bajo y un 53,3% medio bajo, mientras que un 13,2% muestra un nivel medio alto y un 6% muy alto (ver cuadro # 687).

GRÁFICO # 35
USO DE LUBRICANTE SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

El uso es mayor en Belice y menor para Honduras (ver cuadro # 688).

El uso del lubricante es más alto entre las personas entrevistadas en los servicios de salud (ver cuadro # 689), las que tienen mejor perspectiva de futuro (ver cuadro # 690), las mujeres que tienen sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres (ver cuadro # 691), los hombres que tienen sexo solo con hombres (ver cuadro # 692), las personas que tiene mejores conocimientos sobre VIH (ver cuadro # 693), las que tienen mayor acceso a condones (ver cuadro # 694) y a lubricantes (ver cuadro # 695), las que tienen más tiempo de haber recibido su diagnóstico de VIH (ver cuadro # 696), las que mejor perciben su estado de salud (ver cuadro # 697), las que más alcohol y/o drogas consumen (ver cuadro # 698), las que no tienen una pareja estable (ver cuadro # 699), las de menor edad (ver cuadro # 700), los hombres trans (ver cuadro # 701), las personas que saben leer y escribir (ver cuadro # 702), las que tienen mayor nivel educativo (ver cuadro # 703), las que nunca asisten al culto de su iglesia (ver cuadro # 705), las que han cambiado su residencia desde el diagnóstico (ver cuadro # 706), las solteras (ver cuadro # 707), las que estudian y trabajan (ver cuadro # 708), las que ocupan puestos directivos (ver cuadro # 710) y las y los empleados públicos (ver cuadro # 710).

El modelo de regresión muestra en este caso una correlación múltiple de 0,314, para una variabilidad predicha de 9,8%. El análisis incluye cuatro variables independientes: nivel educativo, identidad de género femenino, si tiene pareja estable, identidad de género masculino, nivel de actividad, conocimientos sobre VIH, si sabe leer y escribir, reside permanentemente en el país, percepción de su estado de salud y edad (ver cuadro # 509).

Cuadro #686
USO DE LUBRICANTE
Estadísticas descriptivas

N	Mínimo	Máximo	Media	Desv, típ,
3893	5,00	100,00	39,9076	17,07623

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #687
USO DE LUBRICANTE

	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	1071	27,5
Medio bajo	2074	53,3
Medio alto	516	13,2
Muy alto	233	6,0
Total	3893	100,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 688
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN PAÍS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, típ,
Belice	131	48,8435	18,40037
Costa Rica	250	44,1803	18,62091
El Salvador	1263	38,4548	15,17845
Honduras	1328	36,1773	14,72623
Nicaragua	358	43,3154	19,37770
Panamá	562	45,8209	20,31694
Total	3893	39,9076	17,07623
F = 43,416 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #689
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN LUGAR DE ENTREVISTA

	N	Media	Desv, tip,
Servicio de Salud	1595	41,2264	17,97531
Visita domiciliar	2226	38,6305	16,14885
t = 4,591 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 690
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN PERSPECTIVA DE FUTURO

	N	Media	Desv, tip,
Muy baja	316	38,5332	14,81967
Media baja	259	37,2897	14,13276
Media alta	462	40,5999	15,89816
Muy alta	2857	40,1847	17,70360
Total	3893	39,9076	17,07623
F = 3,217 α = ,022			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #691
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL
DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

	N	Media	Desv, tip,
Solo practica el sexo con hombres	1689	36,1504	13,62458
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	19	42,4951	16,66088
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	7	51,0335	29,39945
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	5	58,0282	11,88487
Solo practica el sexo con mujeres	23	36,7302	17,19951
Total	1743	36,3591	13,88412
F = 6,505 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #692
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES ENTREVISTADOS

	N	Media	Desv, tip,
Solo practica el sexo con hombres	543	54,9045	20,16898
Practica el sexo con hombres y ocasionalmente con mujeres	67	51,2455	20,15311
Practica el sexo tanto con hombres como con mujeres	108	45,5879	19,13184
Practica el sexo con mujeres y ocasionalmente con hombres	82	42,1701	18,01234
Solo practica el sexo con mujeres	979	35,2634	14,68488
Total	1779	42,8032	19,33085
F = 119,296 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #693
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	64	37,6790	12,01221
Medio bajo	854	38,3133	14,96359
Medio alto	1397	39,9771	16,93535
Muy alto	1578	40,7992	18,34405
Total	3893	39,9076	17,07623
F = 4,298 $\alpha = ,005$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #694
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN ACCESO A CONDONES

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	267	37,2164	11,61322
Medio bajo	2792	38,8475	15,96560
Medio alto	785	44,1043	20,84577
Muy alto	50	47,6816	22,79922
Total	3893	39,9076	17,07623
F = 25,489 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #695
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN ACCESO A LUBRICANTES

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	1577	34,4016	12,69547
Medio bajo	1689	38,5998	15,24596
Medio alto	432	53,5652	20,50464
Muy alto	195	65,5330	15,74887
Total	3893	39,9076	17,07623
F = 383,797 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #696
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE
RECIBIÓ DIAGNÓSTICO DE VIH

	N	Media	Desv, tip,
Menos de 1 mes	47	35,0236	13,72103
De 1 a 5 meses	159	40,6313	17,85473
De 6 a 11 meses	134	39,8192	16,19367
De 1 o 2 años	530	42,1396	17,96067
De 3 a 5 años	901	41,5121	18,30143
De 5 a 10 años	1231	38,0074	15,87382
Más de 10 años	871	39,4129	16,55823
Total	3873	39,8386	17,04760
F = 6,243 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #697
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD

	N	Media	Desv, tip,
Muy bueno	909	42,6735	18,82352
Bueno	1711	39,2322	16,93369
Estable	1111	39,0147	15,99464
Malo	131	36,4909	13,42396
Muy malo	12	37,7996	6,14253
Total	3873	39,8800	17,08138
F = 8,805 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #698
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

	N	Media	Desv, tip,
Muy bajo	2894	38,8401	15,64440
Medio bajo	823	43,2583	19,97354
Medio alto	174	41,7642	22,15006
Muy alto	2	45,8333	36,31638
Total	3893	39,9076	17,07623
F = 15,246 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 699
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN SI ACTUALMENTE TIENE PAREJA ESTABLE

	N	Media	Desv, tip,
Sí	1812	37,7703	20,78695
No	2077	41,7726	12,73608
t = -7,114 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #700
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

	N	Media	Desv, tip,
25 o menos	435	42,2789	17,69195
De 26 a 35	1174	40,7454	19,10627
De 36 a 45	1271	39,0287	16,98573
De 46 a 60	841	39,2298	14,87808
Más de 60	164	37,8171	8,91308
Total	3884	39,9038	17,09301
F = 4,596 $\alpha = ,001$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #701
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN IDENTIDAD DE GÉNERO

	N	Media	Desv, típ,
Femenino	1891	36,5877	13,71242
Masculino	1925	42,6407	19,00576
Mujer trans	44	50,1520	21,11122
Hombre trans	33	56,9831	22,24847
Total	3893	39,9076	17,07623
F = 59,157 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #702
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN SI SABE LEER Y ESCRIBIR

	N	Media	Desv, típ,
Sí	3406	40,3454	17,55382
No	461	36,8476	12,73985
t = 5,257 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #703
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

	N	Media	Desv, típ,
No asistió a la escuela	27	41,4371	18,70779
Alfabetizada	72	35,1240	10,28847
Primaria incompleta	719	36,6125	14,16853
Primaria completa	694	36,2234	14,72727
Secundaria incompleta	701	39,4868	17,12100
Secundaria completa	738	41,7470	18,60027
Universitaria incompleta	286	52,0107	20,68167
Universitaria completa	151	53,2958	19,74150
Post grado universitario	12	54,5275	21,16062
Total	3399	40,3470	17,56747
F = 40,938 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro # 704
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN RELIGIÓN

	N	Media	Desv, tip,
Católica	1519	41,5056	17,83825
Cristiana Evangélica	1343	39,2376	16,22790
Testigo de Jehová	60	38,0488	14,43635
Adventista	59	37,9240	15,33246
Mormón/a	25	37,1221	11,99057
Otra	52	43,2538	17,28846
Ninguna	817	38,1708	17,16187
Total	3874	39,9036	17,07568
F = 4,691 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 705
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN FRECUENCIA CON QUE ASISTE AL
CULTO DE SU IGLESIA

	N	Media	Desv, tip,
Al menos una vez por semana	1495	39,3009	15,65076
Una, dos o tres veces al mes	643	39,6399	16,49780
Menos de una vez por mes	494	41,7802	18,96674
Nunca	389	44,0019	19,59672
Total	3020	40,3835	17,02336
F = 9,464 α = ,000			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #706
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN SI HA CAMBIADO DE LUGAR
DE RESIDENCIA DESDE SU DIAGNÓSTICO

	N	Media	Desv, tip,
Sí	720	41,2729	18,02901
No	3159	39,5999	16,85018
t = 2,275 α = ,023			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 707
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN ESTADO CIVIL

	N	Media	Desv, tip,
Soltero/a	1897	42,5718	15,27944
Casado/a, acompañado/a o unión libre	1624	36,6781	19,57266
Separado/a o divorciado/a	147	38,9421	11,23296
Viudo/a	204	40,5131	7,51822
Total	3872	39,8541	17,04756
F = 36,057 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro # 708
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

	N	Media	Desv, tip,
Solo trabaja	1612	41,0561	18,51129
Estudia y trabaja	116	56,4646	21,67419
Está desempleado	1026	38,4883	15,07451
Es pensionado o rentista	99	45,3675	16,77636
Solo estudia	103	47,6859	19,74152
Solo se dedica a tareas del hogar	850	35,4374	13,17225
No estudia ni trabaja y no realiza tareas domésticas	64	39,3663	12,75081
Total	3871	39,8628	17,06062
F = 37,670 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



Cuadro #709
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL

	N	Media	Desv, tip,
Rentas	1	49,6006	184,33807
Directivo de la administración pública o de empresas privadas	11	59,5908	25,22044
Profesional	111	52,1908	21,71657
Técnico medio	277	46,0952	21,54616
Apoyo al proceso administrativo y/o atención al público	622	42,4675	19,35391
Calificadas agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras	109	34,9338	12,64763
Calificadas de industrias, construcción y operación	149	39,2095	17,72408
No calificadas	429	38,7724	15,90649
Total	1710	42,1094	19,10179
F = 12,670 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #710
USO DE LUBRICANTE
SEGÚN RELACIÓN LABORAL

	N	Media	Desv, tip,
No remunerado	35	35,5100	21,05907
Empleado del Gobierno o Institución	172	47,2105	21,34136
Empleado de empresa privada	589	43,7339	20,03944
Servicio doméstico	117	37,1418	14,55696
Cuenta propia	647	40,1119	18,00717
Patrono con menos de 10 empleados	112	43,6302	18,71715
Patrono con 10 o más empleados	18	44,9558	19,71285
Total	1690	42,0806	19,18908
F = 6,187 $\alpha = ,000$			

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+

Cuadro #711
ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA EL USO DEL LUBRICANTE

	N
Correlación múltiple	0,314
Porcentaje de variabilidad predicha (R ²)	9,8%
VARIABLES EN LA ECUACIÓN	
	Peso (β)
Nivel educativo	0,194
Identidad de género femenino	-0,408
Si tiene pareja estable	-0,126
Identidad de género	-0,288
Nivel de actividad	0,063
Conocimientos sobre VIH	0,060
Si sabe leer y escribir	0,058
Reside permanentemente en el país	0,033
Percepción de su estado de salud	0,034
Edad	-0,034

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Perfil de Riesgo de personas con VIH en la Región Centroamericana del Programa REDCA+



CONCLUSIONES

1- La población en estudio se caracteriza por tener edades medias entre 26 y 45 años, con una mayoría de hombres y con pocas personas con identidad de género trans. El 88,1% de las personas entrevistadas saben leer y escribir y la mayor proporción tiene primaria o secundaria completa o incompleta. Existe una proporción mayor de personas pertenecientes a la iglesia católica.

Un 18,6% de las personas afirma haber cambiado de residencia después de conocer su diagnóstico de VIH, cambio que se realiza sobre todo para buscar mejores condiciones familiares, de vivienda o de comunidad. El traslado de residencia tiende a generar en algunas pocas personas problemas de acceso a los servicios de salud.

En el momento de la entrevista la mayoría de las personas carecen de una pareja estable y la mayor proporción se declara soltera, pero la mayor parte de las personas vive con su familia.

Más de la mitad de las personas no contaba con un trabajo remunerado al momento de la entrevista, con una proporción importante desempleada o dedicada a las tareas del hogar. Entre las que sí trabajan, en general lo hacen en funciones de apoyo administrativo y/o de atención al público o en ocupaciones no calificadas con un 38,3% como cuenta propia, lo que sugiere una proporción importante en el sector informal. El ingreso tiende a ser moderado, concentrándose una parte importante entre \$501 y \$1000 al mes. La mayor parte de las personas tienen de dos a cinco dependientes.

2- El nivel de participación en grupos de autoayuda es bajo y apenas moderada la asistencia a actividades relacionadas con el VIH.

Existe una alta disposición a contribuir en el control de la epidemia, pero las acciones sugeridas tienden a ser individuales con poca conciencia de comunidad dentro de la población de Personas con VIH.

3- Las personas entrevistadas tienden a mostrar en general una buena perspectiva de futuro, con una amplia mayoría con planes concretos para los próximos años, con el convencimiento de que pueden cambiar positivamente su situación y con la fe de que el futuro será mejor que el presente.

4- Se observa cerca de una tercera parte de las mujeres entrevistadas que ha tenido al menos un embarazo desde que recibió su diagnóstico de VIH y preocupa que estos embarazos tienden a darse sin planificación, a pesar de que ellas mismas afirman haber recibido información relevante sobre los riesgos de transmisión de madre a hijo. Un 29,3% dice tener hijos con VIH.

Para la mayor proporción de las mujeres entrevistadas la planificación se maneja con el uso del condón.

5- El nivel de conocimientos sobre VIH es moderado y se identifican lagunas asociadas al riesgo de reinfección.

Esta variable resulta clave puesto que se asocia de manera positiva con evitación de riesgos, con actitudes positivas hacia la salud y con el adecuado uso del condón.

6- Existe un acceso alto al control médico y una asistencia igualmente alta al mismo. Esto está asociado a una tendencia bastante generalizada a cuidar más de su salud desde que se enteraron de su diagnóstico de VIH. Pero un 27,7% afirma no haber recibido ningún tipo de consejería al realizarse la prueba que resultó en el diagnóstico de VIH.

Poco más de una cuarta parte de las personas ha tenido problemas de salud en los últimos tres meses. Pero se observa la tendencia a buscar pronto el consejo médico y se les ha atendido en general en forma adecuada, aunque con carencia de suministro de medicamentos. En general el acceso a servicios públicos y gratuitos es alto, pero un 24,7% se ha visto obligado a pagar por dichos servicios o a acudir a centros privados para exámenes de laboratorio o para consulta de especialistas.

La percepción del estado de salud es por lo general muy positiva y esta sensación también se asocia positivamente con actitudes y prácticas preventivas.

7- El 89,4% de las personas asegura estar en tratamiento antirretroviral en el momento de la entrevista y casi todas reciben sus medicamentos en forma completa y gratuita en el centro de salud.

Se menciona una lista muy grande de diferentes medicamentos que se estaban tomando en el momento de la entrevista, pero sobresalen con mayor mención Efavirenz y Zidovudina+Lamivudina.

La percepción del tratamiento antirretroviral tiende a ser muy positiva. La mayoría de las personas considera que quien lo sigue se enferma menos y vive más. Esta visión positiva del tratamiento se asocia de manera importante con actitudes y hábitos de salud preventivos.

Un 21,2% de las personas que se encuentran en tratamiento menciona haber tenido efectos secundarios adversos, pero la tendencia del centro de salud ha sido a mantenerle el tratamiento.

8- La adherencia al tratamiento antirretroviral es de 76,4% para las personas menores de 24 años, mientras que para el resto es de 82,7%.

Las principales razones para suspender el tratamiento se asocian los efectos secundarios y el cansancio acumulado.

Por otra parte, un 19% acepta haber olvidado retirar los medicamentos en algún momento en los últimos 12 meses y un 9,7% dice que en el centro de salud le han dejado de suministrar al menos una vez los medicamentos.

9- Existe un alto porcentaje de personas entrevistadas que se ha realizado los exámenes CD4 y de carga viral en los últimos doce meses, pero una proporción importante afirma desconocer sus resultados.



10- Un 58,3% no ha recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis y un 12,6% ya ha sufrido la enfermedad, aunque estas últimas personas sí han recibido el tratamiento adecuado.

11- Se mantiene un nivel importante de victimización por la condición de ser Persona con VIH. Concretamente, un 18,5% afirma haber recibido maltrato en los servicios de salud y un 29,9% considera necesario ocultar su diagnóstico al ser atendido.

La necesidad de ocultar el diagnóstico a la hora de buscar trabajo alcanza a más de la mitad de las personas entrevistadas.

A pesar de lo anterior, el apoyo de la familia resulta en general alto y positivo.

12- El uso del condón es apenas moderado con las diferentes modalidades de parejas sexuales. El uso sistemático anda en 67,2% para las relaciones con parejas estables, 64,4% con parejas ocasionales, y 64,1% con trabajadores o trabajadoras del sexo. Pero resulta casi nulo (2,4%) entre las personas que aceptan haber practicado trabajo sexual.

El uso del condón en la última relación sexual alcanza al 72,9% de las personas menores de 24 años y a 74,5% para el resto.

13- El uso del lubricante es bajo.

14- En relaciones con parejas ocasionales o en sexo comercial llama la atención las proporciones de personas que ignoran si su pareja es una Persona con VIH o que no le dicen a su pareja su situación.

15- El nivel educativo muestra relaciones muy importantes con actitudes y con conductas preventivas y obviamente también con el nivel de conocimientos sobre el VIH, por lo que se constituye en un predictor frecuente de los diferentes indicadores analizados.

16- Llama la atención el hecho de que otro de los predictores frecuentes de los diferentes indicadores lo constituye el tiempo que ha transcurrido desde que se recibió el diagnóstico de VIH. Lo anterior sugiere un proceso de maduración que permite aprender a vivir con el virus en forma saludable y responsable.

17- Otra variable predictora importante es el consumo de alcohol y otras drogas, que como siempre, se asocia a conductas de riesgo y a actitudes negativas. Sin embargo, los niveles de consumo en esta población tienden a ser bastante bajos.



RECOMENDACIONES

- 1- La condición socioeconómica de la población estudiada tiende a ser muy limitada, con muy alto desempleo, importante presencia de economía informal, ingresos limitados y muchos dependientes. Conviene, por lo tanto, pensar en mecanismos que puedan desarrollarse para incrementar las opciones de empleo o de producción.
- 2- Se observa una baja participación y baja conciencia de las opciones colectivas. Cualquier esfuerzo en el sentido de mejorar la identidad y la participación redundará en mejores opciones de apoyo y promoción de derechos y de mejoras en la calidad de vida, lo cual a su vez redundará en una perspectiva de vida aún más alta.
- 3- Es importante revisar la proporción de embarazos entre mujeres con VIH y promover mejores opciones de planificación, así como mejores manejos del riesgo de transmisión de madre a hijo que tiende a tener una frecuencia importante.
- 4- Resulta necesaria también alguna estrategia que garantice mayor y mejor acceso a contenidos relevantes sobre el VIH, los riesgos y las estrategias preventivas. Conforme aumentan la cantidad y calidad de los conocimientos, en la misma medida mejoran actitudes y prácticas preventivas.
- 5- Prevalece una proporción importante de personas que dice sufrir maltrato por su diagnóstico o que tiene que esconderlo al solicitar atención. La capacitación y sensibilización del personal de salud resulta entonces fundamental para reducir victimización y para incrementar el uso de los servicios y mejorar la calidad de los mismos.
- 6- Aunque la cantidad de personas que se mantienen en tratamiento antirretroviral es muy alta, prevalece una proporción que reconoce haberlo suspendido al menos una vez. Conviene trabajar en este punto las principales razones de esta suspensión. En especial la calidad de la atención en los centros de salud, como se mencionara en el punto anterior, para que lejos de ser una barrera se convierta en un estímulo para la adherencia.
- 7- Pareciera existir algún problema con el reporte de los resultados de los exámenes de laboratorio, sobre todo para el de carga viral, por lo que se hace necesaria una coordinación con los centros de salud para promover una entrega más sistemática de los reportes a cada paciente.
- 8- Existe una proporción relativamente alta que asegura no haber recibido tratamiento para prevenir la tuberculosis, por lo que es importante evaluar este servicio particular en los centros de salud.



9- El uso del condón sigue siendo apenas moderado. Deben intensificarse los esfuerzos para lograr aumentar las proporciones de uso sistemático. De acuerdo con las razones esgrimidas para no utilizarlo, es importante una mayor sensibilización entre las Personas con VIH para vencer las resistencias asociadas al condón, pero sobre todo para generar habilidades más asertivas para que puedan exigir a sus parejas este uso sistemático.

10- En el caso del lubricante, pareciera que los esfuerzos deben iniciarse por un primer acercamiento al producto, logrando que se conozca con más detalle y que se comprenda sus ventajas. Obviamente, esto debe ir asociado a un esfuerzo simultáneo para aumentar la disponibilidad amplia para toda la población de Personas con VIH.



levantamiento de información por:



Con el apoyo financiero de:

